

1 Vous effectuez une radiographie des mains chez un patient souffrant de douleurs articulaires multiples et vous constatez des néoformations osseuses périostées et des modifications érosives.

Q: En faveur de quel diagnostic ces observations parlent-elles?

a. Spondylarthrite axiale	Les observations radiographiques de néoformations osseuses périostées et de modifications érosives dans les mains d'un patient souffrant de douleurs articulaires multiples sont évocatrices d'une maladie auto-immune appelée la polyarthrite rhumatoïde.
b. Polyarthrite rhumatoïde	La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique qui affecte principalement les articulations, mais peut également toucher d'autres organes. Elle se caractérise par une destruction progressive des tissus des articulations, ce qui peut entraîner des douleurs, une raideur, une déformation des articulations et une perte de fonction.
c. Arthrite psoriasique	Les néoformations osseuses périostées et les modifications érosives sont des caractéristiques radiographiques typiques de la polyarthrite rhumatoïde. Ces changements résultent de l'inflammation chronique qui conduit à une augmentation de l'activité des cellules ostéoclastes qui détruisent l'os et des cellules ostéoblastes qui réparent l'os, conduisant ainsi à la formation de néoformations osseuses périostées et de modifications érosives.
d. Arthrite réactionnelle	Il est important de noter que ces résultats radiographiques ne sont pas spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde et peuvent également être observés dans d'autres maladies inflammatoires articulaires telles que la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique, etc. Le diagnostic définitif de la polyarthrite rhumatoïde nécessite une évaluation approfondie des symptômes du patient, des tests de laboratoire et des examens radiologiques.

Les observations d'une radiographie des mains montrant des néoformations osseuses périostées et des modifications érosives sont en faveur du diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune chronique qui provoque une inflammation des articulations, entraînant une douleur, une raideur et une perte de fonction. Les néoformations osseuses périostées et les modifications érosives sont des caractéristiques radiologiques typiques de la PR, qui peuvent apparaître dans les phases avancées de la maladie.

Les autres options de réponse proposées peuvent également provoquer des douleurs articulaires multiples, mais leurs caractéristiques radiologiques sont différentes. La spondylarthrite axiale peut présenter des lésions osseuses caractéristiques sur les radiographies, mais elles se trouvent généralement dans la colonne vertébrale et le bassin plutôt que dans les mains. L'arthrite psoriasique est souvent associée à des lésions cutanées psoriasiques, et les modifications radiologiques observées peuvent inclure une ostéoprolifération et une ostéolyse autour des articulations touchées. L'arthrite réactionnelle est une inflammation articulaire qui survient généralement en réponse à une infection, et peut ne pas présenter de caractéristiques radiologiques spécifiques.

2 Une femme de 76 ans présente un trouble marqué de la mémoire à court terme, égare des objets et répète toujours les mêmes questions. Ses proches ont remarqué une humeur anxieuse et dépressive.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

a. Démence de type Alzheimer	Les symptômes décrits sont évocateurs d'un trouble cognitif de type démence, et plus particulièrement de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive qui affecte la mémoire, le langage, la pensée abstraite et les fonctions exécutives. Elle est caractérisée par une accumulation anormale de protéines dans le cerveau, entraînant la mort des cellules nerveuses et la diminution du volume cérébral. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence chez les personnes âgées, et la mémoire à court terme est souvent la première fonction cognitive à être altérée.
b. Dépression	Les autres symptômes que vous avez mentionnés, tels que la perte d'objets, la répétition de questions et l'humeur anxieuse et dépressive, sont également fréquents dans la maladie d'Alzheimer. Les personnes atteintes de cette maladie ont souvent des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes simples et peuvent devenir de plus en plus dépendantes de leur famille ou de leurs soignants.
c. Démence vasculaire	Cependant, il est important de noter que d'autres affections peuvent également causer des symptômes similaires. Il est donc important de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis. Le médecin procédera à une évaluation approfondie des symptômes du patient, à un examen physique et à des tests neurologiques pour déterminer la cause exacte des symptômes et élaborer un plan de traitement approprié.
d. Syndrome de Parkinson	Le diagnostic le plus probable pour cette femme de 76 ans présentant des troubles marqués de la mémoire à court terme, une perte d'objets, une répétition des mêmes questions et une humeur anxieuse et dépressive est la démence de type Alzheimer.
e. Démence fronto-temporale	La démence de type Alzheimer est la forme la plus courante de démence et se caractérise par une altération progressive de la mémoire, de la pensée et du comportement. Les symptômes commencent généralement par une perte de mémoire à court terme, suivie d'une difficulté à effectuer des tâches courantes, à communiquer, à raisonner et à se souvenir des événements récents. Les troubles de l'humeur tels que l'anxiété et la dépression sont également fréquents chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Les autres options de réponse proposées peuvent également causer des symptômes de démence, mais elles ont des caractéristiques cliniques et des manifestations différentes. La dépression peut provoquer une perte de mémoire et une humeur anxieuse, mais les troubles de la mémoire sont généralement moins marqués et il n'y a pas de répétition constante de questions ou de perte d'objets. La démence vasculaire est causée par des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou d'autres problèmes de circulation sanguine dans le cerveau, et les symptômes peuvent varier en fonction de la zone touchée. Le syndrome de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui affecte généralement le mouvement, mais peut également entraîner des problèmes de mémoire et de comportement. La démence fronto-temporale est une forme rare de démence qui affecte principalement les lobes frontaux et temporaux du cerveau, et peut se manifester par des changements de personnalité, des comportements impulsifs et une perte de jugement.

3 Une étudiante en informatique de 21 ans a un accident de vélo le matin en se rendant à l'université, avec pour conséquence une plaie ouverte au niveau de la tempe droite. Elle se plaint de céphalées durant la matinée, avant de perdre soudainement connaissance à midi dans le restaurant universitaire.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

a. Ischémie cérébrale	Le diagnostic le plus probable dans ce cas est une hémorragie sous-arachnoïdienne. Une hémorragie sous-arachnoïdienne est une forme d'accident vasculaire cérébral (AVC) qui survient lorsque des vaisseaux sanguins dans l'espace sous-arachnoïdien, qui entoure le cerveau, se rompent et saignent dans cet espace. Les symptômes peuvent inclure des céphalées intenses et soudaines, une perte de conscience, des nausées, des vomissements, une rigidité de la nuque et des convulsions.
b. Hémorragie sous-arachnoïdienne	Dans le cas présenté, l'étudiante a subi un traumatisme crânien qui peut être à l'origine d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, en particulier si elle présente des céphalées et perd connaissance. La plaie ouverte sur la tempe peut également indiquer une fracture du crâne, qui peut augmenter le risque de saignement intracrânien.
c. Hématome épidural	Il est important de noter que les autres options de réponse proposées (ischémie cérébrale, hématome épidural et encéphalite) peuvent également être associées à un traumatisme crânien, mais elles ont des symptômes et des mécanismes différents. Une ischémie cérébrale se produit lorsque l'apport sanguin au cerveau est interrompu, généralement en raison d'un caillot de sang, tandis qu'un hématome épidural est un saignement qui se produit entre la boîte crânienne et la dure-mère, la membrane protectrice du cerveau. L'encéphalite est une inflammation du cerveau qui peut être causée par des infections virales ou bactériennes, mais n'est pas directement liée à un traumatisme crânien.
d. Encéphalite	

Une architecte de 34 ans souffre de crises de douleurs au niveau de la tempe droite et de l'œil, survenant brutalement tôt le matin, d'une durée d'environ 2h et accompagnées d'un larmoiement de l'œil. Les douleurs surviennent chaque

4 jour pendant une semaine, suivies d'un intervalle asymptomatique de plusieurs mois.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

a. Céphalée en grappe (cluster headache)	Le tableau clinique présenté est évocateur d'une céphalée en grappe (cluster headache). Ce type de céphalée est caractérisé par des douleurs intenses et brèves survenant de manière récurrente et souvent à la même heure de la journée, généralement autour de l'œil et de la tempe du même côté, accompagnées de symptômes tels qu'un larmoiement de l'œil, une congestion nasale et une rougeur de l'œil. Les crises peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures et survenir plusieurs fois par jour, pendant des semaines ou des mois, avec des périodes d'intervalle asymptomatique. Le diagnostic de la céphalée en grappe est principalement clinique et repose sur l'histoire clinique du patient et l'examen neurologique. Le traitement comprend des médicaments pour soulager la douleur aiguë et des médicaments prophylactiques pour réduire la fréquence et la gravité des crises.
b. Céphalée de tension	
c. Céphalée migraineuse	
d. Névralgie du trijumeau	
Je ne sais pas la réponse	

5 Un patient de 70 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique stable (créatinine 1,9 mg/dl (norme : <1 mg/dl)), présente une hyperuricémie lors d'un contrôle de routine.

Q: Quand l'allopurinol doit-il être utilisé comme traitement continu pour baisser le taux d'acide urique?

a. En cas de crise de goutte aiguë	Dans le cas d'un patient avec une insuffisance rénale chronique et une hyperuricémie, l'allopurinol est généralement utilisé comme traitement continu pour prévenir la formation de calculs rénaux d'urate et pour réduire le risque de crises de goutte. Le traitement doit être instauré en concertation avec un médecin spécialiste en médecine interne ou en néphrologie qui pourra adapter les doses et surveiller les effets secondaires éventuels. Le choix de l'indication pour traiter une hyperuricémie dépend de chaque cas individuel et des risques associés.			
b. En cas de troubles articulaires inexpliqués				
c. En cas de présence de calculs rénaux d'oxalate de calcium		Certain	Probable	Deviné
d. En cas d'arthrite urique chronique		Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse				

6 Un rejet tubulo-interstitiel aigu se produit à la suite d'une transplantation rénale.

Q: Quel est le traitement le plus approprié dans ce cas?

a. Administrer des bolus de stéroïdes pendant trois jours	Certain	Probable	Deviné
b. Augmenter la dose de ciclosporine	Certain	Probable	Deviné
c. Anticorps monoclonaux contre les cellules T humaines	Certain	Probable	Deviné
d. Administrer de l'azathioprine à faible dose	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

7 Un patient de 68 ans est sous dialyse depuis quelques années en raison d'une glomérulonéphrite chronique.

Q: Quel est le trouble électrolytique le plus susceptible d'être détecté en cas de status clinique anormal avant la dialyse en question?

a. Hyponatrémie	Certain	Probable	Deviné
b. Hypernatrémie	Certain	Probable	Deviné
c. Hypokaliémie	Certain	Probable	Deviné
d. Hyperkaliémie	Certain	Probable	Deviné
e. Hypercalcémie	Certain	Probable	Deviné

	f. Hypophosphatémie	Certain	Probable	Devine
	Je ne sais pas la réponse			

8	Q: Lors de la focalisation des rayons lumineux sur la rétine, quelle partie de l'œil assure la plus grande partie du pouvoir réfractif?			
	a. La cornée	Certain	Probable	Deviné
	b. L'humeur aqueuse	Certain	Probable	Deviné
	c. Le cristallin	Certain	Probable	Deviné
	d. Le corps vitré	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

9	Un patient de 34 ans souffre depuis quelques temps de douleurs épigastriques intermittentes, irradiant dans le dos. Au cours des dernières semaines, il a perdu 25 kg malgré un bon appétit. De plus, il dit avoir remarqué des selles claires et molles ainsi qu'une augmentation de la quantité d'urine et de la soif. Après interrogation, il déclare qu'il boit régulièrement de l'alcool.			
	Q: De quoi le patient souffre-t-il le plus probablement?			
	a. Ulcère gastrique	Certain	Probable	Deviné
	b. Cholécystite	Certain	Probable	Deviné
	c. Hépatite	Certain	Probable	Deviné
	d. Pancréatite	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

10	Q: Laquelle des substances citées ci-dessous peut être associée à l'isoniazide, à la rifampicine et au pyrazinamide pour le traitement d'induction en cas de récidence de tuberculose?			
	a. Azathioprine	Certain	Probable	Deviné
	b. éthambutol	Certain	Probable	Deviné
	c. Métronidazole	Certain	Probable	Deviné
	d. Abciximab	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

11	Chez une patiente de 25 ans, vous suspectez une méningite bactérienne.			
	Q: étant donné que les agents pathogènes les plus fréquents à cet âge sont les méningocoques et les pneumocoques, quel est l'antibiotique le plus approprié pour commencer un traitement immédiat, en supposant qu'il n'y a pas de résistance?			
	a. Flucloxacilline	Certain	Probable	Deviné
	b. Ceftriaxone	Certain	Probable	Deviné
	c. Métronidazole	Certain	Probable	Deviné

	d. Vancomycine	Certain	Probable Deviné
	e. Doxycycline	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

12 Q: Lequel des paramètres cités ci-dessous dépend toujours de la prévalence d’une maladie?

	a. Sensibilité d’un test de diagnostic	Certain	Probable Deviné
	b. Spécificité d’un test de diagnostic	Certain	Probable Deviné
	c. Valeur prédictive d’un test de diagnostic	Certain	Probable Deviné
	d. Incidence de la maladie	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

13 Une patiente de 60 ans présentant un goitre palpable développe une arythmie complète. Les analyses sanguines montrent une TSH supprimée avec un taux de fT3 élevé et un taux de fT4 normal. L'échographie permet de délimiter à gauche une structure ronde isoéchogène de 2 cm de diamètre, entourée d'un halo hypoéchogène. La scintigraphie thyroïdienne quantitative au pertechnétate de Tc-99m montre un enrichissement dans ce nodule, le reste du tissu thyroïdien étant largement supprimé.

Q: Quelle est la maladie la plus probable?

	a. Maladie de Basedow	Certain	Probable Deviné
	b. Thyroïdite d’Hashimoto	Certain	Probable Deviné
	c. Autonomie unifocale gauche	Certain	Probable Deviné
	d. Carcinome papillaire de la thyroïde gauche	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

14 Chez un patient de 58 ans, un carcinome pulmonaire à petites cellules est confirmé histologiquement après biopsie excisionnelle par bronchoscopie.

Q: Que devrait-on absolument inclure dans le traitement?

	a. Radiothérapie	Certain	Probable Deviné
	b. Chimiothérapie cytostatique	Certain	Probable Deviné
	c. Ablation chirurgicale	Certain	Probable Deviné
	d. Immunothérapie avec des anticorps	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

15 Un homme de 58 ans se présente aux urgences avec une exacerbation de sa bronchopneumopathie chronique obstructive. Il a 38.5 °C de fièvre et se plaint de dyspnée. En raison d’infections récurrentes des voies respiratoires avec toux et expectoration, il dit avoir pris des antibiotiques oraux à plusieurs reprises au cours de l’année dernière. Depuis cinq jours, il prend de l’amoxicilline/acide clavulanique, mais sans aucune amélioration.

Q: De quel agent pathogène s'agit-il le plus probablement?				
	a. Hæmophilus influenzae	Certain	Probable	Deviné
	b. Streptococcus pneumoniae	Certain	Probable	Deviné
	c. Virus d'Epstein-Barr	Certain	Probable	Deviné
	d. Mycoplasma pneumoniae	Certain	Probable	Deviné
	e. Pseudomonas aeruginosa	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

16

Un homme de 64 ans, qui a travaillé pendant des décennies comme tailleur de pierres, est censé subir une opération élektive pour une hernie inguinale. Dans ses antécédents, on trouve quatre hospitalisations l'année dernière pour insuffisance respiratoire. La radiographie du thorax révèle une calcification hilaire (en coquille d'œuf) et une accentuation de la trame donnant un aspect réticulé.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable expliquant les insuffisances respiratoires?				
	a. Anthracose	Certain	Probable	Deviné
	b. Silicose	Certain	Probable	Deviné
	c. Insuffisance cardiaque	Certain	Probable	Deviné
	d. Bronchopneumopathie obstructive chronique	Certain	Probable	Deviné
	e. Embolies pulmonaires récidivantes	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

17

Un jeune patient apparemment en bonne santé se rend chez sa dentiste pour un contrôle de routine. Celle-ci trouve des plaques blanchâtres sur son palais et la face interne des joues, adhérant à l'épithélium et pouvant être essuyées.

Q: Sur quoi la dentiste devrait-elle interroger plus précisément ce patient?				
	a. Maladie cardiovasculaire	Certain	Probable	Deviné
	b. Carence en vitamine C	Certain	Probable	Deviné
	c. Status VIH	Certain	Probable	Deviné
	d. Traitement anticoagulant par Marcoumar®	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

18

Aux urgences, on vous présente un patient qui a reçu une balle dans le visage en jouant au tennis et qui, depuis, rapporte les symptômes suivants : une vision double en regardant vers le haut et des paresthésies dans la région de la deuxième branche du trijumeau à droite ; de plus, il dit avoir saigné par la narine droite. À l'examen clinique, vous constatez une énoptalmie droite.

Q: De quelle fracture s'agit-il probablement?				
	a. Fracture fronto-basale	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
	b. Fracture de l'os zygomatique	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
		☐	☐	☐

	c. Fracture de la paroi postérieure du sinus maxillaire	Certain	Probable	Deviné
	d. Fracture du plancher de l'orbite	Certain	Probable	Deviné
	e. Fracture du plancher du sinus frontal	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

19 Un patient de 55 ans développe une hémorragie cérébrale hypertensive à la suite d'une crise d'hypertension, entraînant son décès.

Q: Quel est le terrain le plus fréquemment touché par l'hémorragie cérébrale hypertensive?

	a. Cortex du lobe frontal	Certain	Probable	Deviné
	b. Leptoméninge (hémorragie sous-arachnoïdienne)	Certain	Probable	Deviné
	c. Cervelet	Certain	Probable	Deviné
	d. Pont	Certain	Probable	Deviné
	e. Ganglions de la base / Capsule interne	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

20 Les anévrismes des artères cérébrales peuvent siéger dans toutes les parties du cercle artériel du cerveau. Il existe cependant de nettes différences dans la fréquence de leur apparition.

Q: Quels segments ou vaisseaux du cercle artériel du cerveau sont le plus souvent touchés?

	a. A. cérébrale antérieure / A. communicante antérieure	Certain	Probable	Deviné
	b. A. cérébrale moyenne/ A. cérébrale postérieure	Certain	Probable	Deviné
	c. Partie intracrânienne de l'a. carotide interne	Certain	Probable	Deviné
	d. A. cérébrale postérieure / A. communicante postérieure	Certain	Probable	Deviné
	e. A. basilaire / A. vertébrale	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

21 **Q: Quelles sont les hallucinations isolées survenant le plus fréquemment chez un patient atteint de schizophrénie?**

	a. Optiques	Certain	Probable	Deviné
	b. Auditives	Certain	Probable	Deviné
	c. Tactiles	Certain	Probable	Deviné
	d. Gustatives	Certain	Probable	Deviné
	e. Olfactives	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

22 **Q: Quelle est la tumeur maligne la plus fréquente de la région palpébrale?**

a. Carcinome spinocellulaire	Certain	Probable	Deviné
b. Carcinome basocellulaire	Certain	Probable	Deviné
c. Carcinome de la glande de Meibom	Certain	Probable	Deviné
d. Kératoacanthome	Certain	Probable	Deviné
e. Carcinome à cellules de Merkel	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

23 **Q: Quelle est la modification des valeurs biologiques la plus sensible chez la plupart des personnes atteintes d'hyperthyroïdie?**

a. Augmentation de la thyroglobuline sérique	Certain	Probable	Deviné
b. Augmentation de la T4 libre sérique	Certain	Probable	Deviné
c. Suppression de la TSH basale sérique	Certain	Probable	Deviné
d. Augmentation modérée de la T3 sérique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

24 **Q: Quel est le principal champ d'utilisation clinique du marqueur tumoral ACE (antigène carcinoembryonnaire)?**

a. Le dépistage des tumeurs	Certain	Probable	Deviné
b. Le diagnostic des tumeurs	Certain	Probable	Deviné
c. Le suivi des tumeurs	Certain	Probable	Deviné
d. Le bilan d'extension des tumeurs (staging)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

25 **Q: Laquelle des causes de décès suivantes permet d'établir un certificat de mort naturelle?**

a. Pneumonie consécutive à un accident de la route	Certain	Probable	Deviné
b. Hémorragie intracérébrale hypertensive	Certain	Probable	Deviné
c. Suicide en cas de dépression endogène	Certain	Probable	Deviné
d. Intoxication fongique	Certain	Probable	Deviné
e. Intoxication à l'alcool	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Le CT-scan d'un patient de 66 ans souffrant de diabète sucré vous montre un grand nodule pulmonaire (3 cm de diamètre) avec formation d'une cavité centrale. Dans cette cavité remplie d'air se trouve une structure sphérique et

26 diamètre) avec formation d'une cavité centrale. Dans cette cavité remplie d'air se trouve une structure sphérique et dense surmontée d'un croissant gazeux.

Q: De quel résultat s'agit-il le plus probablement?

	a. Cicatrices résiduelles (TBC)	Certain	Probable	Deviné
	b. Carcinome bronchique	Certain	Probable	Deviné
	c. Aspergillome	Certain	Probable	Deviné
	d. Pneumonie fongique	Certain	Probable	Deviné
	e. Absès du poumon	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

27 Q: Concernant l'administration de médicaments, quel est l'avantage de la voie orale par rapport à la voie intraveineuse?

	a. Surdosage plus facile à traiter	Certain	Probable	Deviné
	b. Début d'action plus rapide	Certain	Probable	Deviné
	c. Permet d'éviter l'effet de premier passage	Certain	Probable	Deviné
	d. Pas d'effets secondaires intestinaux	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

28 Q: Laquelle des cardiopathies congénitales suivantes peut entraîner une hypertension pulmonaire irréversible précocement, dès la naissance?

	a. Communication interventriculaire	Certain	Probable	Deviné
	b. Persistance du foramen ovale	Certain	Probable	Deviné
	c. Sténose valvulaire aortique	Certain	Probable	Deviné
	d. Sténose valvulaire pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
	e. Retour veineux pulmonaire anormal partiel	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

29 Un garçon de 12 ans se plaint de saignements de nez récurrents depuis plusieurs semaines. La mesure de la pression artérielle humérale droite révèle une valeur de 165/85 mmHg (norme : <130/<90 mmHg). Les pouls fémoraux sont faiblement palpables.

Q: Quelle est la cardiopathie congénitale la plus susceptible d'être à l'origine des symptômes décrits?

	a. Transposition complète des gros vaisseaux	Certain	Probable	Deviné
	b. Coarctation de l'aorte	Certain	Probable	Deviné
	c. Tétralogie de Fallot	Certain	Probable	Deviné
	d. Communication interventriculaire	Certain	Probable	Deviné

Je ne sais pas la réponse

30

Un agriculteur de 51 ans, que vous connaissez depuis plusieurs années et qui fume depuis longtemps, se plaint d'une toux peu chargée depuis trois mois. Au cours des dernières semaines, il a remarqué des crachats sanglants à plusieurs reprises. De plus, il dit avoir perdu du poids et se sentir très fatigué.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

a. Embolie pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
b. Pneumonie chronique	Certain	Probable	Deviné
c. Exacerbation aiguë d'une bronchite chronique	Certain	Probable	Deviné
d. Tuberculose pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
e. Carcinome pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

31

Q: Laquelle des maladies suivantes est la plus susceptible d'être associée au HLA-B27?

a. Spondylarthrite ankylosante	Certain	Probable	Deviné
b. Infection par le virus d'Epstein-Barr	Certain	Probable	Deviné
c. Lupus érythémateux systémique	Certain	Probable	Deviné
d. Dermatomyosite	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

32

Q: Quelle maladie est transmise selon le mode autosomique récessif?

a. Syndrome de Down	Certain	Probable	Deviné
b. Syndrome de Turner	Certain	Probable	Deviné
c. Fibrose kystique	Certain	Probable	Deviné
d. Achondroplasie	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

33

Q: Laquelle des tumeurs suivantes est la plus susceptible d'être associée à une mutation due à l'aflatoxine B?

a. Carcinome hépatocellulaire	Certain	Probable	Deviné
b. Oligoblastome	Certain	Probable	Deviné
c. Carcinome de l'endomètre	Certain	Probable	Deviné
d. Mélanome malin	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

34

Le carcinome hépatocellulaire est très fréquent dans certains pays.

Q: Quelle en est la cause la plus probable?

a. Hépatite virale	Certain	Probable	Deviné
b. Hépatite bactérienne	Certain	Probable	Deviné
c. Cholestase	Certain	Probable	Deviné
d. Maladie de Gilbert	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

35

Q: Quelle condition est la plus susceptible de favoriser l'apparition d'un carcinome hépatocellulaire?

a. Contraception orale	Certain	Probable	Deviné
b. Sclérose tubulaire	Certain	Probable	Deviné
c. Rupture de la capsule hépatique	Certain	Probable	Deviné
d. Cirrhose du foie	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

36

Un patient de 55 ans se présente à votre consultation avec une hématurie intermittente. À l'examen clinique, vous notez une légère douleur à la palpation de la loge rénale. La pression artérielle est de 190/95 mmHg, la température de 38,2 °C, la glycémie de 109 mg/dl (norme : 55-100 mg/dl) et la vitesse de sédimentation (VS) de 40 mm/h (norme : <20 mm/h). L'examen microscopique des urines révèle la présence de 5 leucocytes/?l et de 20 érythrocytes/?l.

Q: Quelle est l'étape diagnostique suivante la plus indiquée?

a. Ponction rénale	Certain	Probable	Deviné
b. échographie	Certain	Probable	Deviné
c. CT-scan abdominal	Certain	Probable	Deviné
d. échographie des voies excrétrices urinaires	Certain	Probable	Deviné
e. Cystoscopie	Certain	Probable	Deviné
f. Imagerie par résonance magnétique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

37

Q: Quel est le traitement de première intention d'un carcinome basocellulaire?

a. Radiothérapie	Certain	Probable	Deviné
b. Thérapie au laser	Certain	Probable	Deviné
c. Exposition aux UV	Certain	Probable	Deviné
d. Résection chirurgicale	Certain	Probable	Deviné

	e. Chimiothérapie systémique	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

38

On vous présente un garçon de 3 ans présentant les symptômes suivants : hyperlaxité ligamentaire, arachnodactylie et ectopie du cristallin.

Q: Lequel des syndromes suivants est le plus susceptible d’être en cause?

	a. Syndrome de Prader-Willi	Certain	Probable	Deviné
	b. Syndrome de Silver-Russell	Certain	Probable	Deviné
	c. Syndrome de Marfan	Certain	Probable	Deviné
	d. Syndrome de Noonan	Certain	Probable	Deviné
	e. Syndrome d’Ehlers-Danlos	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

39

Chez un garçon de 5 ans, vous trouvez les symptômes principaux suivants : œdèmes, protéinurie de 1,1 g/m²/j, concentration totale de protéines de 48 g/l et taux d’albumine de 20 g/l.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Insuffisance cardiaque droite	Certain	Probable	Deviné
	b. Carence en protéines sur malnutrition	Certain	Probable	Deviné
	c. Syndrome néphrotique	Certain	Probable	Deviné
	d. Syndrome hémolytique et urémique	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

40

Un homme de 45 ans se plaint de douleurs de type brûlure, d’apparition brutale, localisées dans la région rétrosternale et non rythmées par la respiration. De plus, il signale une agitation, des sueurs et une dyspnée.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Embolie pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
	b. Infarctus du myocarde	Certain	Probable	Deviné
	c. Pleurésie sèche	Certain	Probable	Deviné
	d. Œsophagite de Barrett	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

41

Une primipare de 19 ans, à 36 semaines d’aménorrhée, est hospitalisée par son gynécologue en raison de valeurs de pression artérielle élevées et d’une protéinurie. Le tableau clinique évolue vers une pré-éclampsie sévère.

Q: Quelle est l’approche thérapeutique à choisir?

	a. Un traitement diurétique par furosémide doit être instauré	Certain	Probable	Deviné
--	---	---------	----------	--------

	a. On déclenche le travail par l'administration d'un médicament	Certain	Probable	Deviné
	b. La pression artérielle doit être abaissée lentement à environ 100/70 mmHg	Certain	Probable	Deviné
	c. On doit opter pour le déclenchement du travail ou la pratique d'une césarienne	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

42 Q: Lequel de ces symptômes est typique du carcinome de l'endomètre?

	a. Dysménorrhée	Certain	Probable	Deviné
	b. Hyperménorrhée	Certain	Probable	Deviné
	c. Ménorragie	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

43 Q: Quelle est la cause essentielle de l'inactivation des cellules humaines (perte de la capacité à former des colonies) due à l'irradiation?

	a. Cassures double brin de l'ADN	Certain	Probable	Deviné
	b. Délétion des mitochondries	Certain	Probable	Deviné
	c. Perte de l'activité polymérase	Certain	Probable	Deviné
	d. Perte du centromère	Certain	Probable	Deviné
	e. Troubles de la barrière membranaire	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

44 Une femme de 25 ans se plaint d'un état subfébrile, de douleurs au niveau des articulations des doigts, de myalgies, d'une chute de cheveux et d'une rougeur du visage qui s'accroît après une exposition au soleil. Le laboratoire révèle une VS de 45/70 mm (après 1/2 h), une CRP (protéine C-réactive) normale, des leucocytes à 3.2/nl (norme : 4.5-11.0/nl) et une protéinurie de 2 g/j.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Fièvre rhumatismale	Certain	Probable	Deviné
	b. Lipodystrophie intestinale (synonyme : maladie de Whipple)	Certain	Probable	Deviné
	c. Lupus érythémateux systémique	Certain	Probable	Deviné
	d. Granulomatose avec polyangéite (synonyme : maladie de Wegener)	Certain	Probable	Deviné
	e. Polyartérite noueuse	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

45 Bei einer 28-jährigen Frau in der 33. Schwangerschaftswoche steht der Fundus der Gebärmutter niedriger als es der Regelanamnese entspricht.

Q: Quelle en est la cause la plus probable?

	a. Polyhydramnios	Certain	Probable	Deviné
--	-------------------	--	---	---------------------------------------

	b. Grossesse multiple	Certain	Probable	Deviné
	c. Môle hydatiforme	Certain	Probable	Deviné
	d. Insuffisance placentaire	Certain	Probable	Deviné
	e. Enfant macrosome	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

46 Une femme qui vient d'accoucher ressent des douleurs pelviennes pendant l'allaitement.
Q: Quelle en est la cause la plus probable?

	a. Carence en œstrogènes post-partum	Certain	Probable	Deviné
	b. Effet de l'ocytocine sur l'utérus	Certain	Probable	Deviné
	c. Spasme des muscles de la paroi abdominale	Certain	Probable	Deviné
	d. Ténésmes durant l'acte de succion	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

47 Un patient vous consulte après un voyage de trois semaines en Inde, car depuis son retour, il souffre d'une toux sans expectoration, de douleurs abdominales spasmodiques et de diarrhées pâteuses. Après interrogation, il dit avoir consommé en Inde surtout de la salade et des légumes crus.
Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Ascariadiase	Certain	Probable	Deviné
	b. Colite ulcéreuse	Certain	Probable	Deviné
	c. Maladie de Whipple	Certain	Probable	Deviné
	d. Choléra	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

48 Un patient adolescent ne peut pas lire le tableau noir à l'école, mais la lecture de son livre ne lui pose aucun problème.
Q: De quel trouble s'agit-il le plus probablement?

	a. Astigmatisme	Certain	Probable	Deviné
	b. Hypermétropie	Certain	Probable	Deviné
	c. Myopie	Certain	Probable	Deviné
	d. Presbytie	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

49 **Q: Par quel mécanisme les glucocorticoïdes augmentent-ils la dépense énergétique?**

	a. Inhibition de la douleur	Certain	Probable	Deviné
	b. Inhibition de la glycolyse	Certain	Probable	Deviné
	c. Inhibition de la sécrétion d'ACTH (hormone adrénocorticotrope)	Certain	Probable	Deviné
	d. Augmentation de la formation osseuse	Certain	Probable	Deviné
	e. Effet catabolique sur le métabolisme des protéines	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

50 Les urgences vous appellent au chevet d'une patiente inconsciente. En posant une voie veineuse, vous remarquez que le sang veineux central est d'une couleur rouge clair.

Q: Une intoxication à laquelle des substances suivantes est la plus probable?

	a. Barbiturique	Certain	Probable	Deviné
	b. Strychnine	Certain	Probable	Deviné
	c. Monoxyde de carbone	Certain	Probable	Deviné
	d. Insuline	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

51 Une tuberculose pulmonaire non compliquée est diagnostiquée chez une patiente de 35 ans.

Q: Combien de temps devrait-elle suivre un traitement antituberculeux combiné?

	a. 20 jours	Certain	Probable	Deviné
	b. 8 semaines	Certain	Probable	Deviné
	c. 6 mois	Certain	Probable	Deviné
	d. 1 an	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

52 **Q: Quelle mesure peut sauver la vie en cas de pneumothorax sous tension?**

	a. Faire une ponction pleurale du côté non atteint	Certain	Probable	Deviné
	b. Placer le corps sur le côté atteint	Certain	Probable	Deviné
	c. Placer le corps sur le côté non atteint	Certain	Probable	Deviné
	d. Faire une ponction pleurale du côté atteint	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

53 Lors d'un entraînement de football, un garçon de 10 ans se plaint de douleurs au niveau de l'articulation du genou droit. De l'extérieur, le genou ne présente aucune anomalie. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) révèle une souris intra-articulaire du genou.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?			
	a. Maladie de Perthes	Certain	Probable Deviné
	b. Kyste de Baker	Certain	Probable Deviné
	c. Arthrose rétropatellaire	Certain	Probable Deviné
	d. Ostéosarcome	Certain	Probable Deviné
	e. Ostéochondrite disséquante	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

54

Dans le traitement de l'hypertension essentielle, les inhibiteurs de l'ECA (enzyme de conversion de l'angiotensine) font partie des médicaments de premier choix.

Q: Quel effet secondaire survient chez jusqu'à 15 % des patient·e·s et peut entraîner l'arrêt du médicament?			
	a. Constipation	Certain	Probable Deviné
	b. Douleurs articulaires	Certain	Probable Deviné
	c. Chute de cheveux	Certain	Probable Deviné
	d. Toux sèche irritante	Certain	Probable Deviné
	e. Tachycardie	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

55

Q: Quelle maladie, si elle n'est pas traitée, présente un risque proche de 100 % de développer un cancer du côlon?

	a. Maladie de Crohn	Certain	Probable Deviné
	b. Polypose adénomateuse familiale (PAF)	Certain	Probable Deviné
	c. Diverticulose sigmoïdienne de longue date avec de multiples poussées inflammatoires et une sténose prononcée	Certain	Probable Deviné
	d. Adénomes tubulo-villeux multiples dans différentes parties du côlon	Certain	Probable Deviné
	Je ne sais pas la réponse		

56

La prévalence est un terme utilisé en épidémiologie.

Q: Laquelle des définitions suivantes décrit la prévalence correctement?			
	a. La prévalence est le risque d'apparition d'une maladie donnée lorsque la personne est exposée à un facteur de risque	Certain	Probable Deviné
	b. La prévalence est la probabilité qu'un facteur d'exposition contribue à l'apparition de la maladie	Certain	Probable Deviné
	c. La prévalence est la probabilité d'occurrence d'une maladie à un moment donné	Certain	Probable Deviné
	d. La prévalence est la différence de fréquence entre deux pathologies.	Certain	Probable Deviné

	e. La prévalence est la différence de risque entre les personnes exposées et les personnes non exposées en ce qui concerne l'apparition d'une maladie	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

57

Q: En plus du groupage sanguin ABO, de quoi faut-il tenir compte lors de la transfusion d'un concentré érythrocytaire chez un adulte de sexe masculin non immunisé?

a. Caractéristiques HLA	Certain	Probable	Deviné
b. Antigène Rhésus D	Certain	Probable	Deviné
c. Système MNS	Certain	Probable	Deviné
d. Antigènes plaquettaires	Certain	Probable	Deviné
e. Sous-groupes Rhésus (C, c, E, e)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

58

Une mère se rend chez le pédiatre avec son deuxième fils âgé de trois mois pour un examen de l'audition. La mère a l'impression que son enfant entend bien, mais elle a été adressée pour investigation par le centre de consultation pour enfants à risque, car l'enfant présente une malformation cardiaque (communication interventriculaire) ainsi qu'une uropathie malformative. Le déroulement de la grossesse était sans particularité, mis à part une légère inflammation catarrhale des voies respiratoires supérieures avec exanthème fugace durant le deuxième mois de grossesse ; accouchement normal à terme. Les examens pédaudiologiques ont révélé une surdité neurosensorielle sévère.

Q: Quelle est la cause probable de cette surdité?

a. Infection par le cytomégalovirus	Certain	Probable	Deviné
b. Asphyxie périnatale	Certain	Probable	Deviné
c. Trisomie 21	Certain	Probable	Deviné
d. Maladie de Menkès	Certain	Probable	Deviné
e. Embryopathie rubéolique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

59

La mère d'un patient vous consulte et raconte que son fils adolescent ne dort plus du tout ces derniers temps, qu'il passe son temps à rouler dans le quartier, qu'il dépense beaucoup d'argent et qu'il veut maintenant émigrer pour délivrer le monde de la misère et de la pauvreté.

Q: De quelle pathologie s'agit-il le plus probablement?

a. Psychose hallucinatoire paranoïde	Certain	Probable	Deviné
b. Syndrome de Korsakov	Certain	Probable	Deviné
c. épisode maniaque	Certain	Probable	Deviné
d. Délire	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

60 Q: Quelle substance endogène antagonise l'insuline?

a. Glycogène	Certain	Probable	Deviné
b. Glucagon	Certain	Probable	Deviné
c. Glutamine	Certain	Probable	Deviné
d. Glycérol	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

61 Q: Sur laquelle des substances citées ci-dessous l'iode se fixe-t-il?

a. T3 (triiodothyronine)	Certain	Probable	Deviné
b. Thyroglobuline	Certain	Probable	Deviné
c. T4 (thyroxine)	Certain	Probable	Deviné
d. Thyrolibérine (TRH)	Certain	Probable	Deviné
e. Thyrostimuline (TSH)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un homme de 27 ans est atteint d'hémophilie A (activité résiduelle du facteur VIII d'env. 12 %). Il a été prouvé que sa femme n'est pas conductrice. Il ne souhaite avoir des enfants que si on peut être sûr que ceux-ci ne seront pas atteints d'hémophilie A.

62

Q: Quel risque se présente

a. Pour les fils, le risque de développer cette maladie est de 50 %.	Certain	Probable	Deviné
b. Pour les filles, le risque de développer cette maladie est de 50 %.	Certain	Probable	Deviné
c. Il n'y a pas de risque accru de développer cette maladie pour leurs enfants, mais les filles seront porteuses du gène muté.	Certain	Probable	Deviné
d. Il n'y a pas de risque accru de développer cette maladie pour leurs enfants, mais les fils seront porteurs du gène muté.	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une patiente de 68 ans se plaint d'arythmies et de palpitations occasionnelles de courte durée. Depuis un infarctus du myocarde il y a trois ans, la fonction ventriculaire gauche est considérablement réduite. Après l'implantation d'un défibrillateur cardiovertteur, la patiente présente en outre des extrasystoles et des salves gênantes. Vous souhaitez les réduire par l'administration additive d'un anti-arythmique de classe III selon la classification de Vaughan-Williams.

63

Q: Quel est l'effet secondaire principal à prendre en compte lors de l'administration de cette classe d'anti-arythmiques?

a. Allongement de l'intervalle QT	Certain	Probable	Deviné
b. Effet hypotenseur	Certain	Probable	Deviné
c. Augmentation de la résistance des voies respiratoires	Certain	Probable	Deviné

	d. Modification de la formule sanguine	Certain	Probable	Deviné
	e. Diminution de la fréquence cardiaque	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

64 Une jeune femme de 25 ans souffre de diarrhées et de douleurs abdominales récurrentes. Après des examens approfondis, le diagnostic de maladie de Crohn est retenu.

Q: Quelle est la partie de l'appareil digestif la plus fréquemment touchée au départ?

	a. Œsophage	Certain	Probable	Deviné
	b. Estomac	Certain	Probable	Deviné
	c. Jéjunum	Certain	Probable	Deviné
	d. Côlon sigmoïde	Certain	Probable	Deviné
	e. Iléon terminal	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

65 En tant que mesure d'urgence en cas d'obstruction mécanique des voies respiratoires supérieures, il est possible de procéder à ce que l'on appelle une « coniotomie ».

Q: À quel endroit une voie respiratoire artificielle est-elle ainsi créée (en urgence/par chirurgie)?

	a. Au-dessus de la fosse jugulaire	Certain	Probable	Deviné
	b. Entre le deuxième et le troisième cartilage cricoïde	Certain	Probable	Deviné
	c. Entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde	Certain	Probable	Deviné
	d. Entre le cartilage thyroïde et l'os hyoïde	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

66 **Q: Dans le cadre d'un traitement analgésique opioïde, quel est l'effet secondaire particulièrement fréquent chez les patients âgés?**

	a. Incontinence	Certain	Probable	Deviné
	b. Constipation	Certain	Probable	Deviné
	c. Troubles du rythme cardiaque	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

67 Un patient de 24 ans (180 cm, 60 kg) ressent, trois heures après avoir soulevé une machine à laver, une violente douleur dans la poitrine droite qui s'atténue toutefois après quelques minutes. Par la suite, une légère sensation de pression s'installe avec une douleur thoracique respiro-dépendante à droite, qui augmente d'intensité. Le médecin urgentiste appelé sur place fait les observations suivantes : détresse respiratoire légère, murmure vésiculaire diminué à droite, hypersonorité à la percussion à droite, pression artérielle 120/80 mmHg, fréquence cardiaque 125/min, saturation à l'oxymètre 95 % (air ambiant).

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Embolie pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
	b. Infarctus du myocarde	Certain	Probable	Deviné
	c. Pneumonie	Certain	Probable	Deviné
	d. épanchement pleural	Certain	Probable	Deviné
	e. Pneumothorax	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

68 Q: Quel est le meilleur moyen pour effectuer une réhydratation initiale en cas d'hyponatrémie?

	a. Solution saline isotonique (0.9%)	Certain	Probable	Deviné
	b. Glucose à 5%	Certain	Probable	Deviné
	c. Hydroxyéthylamidon (HEA)	Certain	Probable	Deviné
	d. Plasma sanguin frais congelé (PFC)	Certain	Probable	Deviné
	e. Concentré érythrocytaire	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

69 Un garçon de 7 ans souffre depuis deux jours de forts maux de gorge, de difficultés à déglutir et de fièvre. Le pédiatre retient le diagnostic d'amygdalite purulente ; le bilan microbiologique révèle la présence de streptocoques A (Streptococcus pyogenes) dans le frottis.

Q: Quel est l'antibiotique de choix?

	a. Gentamicine	Certain	Probable	Deviné
	b. Ampicilline	Certain	Probable	Deviné
	c. Doxycycline	Certain	Probable	Deviné
	d. Ciprofloxacine	Certain	Probable	Deviné
	e. Pénicilline V	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

70 Une fillette de 11 ans se plaint d'un rhume, de maux de gorge, d'un malaise général et d'un état subfébrile. L'examen physique effectué par le pédiatre ne révèle aucune anomalie, mis à part une rhinopharyngite.

Q: Quel est le type d'agent pathogène le plus susceptible d'être à l'origine de ce tableau clinique?

	a. Staphylocoques	Certain	Probable	Deviné
	b. Streptocoques A	Certain	Probable	Deviné
	c. Rhinovirus	Certain	Probable	Deviné
	d. Virus influenzae	Certain	Probable	Deviné

	e. Virus d'Epstein-Barr	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

71

Une patiente de 60 ans consulte son médecin traitant cinq jours après une injection intra-articulaire de cortisone, car le genou concerné est désormais très enflé et douloureux. La mobilité articulaire est nettement plus limitée qu'avant l'injection. Autour, la peau est chaude et rouge. Le médecin retient le diagnostic d'épanchement articulaire et évoque une arthrite purulente.

Q: Lequel des éléments suivants est le plus susceptible d'étayer ce diagnostic?

	a. Complexes immuns dans le sang	Certain	Probable	Deviné
	b. Anticorps dans le liquide synovial	Certain	Probable	Deviné
	c. Agent pathogène dans le sang	Certain	Probable	Deviné
	d. Agent pathogène dans le liquide synovial	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

72

Chez un patient de 40 ans, on a diagnostiqué un mélanome à extension superficielle siégeant sur le dos.

Q: Quel est le critère le plus important pour évaluer le risque de métastases?

	a. Localisation de la tumeur	Certain	Probable	Deviné
	b. Niveau de Clark	Certain	Probable	Deviné
	c. Distance de sécurité lors de l'excision	Certain	Probable	Deviné
	d. épaisseur de la tumeur	Certain	Probable	Deviné
	e. Âge du patient	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse				

73

Un homme de 30 ans constate au niveau du lobe de l'oreille, un infiltrat de la taille d'une cerise, de couleur rouge violacé, indolore et non chaud. Le diagnostic histologique est celui d'une lymphadénose cutanée bénigne.

Q: Quelle est la mesure diagnostique suivante à prendre?

	a. Dosage de l'inhibiteur de la C1-estérase	Certain	Probable	Deviné
	b. Recherche d'une infection par le VIH	Certain	Probable	Deviné
	c. Ponction de moëlle osseuse	Certain	Probable	Deviné
	d. Dépistage sérologique de la borréliose	Certain	Probable	Deviné
	e. Biopsie ganglionnaire	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse				

74

Chez un patient de 40 ans, une boule douloureuse s'est formée au niveau de l'anus. En poussant, cette boule devient encore plus saillante, elle est de couleur bleu violacé, de surface lisse et élastique à la palpation.

Q: Lequel des diagnostics cités ci-dessous est le plus probable?

	a. Abcès périproctique	Certain	Probable	Deviné
	b. Prolapsus anal	Certain	Probable	Deviné
	c. Prolapsus hémorroïdaire incarcerated	Certain	Probable	Deviné
	d. Thrombose veineuse périanale	Certain	Probable	Deviné
	e. Fistule anale	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

75 Une contracture en flexion de la hanche peut être compensée par une accentuation de la lordose lombaire.

Q: Par quelle manœuvre cette contracture est-elle objectivée lors de l'examen clinique?

	a. Manœuvre de Valsalva	Certain	Probable	Deviné
	b. Manœuvre de Thomas	Certain	Probable	Deviné
	c. Signe d'Ortolani	Certain	Probable	Deviné
	d. Manœuvre de Lasègue	Certain	Probable	Deviné
	e. Signe de Drehmann	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

76 Certains signes radiologiques directs sont évocateurs du diagnostic d'arthrose déformante.

Q: Outre un pincement de l'interligne articulaire et une sclérose sous-chondrale, lequel des signes radiologiques suivants est crucial pour poser ce diagnostic?

	a. Ankylose	Certain	Probable	Deviné
	b. Défauts à l'interface cartilage-os	Certain	Probable	Deviné
	c. Becs ostéophytiques	Certain	Probable	Deviné
	d. Ostéoporose périarticulaire	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

77 Une femme de 30 ans souffre depuis 24 heures de brûlures et de douleurs au niveau de la vulve. De plus, elle a des douleurs musculaires et pense avoir la grippe. À l'examen gynécologique, vous voyez de petites vésicules dans la région vulvaire.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Vaginose bactérienne	Certain	Probable	Deviné
	b. Herpès génital (primo-infection)	Certain	Probable	Deviné
	c. Vaginite par Candida albicans	Certain	Probable	Deviné
	d. Syphilis	Certain	Probable	Deviné

	e. Lichen plan valvulaire	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

78

Q: Quels sont les paramètres biologiques qui doivent être contrôlés régulièrement pendant le traitement par héparine non fractionnée?

	a. Temps de Quick et INR (International Normalized Ratio)	Certain	Probable	Deviné
	b. Compte plaquettaire et PTT (temps partiel de thromboplastine)	Certain	Probable	Deviné
	c. Hématocrite et temps de Quick	Certain	Probable	Deviné
	d. Compte plaquettaire et INR	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

79

Un infirmier de 37 ans se présente à votre cabinet pour cause de suspicion d’une dermatose professionnelle touchant les mains. Vous hésitez entre un eczéma de contact toxique chronique et un eczéma de contact allergique chronique pour poser votre diagnostic.

Q: Lequel des résultats suivants parle le plus en faveur d’une cause allergique?

	a. Rhagades saignantes	Certain	Probable	Deviné
	b. Atteinte de la face palmaire des doigts	Certain	Probable	Deviné
	c. Rougeur de la peau avec œdème	Certain	Probable	Deviné
	d. érosions cutanées suintantes	Certain	Probable	Deviné
	e. Phénomènes de dissémination au niveau du dos	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

80

Une fillette de 10 ans est amenée à votre cabinet par ses parents. Depuis une semaine, elle se réveille la nuit en rêvant qu’elle est enfermée dans une maison en feu. Elle a ensuite une peur panique de rester dans sa chambre et contrôle tout ce qui peut provoquer un incendie ou brûler. Le comportement de l’enfant pendant la journée a également changé de manière dramatique par rapport à avant : elle se replie de plus en plus sur elle-même et souffre de plus en plus souvent de crises de colère. À l’anamnèse, vous apprenez qu’il y a cinq mois, l’appartement des grands-parents, dans lequel se trouvait la fillette à ce moment-là, a complètement brûlé. Toutes les personnes ont pu être sauvées au dernier moment. Jusqu’à il y a une semaine, l’enfant semblait avoir bien surmonté cet événement.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Trouble névrotique	Certain	Probable	Deviné
	b. Trouble de l’adaptation	Certain	Probable	Deviné
	c. Réaction dépressive	Certain	Probable	Deviné
	d. Trouble de stress aigu	Certain	Probable	Deviné
	e. Trouble de stress post-traumatique	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Q: Quelle structure est significativement vulnérable aux métastases dans un nœud lymphatique situé à

81

Q: Quelle structure est significativement vulnérable aux métastases dans un nœud lymphatique situé à l'angle entre l'arc de l'aorte et l'artère pulmonaire gauche (fenêtre aortopulmonaire)?

a. Nerf phrénique	Certain	Probable	Deviné
b. Nerf laryngé récurrent	Certain	Probable	Deviné
c. Tronc sympathique	Certain	Probable	Deviné
d. Conduit thoracique	Certain	Probable	Deviné
e. Veine azygos	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

In einer Studie soll der Kaffeekonsum von Ärztinnen und Ärzten untersucht werden.

82

Q: Une étude souhaite examiner la consommation de café des médecins. Comment peut-on valider statistiquement l'hypothèse selon laquelle les médecins établi-e-s consomment significativement plus de café que les médecins des unités de soins?

a. Test t de Welch	Certain	Probable	Deviné
b. Test de Kruskal-Wallis	Certain	Probable	Deviné
c. Analyse de corrélation	Certain	Probable	Deviné
d. Analyse de régression	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un patient de 70 ans, connu pour une insuffisance cardiaque et un diabète non-insulinodépendant (diabète de type 2), se présente à votre cabinet de médecin de famille pour des douleurs abdominales spasmodiques à prédominance droite, survenant surtout après les repas. Celles-ci seraient présentes depuis quatre mois et d'une intensité croissante. Il dit avoir des selles normales.

83

Q: Laquelle des suspicions de diagnostic suivantes est la plus probable?

a. Gastrite de type B	Certain	Probable	Deviné
b. Pancréatite chronique	Certain	Probable	Deviné
c. Syndrome du côlon irritable	Certain	Probable	Deviné
d. Diverticulite	Certain	Probable	Deviné
e. Angor abdominal	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une femme de 26 ans ayant un cycle régulier de 28 jours et ne présentant aucun problème de santé souhaite tomber enceinte et vous demande quel est le moment le plus probable pour concevoir.

84

Q: Quels sont les jours du cycle où sa conception est optimale?

a. Jours 8 à 11	Certain	Probable	Deviné
b. Jours 12 à 15	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

	c. Jours 16 à 19	Certain	Probable	Devine
	d. Jours 20 à 23	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Aux urgences, vous prenez en charge une patiente de 71 ans. La première chose que vous faites est de regarder ses résultats de laboratoire : vous remarquez une élévation du taux de troponine T à 0,28?g/l (valeur limite < 0,03 ?g/l).

85

Q: Outre un syndrome coronarien aigu, quelle est la pathologie la plus susceptible de faire l'objet d'un diagnostic différentiel?

	a. Infarctus de la rate	Certain	Probable	Deviné
	b. Pyélonéphrite	Certain	Probable	Deviné
	c. Embolie artérielle pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
	d. Cholécystite nécrosante	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Monsieur Müller, un patient de 48 ans, se présente à votre cabinet et déclare avoir pris du poids après une prise prolongée de glucocorticoïdes. À l'examen clinique, vous constatez des œdèmes malléolaires et des télangiectasies.

86

Q: Quel est le moyen le plus approprié pour détecter un syndrome de Cushing résultant de la prise de glucocorticoïdes?

	a. épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale	Certain	Probable	Deviné
	b. épreuve de freinage par la dexaméthasone	Certain	Probable	Deviné
	c. Dosage de la calcitonine	Certain	Probable	Deviné
	d. Test à la desmopressine	Certain	Probable	Deviné
	e. Dosage de l'hydroxyproline	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Sie haben bei einer 60-jährigen Patientin den Verdacht auf eine stenosebedingte Myokardischämie und möchten nun ein Belastungs-EKG schreiben.

87

Q: Quand faut-il absolument arrêter cet examen, car la patiente a atteint la fréquence cardiaque maximale?

	a. 140/min	Certain	Probable	Deviné
	b. 160/min	Certain	Probable	Deviné
	c. 180/min	Certain	Probable	Deviné
	d. 200/min	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

À votre cabinet, vous avez mesuré à plusieurs reprises chez une patiente de 47 ans une pression artérielle de 145/95 mmHg.

88

Q: Comment faut-il évaluer cette pression artérielle?

a. Elle est trop basse.	Certain	Probable	Deviné
b. Elle est normale.	Certain	Probable	Deviné
c. Elle est trop élevée.	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Die Innervation der Zunge erfolgt durch mehrere Hirnnerven.

89Q: L'innervation de la langue est assurée par plusieurs nerfs crâniens. Quel nerf crânien est responsable de l'innervation sensorielle des papilles gustatives siégeant sur les deux tiers antérieurs de la langue?

a. Trijumeau	Certain	Probable	Deviné
b. Facial	Certain	Probable	Deviné
c. glosso-pharyngien	Certain	Probable	Deviné
d. Vague	Certain	Probable	Deviné
e. Hypoglosse	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Aux urgences, vous voyez un retraité de 68 ans. Il souffre de nausées et de vomissements depuis quatre jours. Ses antécédents médicaux comportent un diabète sucré de type 2, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie ainsi qu'un reflux gastro-œsophagien. Sa médication régulière a été récemment modifiée et comprend du lisinopril, de la metformine, de la ranitidine et de la simvastatine. Après avoir exclu d'autres causes, vous évoquez un effet secondaire médicamenteux à l'origine de ses plaintes.

90Q: Lequel de ses médicaments est le plus susceptible d'être en cause?

a. Lisinopril	Certain	Probable	Deviné
b. Metformine	Certain	Probable	Deviné
c. Ranitidine	Certain	Probable	Deviné
d. Simvastatine	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Q: Comment l'amélioration de l'apport d'oxygène au myocarde lors d'un effort physique de l'organisme est-elle obtenue en premier lieu?

91

a. L'extraction de l'oxygène à partir du sang coronaire est multipliée.	Certain	Probable	Deviné
b. La résistance coronaire est réduite par stimulation adrénergique alpha-1.	Certain	Probable	Deviné
c. La formation de métabolites locaux (par ex. adénosine, CO ₂ , K ⁺) entraîne une relaxation de la musculature lisse des petites artérioles coronaires.	Certain	Probable	Deviné
d. La modification de la durée de la diastole en cas de fréquence cardiaque élevée permet d'améliorer la perfusion coronaire.	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

92				Q: Quelle est approximativement la valeur moyenne du quotient intellectuel (QI) dans la population?		
	a. 80	Certain	Probable	Deviné		
	b. 90	Certain	Probable	Deviné		
	c. 100	Certain	Probable	Deviné		
	d. 120	Certain	Probable	Deviné		
	Je ne sais pas la réponse					
93				Q: Qu'est-ce qui est nécessaire pour une digestion efficace des triglycérides?		
	a. Acide biliaire	Certain	Probable	Deviné		
	b. Alpha-amylase	Certain	Probable	Deviné		
	c. Trypsine	Certain	Probable	Deviné		
	d. Collagénase	Certain	Probable	Deviné		
	Je ne sais pas la réponse					
94				Q: Lequel des groupes de personnes mentionnés ci-dessous est le plus touché par le syndrome d'épuisement professionnel?		
	a. Tout le monde.	Certain	Probable	Deviné		
	b. Les personnes qui connaissent bien leurs limites personnelles.	Certain	Probable	Deviné		
	c. Les personnes présentant des plaintes physiques.	Certain	Probable	Deviné		
	d. Les employé-e-s qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur.	Certain	Probable	Deviné		
	Je ne sais pas la réponse					
95				Q: Quelle tumeur le gène suppresseur de tumeur RB1 supprime-t-il normalement?		
	a. Rétinoblastome	Certain	Probable	Deviné		
	b. Tumeur de Wilms	Certain	Probable	Deviné		
	c. Neurofibromatose de type 1	Certain	Probable	Deviné		
	d. Carcinome rénal	Certain	Probable	Deviné		
	e. Rhabdomyosarcome	Certain	Probable	Deviné		
	Je ne sais pas la réponse					
96				Q: Lequel des types de cellules suivants se trouve physiologiquement dans le sang d'une personne en bonne santé?		

	a. érythroblastes	Certain	Probable	Deviné
	b. Myéloblastes	Certain	Probable	Deviné
	c. Réticulocytes	Certain	Probable	Deviné
	d. Promyélocytes	Certain	Probable	Deviné
	e. Métamyélocytes	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

97

Q: IDans laquelle des structures anatomiques énumérées ci-dessous une granulomatose avec polyangéite se manifeste-t-elle le plus souvent?

	a. Tractus urogénital	Certain	Probable	Deviné
	b. Tractus gastro-intestinal	Certain	Probable	Deviné
	c. Voies respiratoires supérieures	Certain	Probable	Deviné
	d. Peau	Certain	Probable	Deviné
	e. SNC (système nerveux central)	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

98

Q: Lequel des médicaments suivants est particulièrement efficace en cas de crise de goutte aiguë?

	a. Allopurinol	Certain	Probable	Deviné
	b. Chloroquine	Certain	Probable	Deviné
	c. Colchicine	Certain	Probable	Deviné
	d. Paracétamol	Certain	Probable	Deviné
	e. Benzbromarone	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

99

Q: Quel modèle les thérapeutes comportementaux utilisent-ils en priorité pour analyser les modalités de comportement?

	a. Questionnaire de personnalité	Certain	Probable	Deviné
	b. Test projectif	Certain	Probable	Deviné
	c. Contre-transfert	Certain	Probable	Deviné
	d. Schéma S-O-R-C-C	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

100

Chez le patient allongé, on empêche la langue de retomber dans le pharynx en soulevant la mandibule (manœuvre de Esmarch).

Q: Quel est le muscle qui transmet la traction sur la racine de la langue?

	a. Mylo-hyoïdien	Certain	Probable	Deviné
	b. Ptérygoïdien médial	Certain	Probable	Deviné
	c. Génio-glosse	Certain	Probable	Deviné
	d. Hyo-glosse	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

101

Q: Quelle condition est la plus susceptible d’entraîner une hyperglycémie chez un·e patient·e souffrant de diabète sucré?

	a. Activité sportive	Certain	Probable	Deviné
	b. Infections fébriles	Certain	Probable	Deviné
	c. Consommation de grandes quantités de caféine (par ex. plus de 6 tasses de café/thé)	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

102

Q: Quel est le mécanisme à l’origine de l’efficacité antinéoplasique du méthotrexate, un agent chimiothérapeutique?

	a. Alkylation des brins d’ADN	Certain	Probable	Deviné
	b. Blocage des processus métaboliques dépendant de l’acide folique	Certain	Probable	Deviné
	c. Perturbation de la formation du fuseau mitotique	Certain	Probable	Deviné
	d. Diminution de la synthèse de l’adénosine- et de la guanosine-monophosphate	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Une jeune femme se présente aux urgences. Elle se plaint de douleurs au niveau de l’articulation du genou droit après une chute au sport. Elle garde le genou en position antalgique. L’extension active de la jambe augmente les douleurs. La rotation externe passive de la jambe fléchie à 90° accentue les douleurs au niveau de la partie médiale de l’interligne articulaire (Steinmann I positif). De plus, vous notez un tiroir antérieur et un test de Lachmann positif ainsi qu’un bâillement latéral en valgus passif (« stress test »).

103

Q: Quel est votre diagnostic clinique présumé avant de demander des explorations radiologiques?

	a. Rupture du ligament croisé antérieur avec lésion du ménisque médial et lésion du ligament collatéral médial	Certain	Probable	Deviné
	b. Lésion isolée du ligament croisé postérieur	Certain	Probable	Deviné
	c. Lésion du ménisque latéral et rupture du ligament croisé antérieur avec lésion combinée du ligament collatéral latéral	Certain	Probable	Deviné
	d. Lésion du ligament croisé antérieur dans le cadre d’une rupture du tendon rotulien	Certain	Probable	Deviné
	e. Lésion de la corne postérieure du ménisque latéral avec rupture du ligament croisé postérieur et subluxation de la patella	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Je ne sais pas la réponse

104

Q: Quel est le résultat clinique caractéristique d'une arthrite réactionnelle?

a. Uvéite antérieure unilatérale	Certain	Probable	Deviné
b. Diarrhées	Certain	Probable	Deviné
c. Arthrite purulente	Certain	Probable	Deviné
d. Cystite aiguë	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

105

Une femme de 65 ans se plaint d'une hématurie macroscopique intermittente et indolore. Celle-ci serait présente depuis des semaines. Au moment de la consultation médicale, l'urine est claire et limpide. La bandelette urinaire et l'analyse d'urines qui s'ensuit ne révèlent aucune anomalie, hormis une forte augmentation du nombre d'érythrocytes. L'échographie et l'examen physique sont sans particularité.

Q: Quelle est l'étape diagnostique suivante la plus appropriée?

a. CT-scan de la vessie	Certain	Probable	Deviné
b. Endoscopie de la vessie	Certain	Probable	Deviné
c. Ponction rénale	Certain	Probable	Deviné
d. Examen cytbactériologique des urines à la recherche de Mycobacterium tuberculosis	Certain	Probable	Deviné
e. Imagerie par résonance magnétique du corps entier	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

106

On relève chez un patient le status sérologique suivant : Ag HBs négatif, Ag HBe négatif, anti-HBc positif, anti-HBs positif.

Q: En faveur de quel stade d'évolution d'une infection par le virus de l'hépatite B ces résultats parlent-ils le plus probablement?

a. Phase d'incubation	Certain	Probable	Deviné
b. Hépatite aiguë	Certain	Probable	Deviné
c. Infection ancienne	Certain	Probable	Deviné
d. Hépatite chronique	Certain	Probable	Deviné
e. état post-vaccination	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

107

La rupture du pénis constitue le traumatisme fermé du pénis le plus fréquent. Une anamnèse détaillée et un examen physique complet confirment généralement le diagnostic. Dans certains cas, une imagerie est toutefois indiquée.

Q: Outre l'échographie classique, quelle est la méthode d'imagerie la plus susceptible de confirmer une rupture dans les cas incertains?

a. Scintigraphie osseuse	Certain	Probable	Deviné
--------------------------	---------	----------	--------

	a. Cavernographie et radioscopie	Certain	Probable	Deviné
	b. Angioscanographie	Certain	Probable	Deviné
	c. Scintigraphie	Certain	Probable	Deviné
	d. Tomographie par émission de positons	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

108

Vous voyez aux urgences un jeune homme un peu négligé, chez qui vous remarquez des troubles de l'articulation et de la déglutition ainsi que des mouvements non coordonnés des muscles du visage et du cou. La seule information que vous recevez de ses proches est qu'il suit un traitement psychiatrique depuis quelques semaines, où on lui a prescrit des médicaments. Il les prend conformément aux prescriptions médicales.

Q: Quelle est la cause la plus probable de ces symptômes?

	a. Intoxication à l'héroïne	Certain	Probable	Deviné
	b. Symptômes de sevrage dans le cadre d'un abus de diazépam	Certain	Probable	Deviné
	c. Phénomène on-off dans le cadre d'une maladie de Parkinson	Certain	Probable	Deviné
	d. Dyskinésies orofaciales aiguës dues aux neuroleptiques	Certain	Probable	Deviné
	e. Ivresse pathologique dans le cadre d'un alcoolisme	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

109

Un patient anesthésié développe une hyperthermie maligne, complication rare de l'anesthésie générale.

Q: Outre les mesures physiques et l'apport de volume, quel est le médicament de choix?

	a. Paracétamol	Certain	Probable	Deviné
	b. Dantrolène	Certain	Probable	Deviné
	c. Thiopental	Certain	Probable	Deviné
	d. Nifédipine	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

110

Après avoir subi une transplantation rénale il y a quelques mois, un patient se rend au service ambulatoire de transplantation pour un contrôle de suivi. Le laboratoire révèle une augmentation de la créatinine sérique de 1,3 à 2,2 mg/dl (norme : <1,2 mg/dl).

Q: Quel résultat est le plus évocateur d'une réaction de rejet aigu contre le rein greffé?

	a. Infiltrats lymphocytaires interstitiels dans l'échantillon de biopsie rénale	Certain	Probable	Deviné
	b. Leucopénie	Certain	Probable	Deviné
	c. Alcalose métabolique	Certain	Probable	Deviné
	d. Mise en évidence d'érythrocytes dysmorphiques dans l'urine	Certain	Probable	Deviné
	e. Dysurie avec pollakiurie	Certain	Probable	Deviné

Je ne sais pas la réponse

111

Aux urgences, vous souhaitez pratiquer une anesthésie sur un patient éveillé. Pour l'intubation, vous avez généralement besoin d'un myorelaxant.

Q: Lequel des médicaments suivants appartient à ce groupe de substances?

a. Kétamine	Certain	Probable	Deviné
b. Midazolam	Certain	Probable	Deviné
c. Fentanyl	Certain	Probable	Deviné
d. Orciprénaline	Certain	Probable	Deviné
e. Chlorure de suxaméthonium	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

112

Une jeune patiente avec une dentition parfaitement saine présente de manière aiguë une tuméfaction croissante de la région submandibulaire.

Q: Quelle en est la cause la plus probable?

a. Kyste cervical latéral	Certain	Probable	Deviné
b. Lymphadénite submandibulaire	Certain	Probable	Deviné
c. Infection odontogène	Certain	Probable	Deviné
d. Tumeur des glandes salivaires	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

113

Un employé de 44 ans atteint de diabète de type I présente une protéinurie de 970 mg/24h (norme : 60-150 mg/24h), sa pression artérielle s'élève à 160/96 mmHg (norme : 120-129/80-84 mmHg) et sa créatinine sérique est de 1.38 mg/dl (norme : < 1,2 mg/dl).

Q: Quelle est la mesure thérapeutique la plus efficace pour ralentir la progression d'une néphropathie diabétique manifeste?

a. Régime pauvre en protéines	Certain	Probable	Deviné
b. Restauration durable de l'équilibre glycémique (normoglycémie)	Certain	Probable	Deviné
c. Normalisation durable de la pression artérielle	Certain	Probable	Deviné
d. éviter la nicotine	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

114

Les modifications régulatrices du débit cardiaque (DC) sont également possibles sur le cœur transplanté.

Q: Par quel mécanisme une augmentation du DC est-elle obtenue?

a. Réduction du temps de remplissage	Certain	Probable	Deviné
b. Prolongation du temps de conduction	Certain	Probable	Deviné

	b. Prolongation du temps de conduction	Certain	Probable	Deviné
	c. Augmentation de la pression aortique	Certain	Probable	Deviné
	d. Diminution du volume télédiastolique	Certain	Probable	Deviné
	e. Augmentation de la précharge	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

115

Q: Lequel des facteurs énumérés ci-dessous favorise l'augmentation du compte plaquettaire in vivo après la transfusion d'un concentré plaquettaire d'aphérèse chez les patient·e·s polytransfusé·e·s?

	a. Identité des caractéristiques rhésus entre le receveur et le donneur	Certain	Probable	Deviné
	b. Hémorragie manifeste	Certain	Probable	Deviné
	c. Septicémie	Certain	Probable	Deviné
	d. Compatibilité HLA entre le receveur et le donneur	Certain	Probable	Deviné
	e. Coagulation intravasculaire disséminée	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

116

Q: Qu'est-ce qui provoque l'arythmie sinusale respiratoire du cœur?

	a. Développement d'un emphysème pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
	b. Effort physique soutenu	Certain	Probable	Deviné
	c. Effet de l'atropine sur le cœur	Certain	Probable	Deviné
	d. Fluctuation de la stimulation vagale du cœur	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

117

Q: Qu'est-ce qui fait partie des contre-indications à l'administration de sulfonylurées?

	a. Traitement par insuline	Certain	Probable	Deviné
	b. Insuffisance cardiaque	Certain	Probable	Deviné
	c. Insuffisance rénale sévère	Certain	Probable	Deviné
	d. Âge avancé	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

118

Vous effectuez un examen neurologique des nerfs crâniens. Après avoir demandé au patient de fermer les yeux, vous remarquez qu'il reste une fente palpébrale au niveau de l'œil droit et que le globe bascule vers le peau et en direction temporale. L'œil gauche peut être fermé normalement.

Q: Quel est le terme correct pour documenter cette observation?

	a. Signe de Charles Bell à droite	Certain	Probable	Deviné
--	-----------------------------------	--------------------	---------------------	-------------------

	b. Signe de Dalrymple à droite	Certain	Probable	Deviné
	c. Signe de von Græfe à droite	Certain	Probable	Deviné
	d. Syndrome de Horner à droite	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

119 Un homme de 75 ans a présenté des douleurs osseuses mal définies. Le laboratoire a montré une vitesse de sédimentation (VS) extrêmement élevée, une hyperprotéïnémie et une protéinurie. L'examen radiologique a révélé de multiples foyers ostéolytiques du squelette.

Q: Quelle est la maladie la plus probable?

	a. Métastases d'un carcinome solide	Certain	Probable	Deviné
	b. Maladie de Waldenström (immunocytome)	Certain	Probable	Deviné
	c. Myélome multiple	Certain	Probable	Deviné
	d. Syndrome myéloprolifératif	Certain	Probable	Deviné
	e. Syphilis osseuse	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

120 Vous recevez un patient qui se présente avec une forte fièvre. Vous retrouvez le tableau clinique d'une endocardite avec une splénomégalie et des hémorragies pétéchiales périphériques. Il ne décrit aucun antécédent d'intervention sur les valves cardiaques.

Q: Quel est l'agent pathogène le plus fréquemment responsable d'une endocardite avec atteinte des valves cardiaques natives?

	a. Candida albicans	Certain	Probable	Deviné
	b. Streptococcus viridans	Certain	Probable	Deviné
	c. Enterococcus faecalis	Certain	Probable	Deviné
	d. Staphylococcus epidermidis	Certain	Probable	Deviné
	e. Staphylococcus aureus	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

121 **Q: Que représente la courbe du travail cardiaque?**

	a. Ensemble du travail cardiaque	Certain	Probable	Deviné
	b. Travail d'accélération	Certain	Probable	Deviné
	c. Rendement du travail cardiaque	Certain	Probable	Deviné
	d. Travail pression-volume	Certain	Probable	Deviné
	e. Vitesse d'éjection ventriculaire	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

				Je ne sais pas la réponse
122	Les fractures transitionnelles du tibia distal sont des fractures typiques de l'âge de transition entre l'adolescent et l'adulte. Le début de la fermeture physiologique de la plaque de croissance épiphysaire du tibia est responsable de la patho-anatomie particulière de ces fractures. Selon von Lær, ces fractures sont classées en fonction de leur localisation.			
	Q: À l'âge de transition, quand parle-t-on de « fracture triplane I » du tibia distal?			
	a. En présence d'une lésion épiphysaire.	Certain	Probable	Déviné
	b. En plus de la fracture épiphysaire, il y a un coin métaphysaire, mais le trait de fracture ne passe pas dans l'épiphyse.	Certain	Probable	Déviné
	c. En plus de la fracture épiphysaire, il y a un coin métaphysaire, et le trait de fracture se prolonge dans l'épiphyse.	Certain	Probable	Déviné
	Je ne sais pas la réponse			
123	Une surface lisse des cordes vocales est indispensable à leur fermeture lors de la phonation.			
	Q: Quel épithélium recouvre les cordes vocales?			
	a. épithélium pavimenteux simple	Certain	Probable	Déviné
	b. épithélium pavimenteux pluristratifié non kératinisé	Certain	Probable	Déviné
	c. épithélium pseudostratifié cilié contenant des cellules en gobelet	Certain	Probable	Déviné
	d. épithélium cylindrique simple	Certain	Probable	Déviné
	e. épithélium cubique simple	Certain	Probable	Déviné
	Je ne sais pas la réponse			
124	Un garçon de 7 ans souffre de forts maux de gorge, de difficultés à déglutir et d'un état fébrile depuis deux jours. À l'inspection, le pédiatre constate que les amygdales palatines sont rouges, gonflées et recouvertes d'un enduit blanchâtre.			
	Q: Lequel des agents bactériens suivants est le plus susceptible d'être responsable de cette infection?			
	a. Corynebacterium diphtheriæ	Certain	Probable	Déviné
	b. Pseudomonas æruginosa	Certain	Probable	Déviné
	c. Staphylococcus aureus	Certain	Probable	Déviné
	d. Streptococcus pyogenes	Certain	Probable	Déviné
	Je ne sais pas la réponse			
125	Chez un patient de 30 ans, on relève la constellation sérologique suivante : test d'hémagglutination de Treponema pallidum (TPHA) 1:640 positif, test « Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) » 1:4 positif.			
	Q: Quel test doit être effectué pour déterminer par la suite s'il s'agit d'une infection récente ou d'une cicatrice sérologique?			
	a. Répétition du test TPHA	Certain	Probable	Déviné
	b. Répétition du test VDRL	Certain	Probable	Déviné

	b. Repetition du test VDRL	Certain	Probable	Deviné
	c. Test de fixation des anticorps anti-tréponèmes IgM par fluorescence	Certain	Probable	Deviné
	d. Test d’immobilisation de Treponema pallidum	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

126 Q: Quel est le moteur de la filtration glomérulaire?

	a. Gradient de concentration	Certain	Probable	Deviné
	b. Gradient de charge	Certain	Probable	Deviné
	c. Pression osmotique	Certain	Probable	Deviné
	d. Pression hydrostatique	Certain	Probable	Deviné
	e. Pression osmotique colloïdale	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

127 Vous êtes médecin-assistant·e au service de chirurgie générale et prenez en charge un patient de 39 ans ayant subi il y a deux jours une thyroïdectomie totale en raison de suspicion de carcinome papillaire de la thyroïde. Après une évolution post-opératoire sans complications, il signale des « fourmillements » d’intensité croissante, surtout dans les doigts. À l’examen clinique, on trouve aussi un signe de Chvostek positif, c’est-à-dire que la percussion percutanée des branches du nerf facial provoque une contraction des muscles de la face.

Q: Quel paramètre biologique présent dans le sérum du patient doit être particulièrement surveillé dans ce contexte?

	a. Potassium	Certain	Probable	Deviné
	b. Calcium	Certain	Probable	Deviné
	c. Magnésium	Certain	Probable	Deviné
	d. Thyroxine	Certain	Probable	Deviné
	e. Triiodothyronine	Certain	Probable	Deviné
	f. TSH	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

128 Une femme de 65 ans souffrant depuis longtemps d’une polyarthrite rhumatoïde sévère, sous traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticostéroïdes et méthotrexate, est soudainement prise de vomissements ayant l’aspect du marc de café, ceci sans symptômes gastriques préalables.

Q: Quelle en est la cause la plus probable?

	a. Hémorragie de varices œsophagiennes	Certain	Probable	Deviné
	b. Ulcère duodénal hémorragique lié à Helicobacter pylori	Certain	Probable	Deviné
	c. Ulcère gastrique hémorragique dans le cadre d’une gastrite aiguë	Certain	Probable	Deviné
	d. Hémorragie sur thrombopénie	Certain	Probable	Deviné

	Je ne sais pas la réponse		
129	Un patient présente depuis quelques jours une tuméfaction nette, peu douloureuse et d'intensité variable dans la région submandibulaire. Elle est particulièrement importante au moment des repas. Q: Quelle en est la cause la plus probable?		
	a. Inflammation de la glande submandibulaire	Certain	Probable
	b. Inflammation d'un nœud lymphatique	Certain	Probable
	c. Calcul salivaire	Certain	Probable
	d. Infiltration submandibulaire	Certain	Probable
	Je ne sais pas la réponse		
130	Q: Quelle est la caractéristique du caryogramme des personnes atteintes d'un syndrome d'Ullrich-Turner?		
	a. Il peut présenter une mosaïque, par exemple composée de lignées cellulaires avec un, deux ou trois chromosomes X	Certain	Probable
	b. Le caryotype 47,XXY est typique	Certain	Probable
	c. Il présente typiquement une aneuploïdie des autosomes	Certain	Probable
	Je ne sais pas la réponse		
131	Q: Quel groupe de médicaments a un effet antipsychotique?		
	a. Benzodiazépines	Certain	Probable
	b. Barbituriques	Certain	Probable
	c. Butyrophénones	Certain	Probable
	d. Opiacés	Certain	Probable
	Je ne sais pas la réponse		
132	Chez un homme, une analyse chromosomique a révélé la présence de deux chromosomes Y (formule chromosomique 47,XYY). Q: Quel est le risque pour ses enfants?		
	a. Ses fils ont un risque de 100 % d'hériter de l'aberration de leur père.	Certain	Probable
	b. Ses fils ont un risque de 50 % d'hériter de l'aberration de leur père.	Certain	Probable
	c. Il n'y a pas de risque accru d'aberration chromosomique.	Certain	Probable
	d. Les hommes XYY sont stériles. Il ne faut pas s'attendre à une descendance biologique.	Certain	Probable
	Je ne sais pas la réponse		

	a. En cas d'état de mal épileptique	Certain	Probable	Deviné
	b. En cas de delirium tremens	Certain	Probable	Deviné
	c. En cas de myasthénie grave	Certain	Probable	Deviné
	d. En cas de maladie de Parkinson	Certain	Probable	Deviné
	e. En cas de troubles de l'endormissement	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

	a. Raideur de la nuque	Certain	Probable	Deviné
	b. Faiblesse musculaire ascendante	Certain	Probable	Deviné
	c. Langue framboisée	Certain	Probable	Deviné
	d. Parésie spastique	Certain	Probable	Deviné
	e. Sensations douloureuses à prédominance distale	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

Chez un patient cachectique de 74 ans, on note après un alitement prolongé dû à une faiblesse et un abattement généralisés, les premiers signes d'atrophie musculaire, une raideur articulaire et une apathie générale. Concernant la cause de la faiblesse générale, vous pensez également à une insuffisance rénale chronique en raison de la faible élimination d'urine. Cependant, le taux sérique de créatinine est tout à fait normal, raison pour laquelle vous excluez une insuffisance rénale.

Q: Pourquoi devriez-vous reconsidérer cette « exclusion » de manière critique?

	a. Sans pH urinaire, une évaluation de la créatinine n'est pas possible	Certain	Probable	Deviné
	b. On a oublié de contrôler le taux sérique de sodium	Certain	Probable	Deviné
	c. Seules l'urographie excrétoire et l'échographie peuvent clarifier la situation	Certain	Probable	Deviné
	d. La fonction rénale ne peut pas être évaluée sans avoir déterminé la clairance de la créatinine	Certain	Probable	Deviné
	e. La diminution de la production de créatinine peut, dans ce cas, simuler une fonction rénale normale	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

	a. Début après l'âge de 45 ans, raideur matinale, amélioration par le repos	Certain	Probable	Deviné
	b. Début avant l'âge de 45 ans, raideur matinale, amélioration par le mouvement	Certain	Probable	Deviné
	c. Début après l'âge de 45 ans, pas de raideur matinale, amélioration par le repos	Certain	Probable	Deviné

137 Une patiente de 31 ans, dont les dernières règles remontent à 2 semaines, est admise pour des douleurs abdominales aiguës et sévères. Il n'y a pas d'élévation de la température, les leucocytes sont à la limite supérieure. Le test de grossesse est négatif. L'échographie révèle la présence de liquide libre dans le cul-de-sac de Douglas.

a. Fausse couche incomplète	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Annexite	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Rein pelvien	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Myome intraligamentaire dont l'approvisionnement est perturbé	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
e. Kyste ovarien rompu	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

a. Streptocoques B	Certain	Probable	Deviné
b. Staphylocoques à coagulase négative	Certain	Probable	Deviné
c. Neisseria	Certain	Probable	Deviné
d. Pseudomonas	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Q: Lequel des médicaments cités ci-dessous est contre-indiqué pour le traitement de ce patient?			
a. Adrénaline	☐	☐	☐
b. Amiodarone	☐	☐	☐
c. Digitoxine	☐	☐	☐
d. Furosémide	☐	☐	☐
e. Trinitrate de glycérol	☐	☐	☐
Je ne sais pas la réponse			

Une femme de 35 ans, bipare, se présente en salle d'accouchement à 32 semaines d'aménorrhée avec des saignements indolores de couleur rouge clair. On obtient les résultats suivants : col de l'utérus non dilaté mais complètement effacé, saignements ex utero très abondants de couleur rouge clair, fond de l'utérus situé au niveau de l'arc costal, pas de douleur à la pression de l'utérus, contractions irrégulières au cardiotocogramme (CTG), rythme des bruits du cœur fœtal à 120-130/min.

bruits du cœur fœtal à 120-130/minute.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable?

	a. Accentuation des pertes vaginales sanglantes annonçant le début du travail	Certain	Probable	Deviné
	b. Placenta prævia	Certain	Probable	Deviné
	c. Rupture utérine	Certain	Probable	Deviné
	d. Décollement placentaire prématuré	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

141 Q: Quel est le médicament en inhalation le plus approprié pour calmer une crise d’asthme allergique?

	a. Budésonide	Certain	Probable	Deviné
	b. Acide cromoglicique	Certain	Probable	Deviné
	c. Bromure d’ipratropium	Certain	Probable	Deviné
	d. Salbutamol	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

142 En raison d’une fatigue et d’un manque de performance depuis deux semaines, une patiente de 26 ans se présente à votre cabinet. L’examen clinique est sans particularité, mis à part une splénomégalie. Vous demandez une analyse de sang. Dans l’après-midi, le laboratoire vous appelle, car des blastes contenant des corps d’Auer ont été observés sur le frottis sanguin.

Q: Quel est le diagnostic?

	a. Leucémie lymphoïde aiguë	Certain	Probable	Deviné
	b. Leucémie myéloïde aiguë	Certain	Probable	Deviné
	c. Leucémie lymphoïde chronique	Certain	Probable	Deviné
	d. Leucémie myéloïde chronique	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			

143 Un patient de 28 ans se plaint de selles volumineuses, de défécations fréquentes, de ballonnements et d’une perte pondérale croissante depuis des mois. Les valeurs biologiques sont normales, à l’exception d’un taux de vitamine B12 abaissé et des anticorps endomysiaux de type IgA positifs.

Q: De laquelle des maladies suivantes s’agit-il le plus probablement?

	a. Colite ulcéreuse	Certain	Probable	Deviné
	b. Insuffisance pancréatique exocrine	Certain	Probable	Deviné
	c. Maladie de Crohn	Certain	Probable	Deviné
	d. Colite pseudomembraneuse	Certain	Probable	Deviné
	e. Maladie cœliaque	Certain	Probable	Deviné

	Je ne sais pas la réponse			
144	Q: Dans les stades précoces de quel type de tumeur l'hépatectomie totale avec transplantation hépatique est-elle justifiée?			
	a. Carcinomes hépatocellulaires sur cirrhose	Certain	Probable	Deviné
	b. Carcinomes des voies biliaires extra-hépatiques proximales	Certain	Probable	Deviné
	c. Cholangiocarcinomes	Certain	Probable	Deviné
	d. Hyperplasies nodulaires focales	Certain	Probable	Deviné
	e. Hémangiomes	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			
145	La persistance du canal omphalo-mésentérique peut aboutir à un diverticule de Meckel. Q: Quelle partie de l'intestin est le siège d'un tel diverticule?			
	a. Duodénum	Certain	Probable	Deviné
	b. Iléon	Certain	Probable	Deviné
	c. Cæcum	Certain	Probable	Deviné
	d. Côlon ascendant	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			
146	Q: Quel syndrome provoque le plus souvent un thorax en entonnoir?			
	a. Syndrome de Horner	Certain	Probable	Deviné
	b. Syndrome de Marfan	Certain	Probable	Deviné
	c. Syndrome de Poland	Certain	Probable	Deviné
	d. Syndrome d'Eisenmenger	Certain	Probable	Deviné
	Je ne sais pas la réponse			
147	Q: Lequel des effets secondaires suivants est fréquemment observé avec les antipsychotiques de type butyrophénone, comme l'halopéridol?			
	a. Chute de cheveux	Certain	Probable	Deviné
	b. Thrombocytopénie	Certain	Probable	Deviné
	c. Dyskinésies faciales	Certain	Probable	Deviné
	d. Agranulocytose	Certain	Probable	Deviné
	e. Lésions des tubules rénaux	Certain	Probable	Deviné

148 Un patient se présente aux urgences avec de la fièvre et une rougeur diffuse, superficielle et douloureuse de la peau au niveau de la jambe droite. On note une ligne nette de démarcation entre les parties saines de la peau et celles atteintes ainsi qu’une légère tuméfaction.

Q: Lequel des diagnostics suivants est le plus probable?

a. Abscès	Certain	Probable	Deviné
b. Empyème	Certain	Probable	Deviné
c. érysipèle	Certain	Probable	Deviné
d. Lymphangite	Certain	Probable	Deviné
e. Thrombophlébite	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

149 Q: Lequel des principes thérapeutiques cités ci-dessous est le plus approprié comme mesure de première intention pour prévenir une insuffisance rénale après une rhabdomyolyse aiguë ?

a. Réaliser une dialyse en urgence	Certain	Probable	Deviné
b. Initier une perfusion continue de diurétiques de l'anse	Certain	Probable	Deviné
c. Assurer un apport hydrique équilibré avec alcalinisation de l'urine	Certain	Probable	Deviné
d. Assurer un apport suffisant en glucose	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Terminez le test

< Previous

Next >

