

1

Q: Quel groupe de médicaments indiqué entraîne, après une prise prolongée de doses élevées, ce que l'on nomme le syndrome de Cushing ?

a. Antirhumatismaux non stéroïdiens

b. Glucocorticoïdes

c. Biguanides

d. Antibiotiques

e. Antiarythmiques

Je ne sais pas la réponse

2

Q: Vous suspectez une laryngite aiguë chez un patient et réalisez une laryngoscopie. Quels résultats confirmeraient ce diagnostic suspecté ?

a. Ulcération

b. Paralysie des cordes vocales

c. Ankylose des articulations laryngées

d. Œdème et hyperémie

Je ne sais pas la réponse

3

Un patient de 26 ans consulte le service d'urgence avec de fortes douleurs au flanc droit. Celles-ci auraient débuté tôt le matin et seraient fluctuantes. Il n'y a pas de fièvre ni de symptômes végétatifs associés. Vous effectuez une anamnèse détaillée et procédez à un examen clinique. L'échographie ne montre pas d'ectasie rénale. Les analyses de laboratoire habituelles ne révèlent rien d'anormal. Votre diagnostic préliminaire est celui d'une colique néphrétique aiguë.

Q: Quelle est la conduite à tenir la plus appropriée ?

a. Mise en place d'une sonde urinaire

b. Laparoscopie exploratoire

c. Spasmoanalgésie

d. Limitation de la consommation d'alcool

e. Thérapie antibiotique

Je ne sais pas la réponse

4

Q: Quel score permet d'estimer la fréquence des AVC par an chez les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire ?

a. Score de Wells

b. Score HAS-BLED

c. Score CHA2DS2-VASc

d. Indice PESI

e. Échelle de Hamilton

Je ne sais pas la réponse

5

Un patient de 70 ans se plaint de douleurs thoraciques du côté droit. L'inspection révèle une rougeur arciforme avec des vésicules et des lésions croûteuses sur la moitié droite du thorax, au niveau dorsal. Le médecin diagnostique un zona.

Q: Quelle infection préalable est à l'origine de cette maladie ?

a. Infection par le virus varicella-zoster

b. Infection par le virus de la rougeole

c. Infection par le virus de la rubéole

d. Infection par le cytomégalovirus

e. Herpès néonatal

6

Q: Qu'est-ce qui est considéré comme un facteur de risque pour le cancer du sein ?

a. Antécédents familiaux positifs

b. Première grossesse précoce

c. Abondance d'enfants

d. Longues périodes d'allaitement

e. Ménarche tardive

Je ne sais pas la réponse

7

Q: Par laquelle des maladies suivantes est provoquée une stéatorrhée?

a. Insuffisance pancréatique endocrine

b. Insuffisance pancréatique exocrine

c. Hyperthyroïdie

Je ne sais pas la réponse

8

Q: Quelle carence est en cause lors d une anémie associée à une insuffisance rénale terminale ?

a. carence en vitamine B12

b. carence en fer

c. carence en érythropoïétine

d. carence en prolactine

e. carence en biotine

Je ne sais pas la réponse

9

Q: Parmi les plaintes, signes cliniques ou diagnostics suivants, lequel ou laquelle nécessite impérativement une bronchoscopie diagnostique ?

a. Crise d'asthme aiguë

b. Crachats purulents

c. Bronchites récidivantes

d. Hémoptysie

e. Pseudo-croup

10 Q: Quelle maladie peut provoquer une gynécomastie chez un homme ?

- a. Glaucome
- b. Cancer du poumon
- c. Kératite actinique
- d. Artérite à cellules géantes

Je ne sais pas la réponse

11

Chez un patient de 67 ans, on diagnostique un herpès zoster comme cause des douleurs thoraciques gauches dont il se plaint.

Q: De la réactivation de laquelle des maladies infectieuses suivantes s'agit-il ?

a. Varicelle

Certain

Probable

Deviné

b. Rubéole

Certain

Probable

Deviné

c. Oreillons

Certain

Probable

Deviné

d. Rougeole

Certain

Probable

Deviné

e. Mononucléose

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

12 Q: Dans lequel des troubles de l'équilibre acido-basique indiqués trouve-t-on une respiration approfondie ?

a. Acidose métabolique partiellement compensée	☒ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Acidose respiratoire partiellement compensée	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Alcalose respiratoire partiellement compensée	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Alcalose métabolique partiellement compensée	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

13 Un employé de bureau de 52 ans se plaint depuis deux mois d'une diminution de ses performances et d'une asthénie progressive. Il fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 30 ans et ne prend aucun médicament. Aucun antécédent médical pertinent n'est connu. Depuis un mois, il présente une toux avec des crachats de couleur brunâtre. L'analyse de sang révèle les valeurs suivantes : Hb 6,5 g/dl (norme 13,9 - 17,5 g/dl), leucocytes 18 G/l (norme 4,5 - 11), thrombocytes 32 G/l (norme 150 - 400). Au frottis, on remarque quelques précurseurs de la granulocytopoïèse et peu de normoblastes.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Lésions toxiques de la moelle osseuse dues à la nicotine	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Pancytopénie en cas de carcinome pulmonaire métastatique	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Purpura thrombocytopénique idiopathique (thrombocytopénie immune)	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Leucémie myéloïde aiguë	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

13

Un employé de bureau de 52 ans se plaint depuis deux mois d'une diminution de ses performances et d'une asthénie progressive. Il fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 30 ans et ne prend aucun médicament. Aucun antécédent médical pertinent n'est connu. Depuis un mois, il présente une toux avec des crachats de couleur brunâtre. L'analyse de sang révèle les valeurs suivantes : Hb 6,5 g/dl (norme 13,9 - 17,5 g/dl), leucocytes 18 G/l (norme 4,5 - 11), thrombocytes 32 G/l (norme 150 - 400). Au frottis, on remarque quelques précurseurs de la granulocytopoïèse et peu de normoblastes.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Lésions toxiques de la moelle osseuse dues à la nicotine	Certain	Probable	Deviné
b. Pancytopenie en cas de carcinome pulmonaire métastatique	Certain	Probable	Deviné
c. Purpura thrombocytopénique idiopathique (thrombocytopénie immune)	Certain	Probable	Deviné
d. Leucémie myéloïde aiguë	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

14

En jouant au football, un jeune homme s'est blessé au genou. Sa jambe peut être excessivement déplacée antérieurement lorsque le genou est fléchi à 90°.

Q: Quelle est la structure anatomique la plus susceptible d'être lésée ?

a. Ménisque latéral	Certain	Probable	Deviné
b. Ménisque médial	Certain	Probable	Deviné
c. Patella	Certain	Probable	Deviné
d. Ligament croisé antérieur	Certain	Probable	Deviné

15

Chez les femmes, les tumeurs de l'estomac métastasent parfois dans les ovaires, qui apparaissent alors souvent agrandis de manière symétrique.

Q: Sous quel terme cette métastase est-elle connue ?

a. Tumeur de Wilms	Certain	Probable	Deviné
b. Tumeur de Brenner	Certain	Probable	Deviné
c. Tumeur de Krukenberg	Certain	Probable	Deviné
d. Tumeur de Klatskin	Certain	Probable	Deviné
e. Tumeur de Grawitz	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

16

Q: Pour quelle maladie infectieuse un donneur est-il exclu à vie du don de sang total ?

a. Maladie de Lyme	Certain	Probable	Deviné
b. Hépatite A	Certain	Probable	Deviné
c. Paludisme	Certain	Probable	Deviné
d. Herpès simplex	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

17 Q: Quel est l'agent pathogène le plus fréquent dans les infections urinaires ?

a. Escherichia coli	Certain	Probable	Deviné
b. Proteus mirabilis	Certain	Probable	Deviné
c. Pseudomonas aeruginosa	Certain	Probable	Deviné
d. Staphylococcus aureus	Certain	Probable	Deviné
e. Enterococcus faecalis	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

18 Un patient de 35 ans se présente chez le médecin en raison de douleurs aiguës au flanc droit avec irradiation vers l'aîne droite, ainsi que de nausées et de vomissements. A l'échographie, le bassinet rénal droit est ectasique au premier degré. Le sédiment urinaire révèle une micro-hématurie.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. kystes rénaux	Certain	Probable	Deviné
b. Urétérolithiase	Certain	Probable	Deviné
c. Pyélonéphrite aiguë	Certain	Probable	Deviné
d. Fracture rénale	Certain	Probable	Deviné
e. Tumeur rénale	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

19

Chez un patient de 30 ans, récemment immigré en provenance d'Europe de l'Est, on constate radiologiquement un foyer dans le lobe supérieur droit. Le patient signale également un état subfébrile, une perte de poids et des sueurs nocturnes. Il présente une toux depuis des mois. Il aurait remarqué, depuis trois jours, des crachats teintés de sang.

Q: Quel est le diagnostic de suspicion le plus probable ?

a. Embolie pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
b. Cancer bronchique	Certain	Probable	Deviné
c. Tuberculose	Certain	Probable	Deviné
d. Asbestose	Certain	Probable	Deviné
e. Bronchopneumonie	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

20

Q: Quelle est la cause la plus fréquente d'un pneumothorax ?

a. Stress de cisaillement dû à une inspiration forcée	Certain	Probable	Deviné
b. Diminution de l'observance thérapeutique en cas de fibrose pulmonaire	Certain	Probable	Deviné
c. Lésion traumatique externe du poumon	Certain	Probable	Deviné
d. Apparition idiopathique en cas de facteur de risque tabagique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

21 Q: Quel est le muscle fléchisseur le plus puissant de l'articulation de la hanche ?

a. M. grand adducteur	Certain	Probable	Deviné
b. M. iliopsoas	Certain	Probable	Deviné
c. M. biceps fémoral	Certain	Probable	Deviné
d. M. quadriceps fémoral	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

22 Q: Quelle désignation des plans du corps correspond à la désignation radiologique "axial" ?

a. sagittal	Certain	Probable	Deviné
b. coronal	Certain	Probable	Deviné
c. de face	Certain	Probable	Deviné
d. transversal	Certain	Probable	Deviné
e. médial	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

23

Un patient de 26 ans vient vous voir en boitant et vous signale en outre des yeux douloureux et des brûlures en urinant. Dans son anamnèse, il mentionne une diarrhée survenue il y a quatre semaines. Lors de l'examen physique, vous remarquez que les articulations des genoux sont rouges et chauds.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Lipodystrophie intestinale	Certain	Probable	Deviné
b. Spondylarthrite ankylosante	Certain	Probable	Deviné
c. Nécrose osseuse aseptique	Certain	Probable	Deviné
d. Arthrite réactive	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

24

Une patiente de 35 ans se rend chez son médecin généraliste et se plaint de céphalées, de troubles de la vision (scotomes) et de douleurs abdominales supérieures du côté droit. Elle est enceinte de 36 semaines.

Q: Quelle est la mesure diagnostique la plus importante dans cette situation ?

a. Examen ophtalmologique	Certain	Probable	Deviné
b. Gastroskopie	Certain	Probable	Deviné
c. Mesure de la pression artérielle	Certain	Probable	Deviné
d. Examen gynécologique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

25

Une primipare de 25 ans, à 37 semaines de grossesse, se présente à la clinique, très inquiète, avec un léger saignement vaginal brun et signale que les mouvements actifs de l'enfant ont cessé il y a quelques heures et qu'elle ressent en plus une douleur permanente dans le bas-ventre.

Q: Quel est le diagnostic de suspicion le plus probable ?

a. Métrorragies sur placenta praevia	Certain	Probable	Deviné
b. Décollement prématuré du placenta normalement positionné	Certain	Probable	Deviné
c. Saignement d'origine non gynécologique	Certain	Probable	Deviné
d. Etat de sommeil permanent du fœtus	Certain	Probable	Deviné
e. Incompatibilité de groupe sanguin	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

26

Une patiente de 53 ans se réveille le matin après une fête et ne peut plus relever le poignet et tendre les doigts de la main droite.

Q: Quel est le nerf le plus susceptible d'être affecté ?

a. N. axillaire	Certain	Probable	Deviné
b. racine nerveuse C8	Certain	Probable	Deviné
c. N. médian	Certain	Probable	Deviné
d. N. ulnaire	Certain	Probable	Deviné
e. N. radial	Certain	Probable	Deviné

27

Une jeune femme de 23 ans est adressée par son médecin généraliste à un gastro-entérologue en raison d'une diarrhée persistante depuis trois mois. Dans le cadre d'une coloscopie, des biopsies étagées sont prélevées. La pathologiste trouve dans les préparations des granulomes avec des cellules géantes.

Q: Quelle est la maladie inflammatoire de l'intestin la plus probable ?

a. Entérocolite à rotavirus	Certain	Probable	Deviné
b. Colite pseudomembraneuse	Certain	Probable	Deviné
c. Colite collagène	Certain	Probable	Deviné
d. Maladie de Crohn	Certain	Probable	Deviné
e. Colite ulcéreuse	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

28

Q: Quelle est une cause fréquente d'hypertrophie du muscle cardiaque dans la population ?

a. Hypothyroïdie	Certain	Probable	Deviné
b. Inactivité physique	Certain	Probable	Deviné
c. Hypertension artérielle	Certain	Probable	Deviné
d. Cardiomyopathie dilatée	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

29

Chez une patiente mince de 33 ans, une voussure ronde est visible au pli de l'aine en-dessous du ligament inguinal. Depuis quelques jours, elle se plaint de douleurs abdominales.

Q: Vous soupçonnez une hernie. Par quel orifice passe cette hernie ?

a. canal adducteur	Certain	Probable	Deviné
b. canal inguinal	Certain	Probable	Deviné
c. canal obturateur	Certain	Probable	Deviné
d. orifice musculaire	Certain	Probable	Deviné
e. orifice fémoral	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

30

L'ECG d'effort (ergométrie) est une méthode d'examen non invasive, généralement simple à réaliser, en cas de suspicion de maladie coronarienne.

Q: Quelle est une contre-indication connue à la réalisation d'une ergométrie ?

a. Une insuffisance cardiaque de stade NYHA II	Certain	Probable	Deviné
b. Une extrasystolie	Certain	Probable	Deviné
c. Une tension artérielle de 90/60 mmHg	Certain	Probable	Deviné
d. Signes d'ischémie aiguë à l'ECG de repos	Certain	Probable	Deviné
e. Antécédent d'infarctus du myocarde	Certain	Probable	Deviné

Vous hospitalisez un homme de 56 ans, qui a travaillé ces trois derniers mois dans le sud de l'Espagne, pour une pneumonie du lobe inférieur droit nouvellement diagnostiquée.

31

Q: Quelle considération est particulièrement importante dans le choix du traitement antibiotique de ce patient ?

a. Il s'agit probablement d'une pneumonie atypique.	Certain	Probable	Deviné
b. Une tuberculose s'est réactivée en raison du climat sur place.	Certain	Probable	Deviné
c. Un traitement antibiotique devrait tenir compte des éventuelles résistances propres à chaque pays.	Certain	Probable	Deviné
d. En raison de l'étiologie peu claire, le traitement antibiotique doit être particulièrement efficace au début.	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

32

Q: Quel critère fait partie de l'évaluation d'un nouveau-né selon le schéma APGAR ?

a. turgescence de la peau	Certain	Probable	Deviné
b. tonus musculaire	Certain	Probable	Deviné
c. ouverture des yeux	Certain	Probable	Deviné
d. temps de recapillarisation	Certain	Probable	Deviné
e. taux de lactate dans le sang capillaire	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

33

Chez les patients présentant un état métabolique hyperthyroïdien, un produit de contraste iodé ne peut être injecté par voie intraveineuse (i.v.) que selon des critères d'indication stricts et après une prémédication appropriée.

Q: Quelle est la conséquence la plus probable à laquelle vous devez vous attendre après l'injection ?

a. Renforcement de l'hyperthyroïdie	Certain	Probable	Deviné
b. hypokinésie	Certain	Probable	Deviné
c. Septicémie	Certain	Probable	Deviné
d. Hypothyroïdie	Certain	Probable	Deviné
e. Thyroïdite aiguë	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

34

Une femme enceinte se présente en consultation ambulatoire en indiquant qu'une gonorrhée aiguë a été diagnostiquée chez son mari et qu'elle a eu récemment des rapports sexuels avec lui. L'examen est sans particularité, le frottis avec coloration au bleu de méthylène ne révèle pas de diplocoques intraleucocytaires.

Q: Quelle est la procédure indiquée ?

a. mettre en culture l'agent pathogène et traiter sur la base de la culture	Certain	Probable	Deviné
b. demander à la patiente de revenir en cas d'apparition de symptômes	Certain	Probable	Deviné
c. Traiter avec de la ceftriaxone	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

35

Une consommation accrue d'aliments contenant certains acides gras est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires.

Q: Quelles sont les graisses les plus susceptibles d'être réduites dans l'alimentation pour limiter ce risque ?

a. Tous les acides gras

b. Acides gras monoinsaturés

c. Acides gras polyinsaturés

d. Acides gras saturés

Je ne sais pas la réponse

36

Une jeune fille de 13 ans, de taille normale, consulte pour une perte de poids et pour une agitation persistante, une tendance à transpirer et un important trouble du sommeil.

Q: Quelle est la maladie la plus probable ?

a. Maladie de Cushing

b. Hyperthyroïdie

c. Maladie d'Addison

d. Anorexie mentale

e. Syndrome d'Ullrich-Turner

Je ne sais pas la réponse

37

Une femme de 62 ans ressent, lors de travaux de jardinage, un mal de tête d'apparition soudaine et d'une intensité inhabituelle, irradiant dans la nuque et s'accompagnant de nausées. A l'arrivée du médecin du SMUR, la patiente est somnolente. Environ 3 semaines auparavant, un événement similaire s'était produit de manière passagère, mais aucun diagnostic n'avait été posé à l'époque.

Q: Parmi les diagnostics suivants, lequel est le plus probable ?

a. Traumatisme crânien	Certain	Probable	Deviné
b. Méningite chronique	Certain	Probable	Deviné
c. Hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée	Certain	Probable	Deviné
d. Méningiome de la fosse postérieure	Certain	Probable	Deviné
e. Syndrome douloureux chronique de la colonne cervicale	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

On prescrit à un patient la prise quotidienne d'un des cinq médicaments qui sont éliminés de l'organisme par

On prescrit à un patient la prise quotidienne d'une dose fixe d'un médicament qui n'est éliminé de l'organisme que par filtration rénale. Lors du contrôle sérologique de l'évolution après quelques semaines, on constate une augmentation du taux plasmatique du médicament, alors que le taux de créatinine plasmatique déterminé en parallèle reste constant.

Q: Comment expliquer cette divergence ?

a. Lorsque le débit de filtration glomérulaire (DFG) est normal, il y a un obstacle à l'écoulement de l'urine hors du rein.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

b. Le taux de créatinine ne change pas de manière significative tant que le DFG n'est pas fortement modifié.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

c. Le patient n'est pas fiable et oublie souvent de prendre son médicament.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

d. Le patient est végétarien et consomme donc trop peu d'aliments contenant de la créatinine.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

Je ne sais pas la réponse

39

Un patient est victime d'une brûlure à la main et à l'avant-bras lors d'un accident. L'examen révèle une nécrose avec absence de douleur locale, les muscles ou le fascia ne sont pas touchés.

Q: Quel est le degré de la brûlure ?

a. 1er degré	Certain	Probable	Deviné
b. Degré 2a	Certain	Probable	Deviné
c. Degré 2b	Certain	Probable	Deviné
d. 3ème degré	Certain	Probable	Deviné
e. 4ème degré	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

40

Les virus grippaux provoquent régulièrement des épidémies de grippe. L'infection peut être grave, voire mortelle, en particulier chez les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Q: Parmi les substances suivantes, laquelle est utilisée en prophylaxie ou en thérapie contre la grippe ?

a. Pénicilline	Certain	Probable	Deviné
b. Aciclovir	Certain	Probable	Deviné
c. Ganciclovir	Certain	Probable	Deviné
d. Chloramphénicol	Certain	Probable	Deviné
e. Oseltamivir	Certain	Probable	Deviné

41

Une femme enceinte de sept mois se présente chez son médecin généraliste en raison d'une fatigue importante, de douleurs musculaires dans les membres (myalgies) et de fièvre. Le médecin constate de multiples ganglions lymphatiques tuméfiés (adénopathies) et une augmentation palpable de la taille de la rate (splénomégalie). Le médecin suspecte une infection par *Toxoplasma gondii* (toxoplasmose).

Q: Lequel des animaux suivants est l'hôte principal de *Toxoplasma gondii* et représente donc une source d'infection humaine par ce parasite ?

a. Chien	Certain	Probable	Deviné
b. Chat	Certain	Probable	Deviné
c. Pigeon	Certain	Probable	Deviné
d. Mouton	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

42

Une patiente de 22 ans souffrant d'obésité permanente se présente à vous. Elle signale des maux de tête et des troubles de la vision connus depuis des années. L'examen ophtalmologique révèle une papille congestive.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Pseudotumeur cérébrale	Certain	Probable	Deviné
b. Glioblastome multiforme	Certain	Probable	Deviné
c. sténose de l'aqueduc	Certain	Probable	Deviné
d. hydrocéphalie à pression normale	Certain	Probable	Deviné
e. Adénome hypophysaire	Certain	Probable	Deviné

43

Une patiente de 20 ans présente soudainement des diarrhées, des nausées et des douleurs abdominales. L'examen révèle les résultats suivants : abdomen souple et peu sensible à la palpation, hyperpéristaltisme, température 37,5°C, leucocytes dans la norme.

Q: De quelle affection s'agit-il le plus probablement ?

a. Appendicite

Certain

Probable

Deviné

b. Gravité extra-utérine

Certain

Probable

Deviné

c. Maladie de Crohn

Certain

Probable

Deviné

d. Pancréatite aigüe

Certain

Probable

Deviné

e. Gastro-entérite

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Après une amygdalectomie bilatérale, une fillette de 10 ans se présente avec une sensibilité diminuée dans la région du pharynx. L'anamnèse révèle une perte de la qualité du goût "amer". De plus, il semble y avoir un trouble de la déglutition. A l'examen clinique, le réflexe nauséeux est à peine déclenché, le trouble du goût semble plutôt localisé dans la partie postérieure de la langue, le "sucré" est perçu.

Q: Quel nerf est probablement concerné ?

a. N. hypoglosse	Certain	Probable	Deviné
b. N. mandibulaire	Certain	Probable	Deviné
c. N. facial	Certain	Probable	Deviné
d. N. glossopharyngien	Certain	Probable	Deviné
e. N. lingual	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

45

Au cours des dernières heures, un nouveau-né a présenté à plusieurs reprises des états de cyanose, une respiration saccadée et une salivation accrue. Après l'aspiration de la salive, les symptômes ne s'améliorent que temporairement. Un polyhydramnios s'était produit pendant la grossesse et l'accouchement s'est déroulé sans complications.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Pneumonie néonatale

Certain

Probable

Deviné

b. Aspiration de méconium

Certain

Probable

Deviné

c. Atrésie de l'œsophage

Certain

Probable

Deviné

d. Sténose du pylore

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

46

Une patiente de 45 ans souffrant d'un trouble bipolaire est traitée depuis des années par lithium. Elle est également traitée par lévothyroxine en raison de valeurs de T4 et de TSH se situant en dessous de la norme depuis plusieurs années également. En raison d'une hypertension artérielle, un traitement par captopril (3x25 mg/jour) et hydrochlorothiazide (12,5 mg/jour) a été commencé il y a quatre semaines, sous lequel les valeurs tensionnelles se sont normalisées. Hier, elle a remarqué des mouvements toniques des extrémités supérieures. Aujourd'hui, elle est amenée somnolente aux urgences. La température corporelle, la respiration, le pouls et la tension artérielle sont normaux. La patiente est difficilement réveillable, a une turgescence cutanée diminuée, présente une rigidité des membres supérieurs mais n'a pas d'autres résultats neurologiques focaux. Les résultats de laboratoire de la patiente sont les suivants (sang veineux) : sodium 150 mmol/l (norme : 135-145 mmol/l), créatinine sérique 200 μ mol/l (norme : 58-96 μ mol/l).

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Hypothyroïdie / coma myxoédémateux

b. Maladie de Parkinson / Crise de Parkinson

c. Crise hypertensive

d. Incident cérébral

e. Intoxication au lithium

Je ne sais pas la réponse

47

Un patient est traité par halopéridol pour une psychose schizophrénique.

Q: Quels sont les effets secondaires à signaler ?

a. rougeurs de la peau	Certain	Probable	Deviné
b. augmentation du seuil de convulsion	Certain	Probable	Deviné
c. Symptômes extrapyramidaux	Certain	Probable	Deviné
d. Influence sur la croissance	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

48

Vous diagnostiquez une arthrite de Lyme chez une patiente de 30 ans. Outre les douleurs articulaires, la patiente se plaint de maux de tête et de troubles de la concentration. La symptomatologie existe depuis environ quatre mois.

Q: Parmi les antimicrobiens cités, lequel est le mieux adapté au traitement de cette patiente ?

a. la gentamycine	Certain	Probable	Deviné
b. la ciprofloxacine	Certain	Probable	Deviné
c. le cotrimoxazole	Certain	Probable	Deviné
d. la doxycycline	Certain	Probable	Deviné
e. l'imipénème	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un étudiant de 28 ans vous dit qu'il se sent de plus en plus persécuté par son professeur depuis environ deux semaines. Il a l'impression que des émissions de radio sont également diffusées à cause de lui. Il parle de voix qui lui ordonnent de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. En outre, l'étudiant vous décrit, avec une expression anxieuse, qu'il ressent constamment des fourmillements dans les jambes.

Q: De quelle maladie s'agit-il le plus probablement ?

a. hallucinose alcoolique	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Trouble affectif bipolaire	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Trouble borderline	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Chorée de Huntington	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
e. Épisode dépressif	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
f. Schizophrénie catatonique	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
g. Épisode maniaque	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
h. Schizophrénie	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

50 Q: De quelle vitamine dérive le cofacteur de toutes les transaminases ?

a. la vitamine A

Certain

Probable

Deviné

b. la vitamine B6

Certain

Probable

Deviné

c. la vitamine C

Certain

Probable

Deviné

d. la vitamine D

Certain

Probable

Deviné

e. la vitamine E

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

51 Q: L'occlusion du rameau circonflexe de l'artère coronaire gauche conduit le plus probablement à quel infarctus ?

a. Infarctus de la paroi antérieure

Certain

Probable

Deviné

b. Infarctus de la paroi latérale

Certain

Probable

Deviné

c. infarctus du septum antérieur

Certain

Probable

Deviné

d. infarctus du myocarde

Certain

Probable

Deviné

e. Infarctus du ventricule droit

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

52

Q: Quel signe est le plus susceptible d'indiquer une augmentation de la pression intracrânienne mettant en jeu le pronostic vital ?

a. Tachycardie/hypotonie

Certain

Probable

Deviné

b. Respiration de Kussmaul

Certain

Probable

Deviné

c. Anisocorie/trouble de la conscience

Certain

Probable

Deviné

d. Hallucinations auditives

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

53

Q: Chez un homme de 28 ans, le durcissement indolore d'un testicule est suspect pour le diagnostic suivant ?

a. Kyste

Certain

Probable

Deviné

b. Varicocèle

Certain

Probable

Deviné

c. Hydrocèle

Certain

Probable

Deviné

d. Cancer

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

54

Q: Quel résultat d'examen (para-)clinique ou quel résultat anamnestique évoque une convulsion psychogène plutôt qu'une crise d'épilepsie ?

a. Enurésie ou encoprésie	Certain	Probable	Deviné
b. Lésions importantes des muqueuses	Certain	Probable	Deviné
c. Augmentation du lactate sanguin après la crise	Certain	Probable	Deviné
d. Résistance à l'ouverture des yeux pendant la crise	Certain	Probable	Deviné
e. Confusion post critique	Certain	Probable	Deviné
f. Blessures au niveau du menton ou des sourcils	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

55

Un enseignant de 65 ans se plaint de fourmillements dans le pouce, l'index et le majeur de la main droite.

Q: Quelle est la localisation la plus probable d'une lésion nerveuse ?

a. Foramen intervertébral de la première vertèbre thoracique	Certain	Probable	Deviné
b. Loge de Guyon	Certain	Probable	Deviné
c. Canal carpien	Certain	Probable	Deviné
d. Loge du M. supinateur	Certain	Probable	Deviné
e. Épicondyle médial	Certain	Probable	Deviné

Un homme de 35 ans vous appelle au cabinet pour un mal de gorge et vous demande une visite à domicile. Il refuse avec véhémence votre demande de venir au cabinet. Il indique qu'en chemin, il craint de présenter une autre de ses crises. Il se mettrait alors soudainement à transpirer et à trembler sans raison. Il aurait des nausées et il aurait la tête qui tourne. C'est pourquoi il doit absolument rester chez lui.

Q: De quel trouble cet homme souffre-t-il le plus probablement ?

a. Trouble de l'adaptation

Certain

Probable

Deviné

b. Trouble panique

Certain

Probable

Deviné

c. Trouble bipolaire

Certain

Probable

Deviné

d. Psychose schizo-affective

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Une patiente de 27 ans se présente chez vous avec les symptômes suivants : Douleurs unilatérales dans le bas-ventre avec irradiation jusqu'à l'épaule associé à des saignements vaginaux brunâtres après un intervalle de six semaines sans règles. Lors de l'examen gynécologique, vous faites les constatations suivantes : palpation d'une masse molle et douloureuse à la pression, en région latéro-utérine, et discrète augmentation du volume de l'utérus.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Fausse couche	Certain	Probable	Deviné
b. Kyste du corps jaune	Certain	Probable	Deviné
c. Grossesse extra-utérine	Certain	Probable	Deviné
d. Kyste folliculaire	Certain	Probable	Deviné
e. Kyste dermoïde	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un patient de 50 ans souffre depuis quelques mois d'hypertension artérielle avec des valeurs maximales allant jusqu'à 200 mmHg de pression artérielle systolique. Interrogé sur ses antécédents médicaux, il fait état d'un asthme bronchique allergique.

Q: La prescription de quel groupe de médicaments devrait donc être discutée de manière critique avant le début du traitement ?

a. les antagonistes du calcium

Certain

Probable

Deviné

b. les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II

Certain

Probable

Deviné

c. les β -bloquants

Certain

Probable

Deviné

d. les diurétiques thiazidiques

Certain

Probable

Deviné

e. les bloqueurs de récepteurs α_1

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

59

Dans un service psychiatrique, un patient de 30 ans, admis pour une psychose avec hallucinations auditives, rapporte qu'au cours des dernières semaines, il a eu de plus en plus l'impression de ne plus être lui-même, d'être à côté de lui-même et de ne plus se sentir.

Q: Comment appelle-t-on ce symptôme ?

a. l'inspiration de la pensée	Certain	Probable	Deviné
b. Déréalisation	Certain	Probable	Deviné
c. Autisme	Certain	Probable	Deviné
d. Dépersonnalisation	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

60

Une patiente de 36 ans se présente à votre cabinet en raison de l'infection d'une plaie au doigt. Vous lui prescrivez un antibiotique. Deux semaines plus tard, la patiente revient à votre cabinet et vous indique que l'infection de la plaie s'est complètement résorbée, mais que ses mictions ont diminué en quantité et que son urine est devenue rose.

Q: De quelle pathologie est évocateur ce tableau clinique ?

a. Fibrose systémique néphrogénique	Certain	Probable	Deviné
b. Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	Certain	Probable	Deviné
c. Glomérulonéphrite chronique	Certain	Probable	Deviné
d. Néphrolithiase	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un nouveau-né de sexe masculin naît par césarienne en se présentant par le siège, à 37 SA. Une heure après la naissance, le garçon présente une fréquence respiratoire de 72/min et un gémissement perceptible lors de l'expiration. Le murmure vésiculaire respiratoire est symétrique. Une mesure pulsoxymétrique de la saturation artérielle en oxygène effectuée à la main droite donne une valeur de 90 %.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Aspiration de liquide amniotique	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Manque de surfactant	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Pneumothorax	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Pneumonie congénitale	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
e. Tachypnée transitoire du nouveau-né (wet-lung syndrome)	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Vous travaillez dans une unité de soins intensifs et vous soupçonnez un pneumothorax sous tension chez un patient intubé.

Q: Quelles seraient les constatations typiques pour le côté du thorax concerné ?

a. Diaphragme surélevé

Certain

Probable

Deviné

b. Bruit respiratoire diminué

Certain

Probable

Deviné

c. Matité à la percussion

Certain

Probable

Deviné

d. Pincement des espaces intercostaux

Certain

Probable

Deviné

e. Diminution de la pression veineuse centrale

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

63

Q: L'association du furosémide avec lequel des médicaments suivants permet un blocage séquentiel du néphron ?

a. un thiazide	Certain	Probable	Deviné
b. le chlorure de potassium	Certain	Probable	Deviné
c. un antagoniste des récepteurs des canaux calciques	Certain	Probable	Deviné
d. un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

64

Après un accident de sport, l'épaule droite d'un jeune homme est très douloureuse et ne se laisse guère bouger. Au niveau du contour normal de l'épaule allant de l'acromion au muscle deltoïde, on constate une transition relativement anguleuse ("signe de l'épaulette") ainsi qu'un renflement en dessous du point de contact du processus coracoïde.

Q: Laquelle des blessures suivantes est la plus probable ?

a. Fracture de l'humérus dans la région du col chirurgical (collum chirurgicum)	Certain	Probable	Deviné
b. Fracture de la clavicule	Certain	Probable	Deviné
c. Luxation de l'articulation scapulo-humérale	Certain	Probable	Deviné
d. Luxation dans l'articulation acromio-claviculaire	Certain	Probable	Deviné
e. Déchirure musculaire dans la zone de la partie acromiale (pars acromialis) du muscle deltoïde	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

65

Un patient de 43 ans, polytraumatisé à la suite d'un accident de la route, est placé sous respiration artificielle. Dans ce contexte, il développe un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Malgré un traitement adéquat, le patient décède le deuxième jour après le début du SDRA.

Q: Quelle lésion sera le plus probablement observée à l'examen histopathologique du tissu pulmonaire ?

a. Prolifération épithéliale	Certain	Probable	Deviné
b. Remaniement fibrotique	Certain	Probable	Deviné
c. Exsudat limité au niveau lobaire	Certain	Probable	Deviné
d. Membranes hyalines	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

66

Q: Un homme de 45 ans se plaint d'une sensation de pression dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Quelle enzyme sérique parmi celles citées ci-dessous indique le plus spécifiquement une lésion hépatocellulaire ?

a. l'aspartate aminotransférase (GOT/ASAT)	Certain	Probable	Deviné
b. l'alanine aminotransférase (GPT/ALAT)	Certain	Probable	Deviné
c. la phosphatase alcaline (PA)	Certain	Probable	Deviné
d. la lactate déshydrogénase (LDH)	Certain	Probable	Deviné
e. les cholinestérases (ChE)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une patiente de 91 ans, atteinte d'une démence d'Alzheimer connue, est amenée aux urgences par ses proches, car depuis deux jours, elle voit constamment de petites bêtes sur le sol et essaie de les ramasser. De plus, elle ne reconnaît plus aucun membre de sa famille. Elle aurait complètement saccagé sa chambre. Aux urgences, la patiente n'est pas disposée à discuter avec vous et ne réagit pas à vos questions. Vous supposez qu'il s'agit d'un délire.

Q: Quelle est l'attitude adéquate ?

a. Aucun autre diagnostic n'est nécessaire, hospitalisation pour thérapie	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Évaluation diagnostique du délire et hospitalisation	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. prise de sang et radiographie des poumons ; si le résultat est normal, la patiente est renvoyée chez elle accompagnée de ses proches	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Aucun autre diagnostic n'est nécessaire, information des proches sur les maladies de démence et retour à domicile de la patiente accompagnée de ses proches.	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

68

Une patiente de 47 ans vous raconte qu'elle passe 6 à 8 heures par jour à nettoyer son appartement. Bien qu'elle sache que cela n'a pas de sens de faire autant de ménage, elle ressent un besoin intérieur intense auquel elle doit céder. Épuisée, elle ne peut plus travailler, si bien que son médecin de famille la met actuellement en congé maladie. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire.

Q: Quel traitement médicamenteux est le plus indiqué en plus d'une thérapie comportementale ?

a. Traitement combiné avec un antidépresseur	Certain	Probable	Deviné
b. Traitement combiné avec un antipsychotique	Certain	Probable	Deviné
c. Traitement combiné avec un tranquillisant	Certain	Probable	Deviné
d. Traitement combiné avec un stabilisateur d'humeur	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

69

Un patient de 18 ans se présente à votre consultation avec plusieurs tuméfactions sous-cutanées douloureuses. Il présente également des troubles de la vision. À l'examen physique, vous remarquez une modification de la pigmentation de la région inguinale et quelques hyperpigmentations de couleur café au lait sur les bras.

Q: Quelle est la maladie génétique la plus probable à l'origine de ces modifications ?

a. Syndrome de Sturge-Webber	Certain	Probable	Deviné
b. le syndrome de von Hippel-Lindau	Certain	Probable	Deviné
c. neurofibromatose de type 2	Certain	Probable	Deviné
d. Neurofibromatose de type 1	Certain	Probable	Deviné
e. Sclérose tubéreuse de Bourneville	Certain	Probable	Deviné

70

Vous souhaitez introduire un nouveau test pour diagnostiquer le diabète sucré. Un collègue vous le déconseille, car des études ont montré que ce test détecte la maladie dans trop peu de cas.

Q: Quelle est la propriété du test la plus susceptible d'être limitée dans ce cas ?

a. Fiabilité	Certain	Probable	Deviné
b. Sensibilité	Certain	Probable	Deviné
c. Spécificité	Certain	Probable	Deviné
d. Validité externe	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

71

Un patient se présente à la consultation ambulatoire avec des papules disséminées et un prurit important dans le cadre d'une allergie alimentaire connue. Il n'y a pas de détresse respiratoire. Le diagnostic de suspicion d'urticaire aiguë est posé.

Q: Parmi les thérapies suivantes, laquelle devrait être initiée le plus rapidement ?

a. Traitement systémique par glucocorticoïdes	Certain	Probable	Deviné
b. Traitement topique par glucocorticoïdes	Certain	Probable	Deviné
c. Thérapie antihistaminique H1 systémique	Certain	Probable	Deviné
d. Thérapie antihistaminique H1 topique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

72

Une jeune femme de 24 ans vient vous voir en consultation dermatologique et se plaint de lésions cutanées squameuses argentées au niveau des coudes et du cuir chevelu. Le phénomène de Köbner est positif.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Dermatite atopique

Certain

Probable

Deviné

b. Lichen ruber

Certain

Probable

Deviné

c. Psoriasis

Certain

Probable

Deviné

d. Candidose

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

73

Q: Quel est l'agent pathogène de la kérato-conjonctivite épidémique ?

a. Virus de l'herpès

Certain

Probable

Deviné

b. Adénovirus

Certain

Probable

Deviné

c. Chlamydia trachomatis

Certain

Probable

Deviné

d. Staphylococcus aureus

Certain

Probable

Deviné

e. Streptococcus mitis

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

75

L'échographie de l'abdomen révèle souvent, sur des coupes transversales obliques de la partie supérieure de l'abdomen, une petite structure ronde, dense en échographie, située à la limite des lobes hépatiques droit et gauche.

Q: De quelle structure anatomique s'agit-il le plus probablement ?

a. Veine hépatique	Certain	Probable	Deviné
b. Ligament rond du foie (teres hepatis)	Certain	Probable	Deviné
c. Pédicule biliaire	Certain	Probable	Deviné
d. Petit Omentum (Omentum minus)	Certain	Probable	Deviné
e. Appendice fibreux	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

76

Q: Quel est le score CHA2DS2-VASc obtenu chez une patiente de 70 ans présentant une maladie coronarienne connue et une hypertension, sans autre antécédent ?

a. 2	Certain	Probable	Deviné
b. 3	Certain	Probable	Deviné
c. 4	Certain	Probable	Deviné
d. 5	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

a. L abdomen aigu avec péritonisme	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Les brûlures d'estomac	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Les vomissements à jeun	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Les troubles postprandiaux de type colique	☒ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

L'échographie de l'abdomen révèle souvent, sur des coupes transversales obliques de la partie supérieure de

77

Q: Quelle tumeur primaire est le plus souvent responsable de métastases du SNC ?

a. Carcinome des cellules rénales

b. Carcinome pulmonaire

c. Mélanome malin

d. Carcinome du côlon

e. Ostéosarcome

Je ne sais pas la réponse

Un patient, sans antécédents pulmonaires, est en ventilation mécanique. Il présente les valeurs de gazométrie artérielle suivantes : $\text{Pa}(\text{O}_2)$: 250 mmHg, $\text{Pa}(\text{CO}_2)$: 41 mmHg.

78

Q: Quel paramètre de la ventilation en volume contrôlé doit être modifié pour obtenir des valeurs de gazométrie physiologiques ?

a. Augmenter le volume courant (VT)

b. Réduire le volume courant (VT)

c. Diminution de la fréquence respiratoire

d. Augmenter la fraction inspirée en oxygène (FiO_2)

e. Diminuer la fraction inspirée en oxygène (FiO_2)

79

Q: Quelles mesures les patients présentant un risque accru d'hypoglycémie doivent-ils prendre lorsqu'ils conduisent ?

a. Il est préférable d'éviter complètement de conduire.

b. Les diabétiques ne peuvent conduire qu'accompagnés.

c. Mesure de la glycémie toutes les 2 heures environ lors de longs trajets en voiture

d. Si possible, ne pas s'injecter d'insuline avant de commencer un trajet en voiture

Je ne sais pas la réponse

80

Q: Quel déplacement d'électrolytes entraîne une augmentation de la sensibilité aux préparations digitaliques ?

a. Hyperkaliémie

b. Hypocalcémie

c. Hypokaliémie

d. Hypernatrémie

Je ne sais pas la réponse

81

Un petit garçon de 2 semaines est amené aux urgences d'une clinique pédiatrique parce qu'il respire difficilement depuis quelques heures. L'examen révèle une fréquence respiratoire de 96/min, le murmure vésiculaire est symétrique, sans particularité, sans crépitants, la température est de 37,5°C. Le garçon a un teint grisâtre, les lèvres sont rosées, les pouls inguinaux ne sont pas palpables, mais les pouls radiaux sont puissants des deux côtés. La fréquence cardiaque déterminée par auscultation est de 186/min. Une analyse des gaz du sang par voie capillaire révèle un pH de 7,11 et une pCO₂ de 28 mmHg.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Pneumonie	Certain	Probable	Deviné
b. Septicémie	Certain	Probable	Deviné
c. Coarctation de l'aorte	Certain	Probable	Deviné
d. Insuffisance rénale aiguë	Certain	Probable	Deviné
e. Déshydratation massive	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

82

De nombreuses études ont pour but d'évaluer différentes mesures de prévention.

Q: Pourquoi est-il souvent très difficile de démontrer un bénéfice ?

a. les études de prévention sont des études d'observation	Certain	Probable	Deviné
b. les études de prévention s'adressent à des groupes d'âge spécifiques	Certain	Probable	Deviné
c. L'effet des mesures de prévention n'apparaît souvent que bien plus tard.	Certain	Probable	Deviné
d. Aucun groupe de contrôle ne peut être inclus.	Certain	Probable	Deviné

83

Un nourrisson de 7 mois se met soudainement à crier à intervalles de plus en plus rapprochés, en vomissant et en paraissant très malade pendant ces épisodes. Ensuite, il est calme et discret jusqu'à l'épisode suivant. Lors de l'épisode, les jambes sont généralement maintenues par le nourrisson en position de flexion.

Q: De quelle maladie s'agit-il le plus probablement ?

a. Appendicite du nourrisson	Certain	Probable	Deviné
b. Volvulus intestinal aigu	Certain	Probable	Deviné
c. Infarctus mésentérique	Certain	Probable	Deviné
d. Invagination intestinale	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

84

Un patient de 46 ans a remarqué depuis quelque temps des fuites d'air en urinant (pneumaturie). Il est traité depuis plusieurs mois pour des infections chroniques des voies urinaires.

Q: De quoi s'agit-il le plus probablement ?

a. Reflux vésico-urétéral	Certain	Probable	Deviné
b. Cystite due à des bactéries productrices de gaz	Certain	Probable	Deviné
c. Manipulation dans le cadre d'un syndrome de Münchhausen	Certain	Probable	Deviné
d. Fistule vésico-sigmoïdienne	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Q: Quel groupe de médicaments provoque très souvent des réactions paradoxales à un âge avancé ?

a. Inhibiteurs de l'ECA

b. Benzodiazépines

c. Bêta-bloquants

d. Pénicillines

e. Diurétiques de l'anse

Je ne sais pas la réponse

Une primipare de 25 ans, enceinte de 39 semaines, se présente avec de fortes douleurs abdominales et des saignements vaginaux. Les résultats suivants sont relevés : saignement vaginal continu venant de l'endocol, col de l'utérus ouvert sur 2 cm, utérus douloureux à la palpation, le tocogramme montre des contractions utérines régulières toutes les deux minutes, TA 110/70 mmHg, pouls 100/min, rythme cardiaque foetal à 100/min.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Saignement cervical sur un début de travail

b. Placenta praevia

c. Rupture de l'utérus

d. Décollement prématuré du placenta

Je ne sais pas la réponse

87

Q: Quel est un effet secondaire pertinent de la perfusion hypothermique du corps pendant les interventions cardio-chirurgicales ?

a. Perturbation de la fonction plaquettaire

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

b. Vasodilatation

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

c. Augmentation des taux de lipase dans le sérum

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

d. Épanchement pleural

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

Je ne sais pas la réponse

88

Un homme de 76 ans se plaint de graves difficultés à s'endormir depuis le décès de sa femme il y a deux semaines. Vous lui prescrivez une benzodiazépine à courte durée d'action (par exemple l'oxazépam).

Q: Sur quoi devriez-vous attirer son attention ?

a. Qu'il augmente la dose au besoin

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

b. Il doit également prendre le médicament pendant la journée en cas d'anxiété.

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

c. Il ne doit prendre ce médicament que pendant maximum 3-4 semaines, si possible.

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

d. il peut aussi prendre le médicament sans crainte pendant une longue période.

☐ Certain

☐ Probable

☐ Deviné

Je ne sais pas la réponse

89

Une fillette de 3 ans vous est présentée avec une rhinorrhée, des maux de tête et des douleurs dans les membres. La température corporelle mesurée par voie rectale est de 38,6°C. L'examen physique ne révèle aucun signe de bronchite ou de pneumonie, les amygdales sont sans particularité.

Q: Que recommandez-vous aux parents inquiets pour le traitement de l'enfant ?

a. Métamizole	Certain	Probable	Deviné
b. Paracétamol	Certain	Probable	Deviné
c. Acide acétylsalicylique	Certain	Probable	Deviné
d. Amantadine (antiviral)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

90

Un petit enfant de 3 ans est amené en consultation pour une toux et une respiration sifflante. Les symptômes sont observés quotidiennement depuis environ une semaine. Au début de l'épisode, l'enfant avait soudainement toussé violemment pendant un repas et son visage était devenu rouge foncé. Au niveau apical droit, l'auscultation révèle un murmure vésiculaire atténué et la percussion révèle un tympanisme.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Pleuropneumonie du côté droit	Certain	Probable	Deviné
b. Bronchite obstructive sur une allergie alimentaire	Certain	Probable	Deviné
c. Faux croup (laryngite sous-glottique)	Certain	Probable	Deviné
d. Corps étranger bronchique avec mécanisme de valve	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

91

Une femme de 29 ans a donné naissance à son premier enfant il y a 18 mois. Immédiatement après la naissance, une hémophilie A a été diagnostiquée. Le reste de son développement s'est déroulé sans problème jusqu'à présent. Vous notez dans les antécédents familiaux qu'un de ses frères est également hémophile.

Q: Quel est le risque le plus probable de récurrence de l'hémophilie A chez un autre enfant ?

a. Environ 100% de probabilité qu'un garçon tombe malade	Certain	Probable	Deviné
b. Environ 50% de probabilité qu'un garçon tombe malade	Certain	Probable	Deviné
c. Environ 25 % de probabilité qu'un garçon tombe malade	Certain	Probable	Deviné
d. Pathogénèse multifactorielle, très faible risque de récurrence	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

92

Q: Dans quel tableau clinique trouve-t-on une exophtalmie ?

a. Hyperthyroïdie (maladie de Basedow)	Certain	Probable	Deviné
b. Sarcoidose (M. Boeck)	Certain	Probable	Deviné
c. Spondylarthrite ankylosante (M. Bechterew)	Certain	Probable	Deviné
d. entérite terminale (maladie de Crohn)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

93

Un patient de 67 ans se trouve dans une clinique de rééducation neurochirurgicale après le clippage d'un anévrisme de l'artère cérébrale moyenne droite. Après deux semaines et une très bonne régression des symptômes cliniques, le patient, qui était jusque-là mobile, fait plusieurs chutes soudaines dans le couloir du service. L'infirmière qui s'occupe du patient avait déjà remarqué deux jours auparavant une légère diminution de l'élan vital ainsi qu'une nouvelle incontinence urinaire.

Q: Parmi les examens suivants, lequel doit être effectué en priorité ?

a. Sonographie Doppler transcrânienne	Certain	Probable	Deviné
b. Radiographie du crâne en deux plans	Certain	Probable	Deviné
c. Poids spécifique de l'urine	Certain	Probable	Deviné
d. CT scanner du crâne	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

94

Un patient développe des infiltrats violacé héliotrope sur le visage, en particulier au niveau périorbitaire. Parallèlement, il présente depuis un certain temps une sensation générale de malaise ainsi qu'une diminution de la force des muscles proximaux des membres supérieurs et inférieurs. La créatine kinase (CK) et l'aldolase sériques sont élevées.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Maladie de Lyme	Certain	Probable	Deviné
b. Intoxication au plomb	Certain	Probable	Deviné
c. Dermatomyosite	Certain	Probable	Deviné
d. Collagénose mixte	Certain	Probable	Deviné

95

Bien que la pression dans l'oreillette droite et gauche soit augmentée en cas d'insuffisance cardiaque, le sodium et l'eau sont réabsorbés.

Q: Quel est le mécanisme à l'origine de ce phénomène ?

a. Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et activation de l'hormone antidiurétique (ADH)

b. Diminution du peptide natriurétique auriculaire (ANP), augmentation de l'hormone antidiurétique (ADH), troubles de la filtration

c. Chute du volume cardiaque, chute de la tension artérielle

d. Augmentation de l'érythropoïétine, baisse de la rénine

Je ne sais pas la réponse

96

Q: Par quel mécanisme les agents sporulés présents dans les aliments en conserve provoquent-ils des intoxications ?

a. Résistance à la pasteurisation et formation de toxines après germination

b. Effet toxique direct des spores

c. Activité métabolique élevée des spores

d. La flore normale modifiée après la conservation favorise les spores

Je ne sais pas la réponse

97

Q: Par quelle modification l'absorption d'un acide faible par l'estomac peut-elle être renforcée ?

a. Diminution du pH gastrique

b. Diminution du pH de l'urine

c. Augmentation du pH gastrique

d. Augmentation du pH de l'urine

Je ne sais pas la réponse

98

Une femme de 42 ans vient vous voir au cabinet. Depuis deux jours, elle a de la fièvre à 39°C, elle se sent abattue et présente des expectorations jaunes.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Bronchite purulente

b. Alvéolite allergique

c. Pneumonie atypique

d. Atélectasie

e. Aspiration de corps étrangers

Je ne sais pas la réponse

99

Q: Quel résultat, observé dans le cadre de l'autopsie d'un cadavre, est considéré comme une réaction vitale ?

a. Une dermabrasion

b. Un hématome

c. Un bourrelet idiomusculaire

d. L'apparition de myosis après l'administration d'un spasmolytique

Je ne sais pas la réponse

100

Vous êtes appelé.e au chevet d'un patient qui a pris au moins 20 comprimés d'amitriptyline (un antidépresseur tricyclique) dans une intention suicidaire, selon ses proches. Il est somnolent, hypotendu et a un pouls irrégulier.

Q: Quelle est la première mesure à prendre immédiatement ?

a. Effectuer un lavage d'estomac ou induire des vomissements pour éliminer immédiatement l'antidépresseur

b. Mettre en place une voie veineuse périphérique et préparer l'intubation pour éviter une bronchoaspiration

c. Administrer de la physostigmine pour traiter les effets anticholinergiques

d. Administration de lidocaïne pour éviter un trouble du cardiaque

e. Administration de bipéridène pour prévenir les spasmes musculaires

Je ne sais pas la réponse

Une femme de 45 ans est envoyée par son médecin de famille chez le neurologue pour une évaluation diagnostique des symptômes suivants : épuisement rapide, alternance de perplexité et d'humeur exaltée. La patiente rapporte qu'elle a l'impression que ses mains et ses pieds sont devenus plus grands. Elle se plaint en outre de troubles de la vision.

Q: Quel est le diagnostic de suspicion le plus probable ?

a. Adénome hypophysaire	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Sclérose en plaques	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Trouble bipolaire	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Schizophrénie	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
e. Neurosyphilis	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

102

Vous diagnostiquez une arthrite de Lyme chez une patiente de 32 ans. Outre les douleurs articulaires, la patiente se plaint de maux de tête et de troubles de la concentration. La symptomatologie existe depuis environ trois mois. La patiente est enceinte de 26 semaines.

Q: Parmi les antimicrobiens cités, lequel est le mieux adapté au traitement de cette patiente ?

a. l' amoxicilline	Certain	Probable	Deviné
b. la ciprofloxacin	Certain	Probable	Deviné
c. la doxycycline	Certain	Probable	Deviné
d. la gentamycine	Certain	Probable	Deviné
e. l'imipénème	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

103

Un étudiant en médecine de 23 ans (droitier), en deuxième année d'études, présente un gonflement douloureux à la face postérieure des deux coudes.

Q: Que doit-il faire ?

a. Antibiothérapie orale systémique pour le traitement de la bursite infectieuse	Certain	Probable	Deviné
b. Ménager les coudes (mouvements et pressions) en cas de bursite olécranienn bilatérale	Certain	Probable	Deviné
c. Extirpation chirurgicale de la bourse olécranienn des deux côtés	Certain	Probable	Deviné
d. plâtre à gauche et bandage à droite pour maintenir son autonomie	Certain	Probable	Deviné

104

L'augmentation de la concentration extracellulaire de K^+ (solution cardioplégique) stoppe l'activité cardiaque.

Q: Lequel des mécanismes cités provoque cela ?

a. Les canaux potassiques restent ouverts en permanence	Certain	Probable	Deviné
b. Les canaux de sodium ne sont pas activables.	Certain	Probable	Deviné
c. La conductivité des gap junctions est réduite.	Certain	Probable	Deviné
d. Les pompes à calcium sont bloquées.	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

105

Un sportif est victime d'une rupture du tendon d'Achille, qui est traitée chirurgicalement par une suture tendineuse.

Q: Dans quelle position le pied doit-il ensuite être plâtré ?

a. Position en flexion plantaire	Certain	Probable	Deviné
b. Position d'éversion	Certain	Probable	Deviné
c. Position d'inversion	Certain	Probable	Deviné
d. Position à angle droit	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

106

Q: Quand l'analyse chromosomique est-elle la plus indiquée chez un enfant en bas âge, à l'âge de 6-7 mois ?

a. En cas de maladies multifactorielles

b. En présence d'une phénylcétonurie

c. Si un syndrome de Down a été cliniquement constaté

d. Si des fausses couches répétées se sont produites auparavant

Je ne sais pas la réponse

107

Q: Quelles sont les personnes qui présentent un risque accru de cancer en raison de leur constitution génétique ?

a. les personnes dont les chromosomes présentent à la fois des bandes R et G dans la coloration Giemsa

b. les personnes dont les chromosomes acrocentriques portent des satellites anormaux.

c. les personnes chez lesquelles un taux élevé de rupture chromosomique a été détecté.

Je ne sais pas la réponse

108

Une patiente de 22 ans se présente à votre cabinet et vous rapporte des douleurs abdominales de type crampiformes, qui durent depuis une semaine, associés à des selles sanglantes et glaireuses jusqu'à 30 fois par jour, y compris la nuit.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. une maladie de Crohn	Certain	Probable	Deviné
b. une rectocolite ulcéro-hémorragique	Certain	Probable	Deviné
c. un syndrome de l'intestin irritable	Certain	Probable	Deviné
d. une crise hémorroïdaire	Certain	Probable	Deviné
e. un adénocarcinome colique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

109

Un homme de 73 ans développe une pneumonie du lobe inférieur droit 24 heures après son admission à l'hôpital pour l'opération d'une hernie.

Q: Quel est l'agent pathogène le plus susceptible d'être à l'origine du tableau clinique ?

a. Legionella pneumophila	Certain	Probable	Deviné
b. Streptococcus pneumoniae	Certain	Probable	Deviné
c. Candida albicans	Certain	Probable	Deviné
d. Staphylococcus aureus	Certain	Probable	Deviné
e. Mycoplasma pneumoniae	Certain	Probable	Deviné

110

Q: Parmi les médicaments utilisés pour traiter l'asthme, lequel a l'effet bronchospasmodique le plus important ?

a. Théophylline

Certain

Probable

Deviné

b. Ipratropium

Certain

Probable

Deviné

c. Kétotifène (AINS)

Certain

Probable

Deviné

d. Salbutamol

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

111

Une patiente de 44 ans se présente aux urgences d'un hôpital périphérique parce qu'elle s'est blessée à la main et vous constatez des signes cliniques typiques d'une fracture de boxeur. Elle a en plus une polyarthrite rhumatoïde depuis environ 20 ans. Vous demandez une radiographie de la main concernée.

Q: Quelle est le signe radiologique en faveur de la polyarthrite rhumatoïde et qui doit être distinguée de la blessure actuelle ?

a. Enthésite

Certain

Probable

Deviné

b. Érosions

Certain

Probable

Deviné

c. Calcifications des capsules articulaires

Certain

Probable

Deviné

d. Luxation

Certain

Probable

Deviné

e. Ostéophytes

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

112 Q: Quelle est la cause la plus fréquente d'une ostéoporose généralisée ?

a. l'ostéoarthrose	Certain	Probable	Deviné
b. la spondylarthrite ankylosante	Certain	Probable	Deviné
c. la polyarthrite rhumatoïde	Certain	Probable	Deviné
d. la carence en œstrogènes chez les femmes	Certain	Probable	Deviné
e. la thérapie à la digitoxine	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

113

Une jeune femme de 17 ans se présente chez le gynécologue en raison de douleurs lors d'une tentative de rapport sexuel. L'anamnèse révèle qu'elle est en couple depuis sept mois avec son premier petit ami stable. Bien que le désir de rapports sexuels soit présent des deux côtés, la pénétration du pénis n'a pas été possible jusqu'à présent en raison des douleurs.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Atrésie de l'hymen	Certain	Probable	Deviné
b. Vulvovaginite chronique	Certain	Probable	Deviné
c. Vaginisme psychogène	Certain	Probable	Deviné
d. Utérus myomateux	Certain	Probable	Deviné
e. Cysto-urétrite	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

114

Une patiente de 41 ans se présente avec un vertige rotatoire d'apparition soudaine et de fortes nausées. Les vertiges durent depuis quelques heures. Il n'y a pas d'acouphènes, ni de perte auditive ou d'otalgie. Cliniquement, vous pouvez constater un nystagmus vers la droite, ainsi qu'une instabilité de la marche avec une tendance à la chute vers la gauche. D'un point de vue anamnestique, il s'agit du premier épisode de vertige. De plus, la patiente a été enrhumée quelques semaines auparavant.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Neurinome de l'acoustique	Certain	Probable	Détecté
b. névrite vestibulaire	Certain	Probable	Détecté
c. Labyrinthite purulente	Certain	Probable	Détecté
d. Vertige positionnel bénin	Certain	Probable	Détecté
Je ne sais pas la réponse			

115

Un homme de 29 ans présente des tâches et des papules rouge-bleuâtre non douloureuses sur la poitrine et le dos. Le patient a perdu 7 kg depuis 6 mois et rapporte avoir été traité contre la syphilis il y a 2 ans et demi.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Syphilide tuberculeuse	Certain	Probable	Détecté
b. Mycosis fongioïde	Certain	Probable	Détecté
c. Cryptococcose	Certain	Probable	Détecté
d. Sarcome de Kaposi	Certain	Probable	Détecté
Je ne sais pas la réponse			

116

Un patient de 46 ans a dû être réanimé de manière prolongée, mais avec succès, dans le cadre d'un infarctus du myocarde antérieur avec choc cardiogénique. Dans la période qui suit, le patient ventilé développe une insuffisance rénale aiguë dans l'unité de soins intensifs.

Q: Quel est le trouble électrolytique qui en résulte le plus susceptible de mettre le patient en danger vital et qui doit être étroitement surveillé et traité ?

a. Hypercalcémie	Certain	Probable	Deviné
b. Hypocalcémie	Certain	Probable	Deviné
c. Hyperkaliémie	Certain	Probable	Deviné
d. Hypermagnésémie	Certain	Probable	Deviné
e. Hypomagnésémie	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une infirmière de 38 ans est suspectée d'avoir une hépatite B chronique active.

117

Q: Quel résultat sérologique permet d'exclure avec certitude cette maladie si, en outre, la recherche d'acides nucléiques viraux dans le sérum est négative ?

a. Titre anti-HBc fortement positif	Certain	Probable	Deviné
b. Titre anti-HBs fortement positif	Certain	Probable	Deviné
c. Titre anti-HBe fortement positif	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un couple de parents vient à la consultation avec leur fillette de 5 ans. Ils signalent que la fillette continue à mouiller son lit la nuit. L'anamnèse familiale révèle que le père a lui aussi fait pipi la nuit jusqu'à l'âge de sept ans. Aucun autre antécédent familial n'est connu. L'examen physique ne révèle aucune pathologie.

Q: Quelle est la procédure recommandée ?

a. Traitement médicamenteux	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Psychothérapie psychologique profonde	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Attendre et réévaluer la situation	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Thérapie comportementale	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
e. Une psychanalyse	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une jeune fille de 15 ans est présentée par ses parents à un cabinet psychiatrique pour des comportements agressifs. La mère a peur de se retrouver seule avec sa fille dans l'appartement depuis que celle-ci l'a menacée avec un couteau. La fille a déjà volé de l'argent à plusieurs reprises et ne respecte pas les accords passés. Souvent, les parents ne savent pas où leur fille passe la nuit.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Troubles du comportement social

Certain

Probable

Deviné

b. Trouble réactif de l'attachement

Certain

Probable

Deviné

c. Déficience de l'intelligence

Certain

Probable

Deviné

d. Syndrome hyperkinétique

Certain

Probable

Deviné

e. Syndrome de Münchhausen

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Un patient de 57 ans souffrant d'une embolie pulmonaire grave doit être soumis à une thérapie de lyse systémique.

120

Q: Quel médicament peut provoquer une réaction anaphylactique, en particulier en cas d'administration répétée ?

a. Urokinase	Certain	Probable	Deviné
b. Streptokinase	Certain	Probable	Deviné
c. rt-PA (activateur tissulaire recombinant du plasminogène)	Certain	Probable	Deviné
d. Héparine	Certain	Probable	Deviné
e. Clopidogrel	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un patient de 72 ans traité pour des ulcères gastriques récurrents vient voir son médecin généraliste pour des céphalées de tension bilatérales non pulsatiles et demande un médicament pour traiter ses céphalées.

121

Q: Quel médicament convient à ce patient ?

a. Acide acétylsalicylique	Certain	Probable	Deviné
b. Paracétamol	Certain	Probable	Deviné
c. Diclofénac	Certain	Probable	Deviné
d. Piroxicam	Certain	Probable	Deviné
e. Morphine	Certain	Probable	Deviné

122

Un homme de 30 ans subit une rupture des ligaments croisés lors d'un accident de sport et est ensuite opéré. Après quelques jours, il peut déjà se lever et aller aux toilettes. Un jour plus tard, il ressent soudainement une dyspnée et des douleurs thoraciques non respiro-dépendantes.

Q: Quel examen doit être prescrit en urgence ?

a. Spirométrie	Certain	Probable	Deviné
b. Radiographie du thorax	Certain	Probable	Deviné
c. Angiographie thoracique par CT-scanner	Certain	Probable	Deviné
d. Duplex veineux des membres inférieurs	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

123

Q: Quel médicament devrait être administré pour traiter une polymyalgia rheumatica ?

a. Glucocorticoïdes	Certain	Probable	Deviné
b. Anti-inflammatoires non stéroïdiens	Certain	Probable	Deviné
c. Inhibiteurs de la calcineurine	Certain	Probable	Deviné
d. Les myotonolytiques	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un patient souffrant d'une insuffisance rénale chronique se présente chez vous en raison de douleurs osseuses diffuses et d'une faiblesse musculaire accentuée au niveau proximal.

124

Q: Quelle valeur sérique de laboratoire correspond au diagnostic de suspicion d'hyperparathyroïdie secondaire ?

a. Taux de calcium abaissé	Certain	Probable	Deviné
b. Baisse du taux de phosphate	Certain	Probable	Deviné
c. Taux d'hormone parathyroïdienne (PTH) normal	Certain	Probable	Deviné
d. Baisse du taux de la phosphatase alcaline osseuse	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une infirmière se plaint d'abattement et de fatigue fréquente. Le diagnostic sérologique de l'hépatite donne un résultat positif pour HBsAG, anti-HBc (IgM et IgG) et un résultat négatif pour anti-HBs et anti-HBe.

125

Q: Quelle est l'interprétation la plus évidente ?

a. Porteuse de HBsAG à très faible infectiosité	Certain	Probable	Deviné
b. Porteuse du virus de l'hépatite B, virémie, infectiosité élevée	Certain	Probable	Deviné
c. Hépatite B aiguë (phase précoce)	Certain	Probable	Deviné
d. Etat après hépatite B (immunité)	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Une patiente de 32 ans, enceinte de 12 semaines, se présente avec des vomissements à répétition, quotidiens, depuis une semaine et de la fatigue. Les résultats suivants sont relevés : Abdomen souple, pas de douleur à la pression, température axillaire de 37,4°C, taux de leucocytes de 9,8/nl (valeur normale : 4,5 - 11,0/nl). L'échographie montre une grossesse intra-utérine évolutive correspondant au terme de grossesse prévu.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Infection gastro-intestinale

Certain

Probable

Deviné

b. Hépatite

Certain

Probable

Deviné

c. Appendicite

Certain

Probable

Deviné

d. Intoxication alimentaire

Certain

Probable

Deviné

e. Hyperemesis gravidarum

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Une patiente de 35 ans est admise à la 36e semaine de grossesse pour un syndrome de HELLP.

Q: Quel est le traitement le plus approprié ?

a. Tocolyse et mesures antihypertensives

Certain

Probable

Deviné

b. Césarienne

Certain

Probable

Deviné

c. Antibiothérapie et traitement antihypertenseur

Certain

Probable

Deviné

d. Mise à jeun (thérapie par perfusion, éventuellement alimentation parentérale)

Certain

Probable

Deviné

e. Déclenchement de l'accouchement par perfusion de syntocinon, amniotomie dès que possible

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

128

La régulation du cycle menstruel d'une femme est comparable à une boucle de régulation qui est contrôlée par des mécanismes de feedback négatifs et positifs.

Q: Pourquoi cette boucle de régulation s'arrête-t-elle lors de la ménopause ?

a. L'endomètre ne réagit plus aux stimuli	Certain	Probable	Deviné
b. L'hypophyse ne sécrète plus de gonadotrophines	Certain	Probable	Deviné
c. L'hypothalamus ne sécrète pas de facteurs de libération	Certain	Probable	Deviné
d. La fonction ovarienne diminue malgré la stimulation	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

129

Une patiente de 53 ans se rend à la consultation gynécologique et se plaint d'un prurit vulvaire croissant. L'inspection révèle une coloration blanche relativement homogène des grandes et petites lèvres, la peau semble fine comme du parchemin.

Q: De quelle maladie s'agit-il le plus probablement au vu de cette symptomatologie et de l'aspect extérieur ?

a. mycose vulvaire	Certain	Probable	Deviné
b. Lichen scléreux	Certain	Probable	Deviné
c. Néoplasie intraépithéliale vulvaire	Certain	Probable	Deviné
d. Carcinome de la vulve	Certain	Probable	Deviné
e. Psoriasis de la vulve	Certain	Probable	Deviné

130

Q: Quelle est la cause de décès la plus fréquente chez les patient·e·s atteints de leucémie aiguë ?

a. Le suicide

Certain

Probable

Deviné

b. Atteintes d'organes secondaires à la chimiothérapie

Certain

Probable

Deviné

c. Infections graves

Certain

Probable

Deviné

d. Saignements non contrôlables

Certain

Probable

Deviné

e. Infiltration leucémique d'organes vitaux

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

131

Un homme de 52 ans développe une galactorrhée. Un microprolactinome est diagnostiqué.

Q: Quels sont les médicaments utilisés dans le traitement médicamenteux ?

a. Anti-œstrogènes

Certain

Probable

Deviné

b. Antagonistes de la dopamine

Certain

Probable

Deviné

c. Agonistes dopaminergiques

Certain

Probable

Deviné

d. Agonistes de la sérotonine

Certain

Probable

Deviné

e. Antagonistes de la sérotonine

Certain

Probable

Deviné

f. Anti-histaminiques

Certain

Probable

Deviné

Dans certaines conditions pathologiques, des modifications métaplasiques de la muqueuse peuvent se développer dans différentes régions du tractus gastro-intestinal.

Q: Dans quelle partie du tractus gastro-intestinal la muqueuse dite de Barrett apparaît-elle ?

a. Œsophage

Certain

Probable

Deviné

b. Corps gastrique

Certain

Probable

Deviné

c. Antre gastrique

Certain

Probable

Deviné

d. Duodénum

Certain

Probable

Deviné

e. Jéjunum

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Q: En cas de paralysie verticale du regard, où se situe la lésion ?

a. Dans le thalamus

Certain

Probable

Deviné

b. Dans le noyau caudé

Certain

Probable

Deviné

c. Dans la partie haute du mésencéphale (isthme)

Certain

Probable

Deviné

d. Dans le cervelet

Certain

Probable

Deviné

e. Dans le pont

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

133 Q: En cas de paralysie verticale du regard, où se situe la lésion ?

a. Dans le thalamus	Certain	Probable	Deviné
b. Dans le noyau caudé	Certain	Probable	Deviné
c. Dans la partie haute du mésencéphale (isthme)	Certain	Probable	Deviné
d. Dans le cervelet	Certain	Probable	Deviné
e. Dans le pont	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

134

Deux polypes intestinaux sont découverts chez un patient de 55 ans lors d'une coloscopie (dans le cadre d'un examen de dépistage).

Q: Quelle est la marche à suivre indiquée ?

a. vous n'enlevez pas les polypes et renvoyez le patient chez lui, car les polypes intestinaux sont par définition bénins	Certain	Probable	Deviné
b. vous enlevez directement les polypes, car les polypes intestinaux doivent faire l'objet d'un examen histologique pour vérifier la présence d'un adénome ou d'un carcinome.	Certain	Probable	Deviné
c. vous n'enlevez pas les polypes car il s'agit d'un adénome	Certain	Probable	Deviné
d. vous envoyez le patient en chirurgie en demandant une consultation chirurgicale pour une résection partielle du côlon, car il s'agit d'une tumeur maligne.	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un patient de 63 ans a subi une intervention de chirurgie cardiaque (triple pontage veineux aortocoronarien) il y a deux jours. Aux soins intensifs, le patient, qui ne présentait jusque-là aucun signe particulier, présente soudainement les éléments suivants : sueurs froides, tachycardie (fréquence cardiaque 130/min) et hypotension (pression artérielle 84/62 mmHg). La pression veineuse centrale est fortement augmentée à 28 cm H₂O, le volume urinaire a été de 30 ml au cours de la dernière heure. La température centrale est de 37,5°C et les valeurs de laboratoire concernant l'hémoglobine, les CK, les CKMB et la troponine sont stables.

Q: Quel est le diagnostic de suspicion qui détermine la marche à suivre ?

a. Rupture de l'aorte

Certain

Probable

Deviné

b. Épanchement pleural

Certain

Probable

Deviné

c. Choc septique

Certain

Probable

Deviné

d. Tamponnade péricardique

Certain

Probable

Deviné

e. Choc hypovolémique

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Aux urgences, on vous présente un enfant de 3 ans. Il y a une heure, l'enfant a mangé du chocolat aux noix et a soudainement eu une forte quinte de toux avec cyanose. Après que le père ait secoué l'enfant par les jambes, la tête en bas, tout est cependant revenu à la normale. Vous ne trouvez rien d'anormal dans la région ORL. Le contrôle radiologique du thorax que vous avez demandé par mesure de sécurité n'a révélé aucune pathologie.

Q: Quelle est la prochaine mesure à prendre ?

a. Aucune

Certain

Probable

Deviné

b. Tomodensitométrie du thorax

Certain

Probable

Deviné

c. consultation ORL

Certain

Probable

Deviné

d. Bronchoscopie sous anesthésie générale(x)

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Une élève de 9 ans signale de fortes douleurs abdominales et des nausées. La mère rapporte que trois médecins différents ont déjà été consultés en raison de la symptomatologie. Jusqu'à présent, aucune maladie somatique n'a pu être constatée. Dans le cadre de l'anamnèse, la mère décrit que les douleurs abdominales sont liées dans le temps au décès de la grand-mère il y a environ 4 mois, avec laquelle il existait une relation intime.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Réaction aiguë au stress

Certain

Probable

Deviné

b. Appendicite

Certain

Probable

Deviné

c. Trouble dissociatif

Certain

Probable

Deviné

d. Trouble hypocondriaque

Certain

Probable

Deviné

e. Syndrome de Münchhausen

Certain

Probable

Deviné

f. Entérite à norovirus

Certain

Probable

Deviné

g. Trouble de stress post-traumatique

Certain

Probable

Deviné

h. Trouble de somatisation

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Un homme de 39 ans décrit des douleurs dorsales chroniques après un grave accident de voiture. Il semble fatigué et se décrit comme manquant de motivation et se dit épuisé. Il fait état de nausées, de frissons et de tremblements ainsi que d'anxiété et d'insomnie. Son médecin traitant est actuellement en vacances et ne peut donc pas lui délivrer son ordonnance. Il demande avec insistance de la tilidine, qui améliorerait rapidement ses symptômes.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Dépendance aux amphétamines

Certain

Probable

Deviné

b. Trouble de l'adaptation

Certain

Probable

Deviné

c. Dépendance aux benzodiazépines

Certain

Probable

Deviné

d. Épisode dépressif

Certain

Probable

Deviné

e. Dépendance aux opiacés

Certain

Probable

Deviné

f. Trouble de stress post-traumatique

Certain

Probable

Deviné

g. spondylodiscite

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

Depuis la naissance du petit frère (qui a maintenant un an), les conflits dominent le quotidien de la famille. La fille de 6 ans est agressive et refuse de communiquer avec sa mère. La mère est dépassée par les événements. Le père travaille en équipe et se retire de la vie quotidienne de la famille. C'est pourquoi les conflits entre les parents augmentent.

Q: Quelle est l'approche thérapeutique de premier choix dans ce cas ?

a. Psychothérapie analytique pour enfants et adolescents	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
b. Formation autogène	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
c. Thérapie familiale	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
d. Approche centrée sur la personne	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
e. Thérapie de couple	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
f. Entraînement aux activités de la vie quotidienne	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
g. Thérapie comportementale	☐ Certain	☐ Probable	☐ Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Un patient de 68 ans se présente aux urgences en compagnie de son épouse. Il a remarqué des douleurs rétrosternales oppressantes depuis environ deux semaines. L'anamnèse ne fait état que d'une hypertension artérielle. Il est abstinent de nicotine depuis 15 ans. Ce matin, en quittant son appartement, il a remarqué de violentes et soudaines douleurs rétrosternales. Il présente également une détresse respiratoire et une anxiété générale.

Q: Quelle est l'étape diagnostique suivante ?

a. scanner du thorax

Certain

Probable

Deviné

b. Déterminer les D-dimères en laboratoire

Certain

Probable

Deviné

c. ECG (avec fréquence cardiaque), mesure de la pression artérielle

Certain

Probable

Deviné

d. échographie de l'abdomen

Certain

Probable

Deviné

e. radiographie du thorax

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

141

Q: Lequel des tableaux cliniques suivants représente une indication pour l'administration de plasma selon les directives transversales (BÄK) pour le traitement des composants sanguins et des dérivés du plasma ?

a. Hémorragie avec une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et une coagulopathie

Certain

Probable

Deviné

b. Brûlures sans complications hémorragiques et sans coagulopathie

Certain

Probable

Deviné

c. administration prophylactique de plasma en cas d'insuffisance hépatique aiguë sans complications hémorragiques pour améliorer le pronostic

Certain

Probable

Deviné

d. remplacement primaire du volume

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

142

Une patiente de 45 ans sous chimiothérapie pour un cancer de l'ovaire se présente aux urgences avec des hémorragies punctiformes de la peau et des muqueuses dans différentes parties du corps.

Q: Quel est le paramètre de laboratoire qui vous aide le plus rapidement à confirmer le diagnostic ?

a. aPTT

Certain

Probable

Deviné

b. le facteur XIII

Certain

Probable

Deviné

c. le fibrinogène

Certain

Probable

Deviné

d. la numération plaquettaire

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

143

Après une chute, une jeune femme se plaint de douleurs dans la région de la cheville. L'anamnèse révèle que le mécanisme de l'accident est une chute par accrochage de la pointe du pied, ce qui a entraîné une flexion plantaire et une supination maximales.

Q: Quel est le ligament le plus susceptible d'être déchiré ?

a. Partie tibio-talaire antérieure du ligament deltoïde	Certain	Probable	Deviné
b. Partie tibio-talaire postérieure du ligament deltoïde	Certain	Probable	Deviné
c. Partie tibio-naviculaire du ligament deltoïde	Certain	Probable	Deviné
d. Ligament talo-fibulaire antérieur	Certain	Probable	Deviné
e. Ligament talo-fibulaire postérieur	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

144

Q: Par quel mécanisme la toxine du choléra cause-t-elle la diarrhée ?

a. Sécrétion d'ions chlorure	Certain	Probable	Deviné
b. Lésion toxique des entérocytes	Certain	Probable	Deviné
c. Activation du système nerveux entérique	Certain	Probable	Deviné
Je ne sais pas la réponse			

Vous recevez trois patients de sexe masculin, âgés de 50 ans, présentant chacun un taux de cholestérol sérique de 280 mg/dl.

Q: Chez quel patient peut-on s'attendre au plus grand bénéfice d'une réduction médicamenteuse du cholestérol en termes de qualité de vie, si les patients se distinguent en outre comme suit ?

a. Le patient A a eu un infarctus du myocarde il y a six mois, sa tension artérielle et son taux sérique de glucose à jeun sont normaux.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

b. Le patient B a eu un infarctus du myocarde il y a six mois, sa tension artérielle est de 180/96 mmHg, le glucose sérique à jeun est de 220 mg/dl.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

c. Le patient C ne présente pas de maladie cardiovasculaire manifeste, sa tension artérielle et sa glycémie sont normales.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

d. le rapport coût-efficacité est le même pour tous.

☐ Certain☐ Probable☐ Deviné

Je ne sais pas la réponse

Après un choc à la tête, un joueur de rugby de 22 ans présente une perte de conscience de quelques minutes. Par la suite, il ne se souvient guère du déroulement de l'accident et se plaint dans les semaines qui suivent de légers maux de tête, de sensations vertigineuses et d'une certaine irritabilité.

Q: Parmi les diagnostics suivants, lequel est le plus probable ?

a. Syndrome post commotionnel

Certain

Probable

Deviné

b. Méningite tuberculeuse

Certain

Probable

Deviné

c. Hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée

Certain

Probable

Deviné

d. Méningiome de la fosse postérieure

Certain

Probable

Deviné

e. Syndrome douloureux chronique cervical

Certain

Probable

Deviné

Je ne sais pas la réponse

146

Un informaticien de 56 ans souffrant de raideur et d'instabilité posturale fait régulièrement des syncopes le matin en se levant. L'examen clinique révèle un nystagmus multidirectionnel et une dysmétrie à l'épreuve doigt-nez.

Q: Quel est le diagnostic le plus probable ?

a. Encéphalomyélite disséminée

b. Myasthénie grave

c. Démence vasculaire sous-corticale

d. Glioblastome

e. Atrophie multisystémique

Je ne sais pas la réponse

147

Q: Quelle information peut-on obtenir d'une fracture cunéiforme selon MESSERER ?

a. L'os a été comprimé dans le sens de la longueur

b. La pointe du triangle fracturé indique la direction de la force

c. La pointe du triangle fracturé est dirigée dans la direction opposée à l'application de la force

d. le triangle de fracture ne permet pas de reconstituer l'effet de la force

e. il s'agit d'une fracture pathologique

Je ne sais pas la réponse