Grille d'évaluation ECOS - Problème personnel

Contexte : Cabinet de médecine générale

Patient : M. Häberli, 59 ans, consulte pour un problème personnel qu'il ne voulait pas dire à la secrétaire - patient connu depuis 20 ans

TA 150/95 mmHg

Anamnèse (25%)			Scoi	re: 0/30
Critères	Oui	±	Non	Points
Présentation du médecin Se présenter avec nom, fonction et tâche	\circ		\circ	0
Exploration du problème principal Plainte principale [Ça ne fonctionne plus comme il faut en bas]	0		0	0
3. Caractérisation temporelle du problème Durée du problème [depuis longtemps, certainement 1 an] [Maintenant ça dérange la femme et il a besoin de conseil] Fréquence [maintenant toujours] ≥2 aspects temporels explorés = 2 points	0	0	0	0
4. Symptômes associés Douleurs [non] Autres symptômes urogénitaux ≥1 symptôme associé exploré = 2 points	0	0	0	0
 5. Fonction érectile Érection possible [oui, mais ne tient que très brièvement] Éjaculation possible [non, l'érection ne dure pas assez longtemps] Libido préservée ≥2 aspects de la fonction érectile = 2 points 	0	0	0	0
6. Antécédents cardiovasculaires Maladies cardiaques [jusqu'à présent rien de connu - se sent bien] Hypertension artérielle Hypercholestérolémie [était élevée lors de la dernière consultation] ≥2 facteurs de risque CV explorés = 2 points	0	0	0	0
7. Autres antécédents médicaux Maladies rénales [non, rien de connu non plus] Diabète sucré [non] Autres maladies [non] ≥2 antécédents médicaux explorés = 2 points	0	0	0	0
8. Symptômes généraux Fièvre [non] Perte de poids [non] Sueurs nocturnes [non] ≥2 symptômes généraux explorés = 2 points	0	0	0	0
9. Médicaments Traitement actuel [statine] Autres médicaments [aucun] Observance thérapeutique ≥2 aspects médicamenteux explorés = 2 points	0	0	0	0

10. Bien-être psychologique et relationnel État psychologique [bien] Problèmes relationnels [aucun] Stress professionnel ou personnel ≥2 aspects psychosociaux explorés = 2 points	0	0	0	0
11. Mode de vie Habitudes alimentaires [aime manger, surtout la viande] Activités sportives [tennis, promenades avec le chien] Loisirs [Stammtisch (table des habitués)] ≥2 aspects du mode de vie explorés = 2 points	0	0	0	0
12. Substances Tabac [oui, 20 paquets-années] Alcool [1 bière par jour environ] Drogues [non] ≥2 substances explorées = 2 points	0	0	0	0
13. Anamnèse familiale [Père décédé d'infarctus du myocarde] [Mère a des rhumatismes] [Frère a une angine de poitrine] ≥2 antécédents familiaux explorés = 2 points	0	0	0	0
14. Anamnèse sociale Situation familiale [marié, 4 enfants] Profession [banquier] Soutien social ≥2 aspects sociaux explorés = 2 points	0	0	0	0
15. Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse Anamnèse ciblée et bien conduite Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non	0	0	0	0

men clinique (25%)		Score : 0/18		
Critères	Oui	±	Non	Points
Hygiène et préparation Désinfection des mains	0	0	\circ	0
2. Signes vitaux et mesures anthropométriques Mesure de la tension artérielle [150/95 mmHg] Poids et calcul du BMI [BMI 28] ≥1 mesure anthropométrique = 2 points	0	0	0	0
3. Inspection générale État cutané [normal] Veines jugulaires [normales] ≥1 aspect de l'inspection = 2 points	0	0	0	0
4. Examen cardiovasculaire Auscultation cardiaque [régulier, léger souffle sur la valve aortique] Pouls [régulier] Recherche de souffles vasculaires [pas de souffle sur l'aorte, artères rénales] ≥2 aspects cardiovasculaires = 2 points	0	0	0	0
5. Examen vasculaire périphérique Palpation des pouls périphériques [Pouls légèrement plus faibles aux membres inférieurs] Examen vasculaire réalisé = 2 points	0	0	0	0
6. Examen pulmonaire Auscultation pulmonaire [sans particularité]	\circ	0	\circ	0
7. Examen neurologique Sensibilité [intacte] Réflexes ostéo-tendineux ≥1 test neurologique = 2 points	0	0	0	0
8. Toucher rectal Examen de la prostate [Prostate légèrement augmentée de volume] Toucher rectal réalisé = 2 points	0	0	0	0
9. Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique Examen clinique ciblé et bien conduit Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non	0	0	0	0

Management (25%)			Sco	re : 0/20
Critères	Oui	±	Non	Points
Diagnostic principal Dysfonction érectile	0	0	0	0
2. Diagnostics différentiels et étiologies ≥3 catégories avec étiologies = 2 points, 2 catégories = 1 point	0	0	0	0
Causes vasculaires Artériosclérose des artères péniennes Maladie coronarienne Hypertension artérielle Diabète sucré (microangiopathie) Causes neurologiques Neuropathie diabétique Sclérose en plaques Lésions médullaires Chirurgie pelvienne Causes hormonales Hypogonadisme Hyperprolactinémie Hypothyroïdie Syndrome métabolique Causes anatomiques/locales Hyperplasie bénigne de la prostate Cancer de la prostate Maladie de Peyronie Priapisme antérieur Causes psychogènes Dépression Anxiété de performance Stress chronique Problèmes relationnels Causes médicamenteuses Antihypertenseurs (bêta-bloquants, diurétiques) Antidépresseurs Antihistaminiques Anti-androgènes				
3. Identification des facteurs de risque Maladie coronarienne Surpoids Sédentarité Consommation d'alcool Hypercholestérolémie Tabagisme ≥4 facteurs de risque identifiés = 2 points, 2-3 facteurs = 1 point		0	0	0
4. Examens complémentaires - Biologie Formule sanguine complète Bilan lipidique (cholestérol) Électrolytes Glycémie	0	0	0	0
≥3 examens biologiques = 2 points, 2 examens = 1 point				

5. Examens complémentaires - Autres Analyse d'urine (exclure infection urinaire) PSA si indiqué ≥1 examen spécialisé = 2 points	0	0	0	0
6. Bilan cardiologique ECG Échocardiographie Radiographie thoracique si indiquée ≥2 examens cardiologiques = 2 points	\bigcirc	0	0	0
7. Prise en charge non médicamenteuse ≥2 catégories de prise en charge = 2 points	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	0
Modifications du mode de vie Réduction pondérale (objectif BMI <25) Activité physique régulière (30 min 3x/semaine) Arrêt du tabac obligatoire Limitation de la consommation d'alcool Régime méditerranéen riche en antioxydants				
Prise en charge cardiovasculaire Contrôle de l'hypertension artérielle Optimisation du traitement hypolipémiant Régime pauvre en sel et en graisses saturées Surveillance glycémique Bilan cardiologique avant traitement				
Soutien psychologique Counseling sexuel individuel ou de couple Thérapie cognitivo-comportementale Gestion du stress et relaxation Implication de la/du partenaire si souhaité Éducation sur la sexualité				
8. Prise en charge médicamenteuse Inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 (Viagra®) Après bilan cardiologique Explication des modalités de prise Contre-indications et précautions ≥3 aspects du traitement médicamenteux = 2 points, 2 aspects = 1 point	0	0	0	0
9. Suivi et accompagnement Rendez-vous de contrôle dans 2 semaines Évaluation de l'efficacité du traitement Soutien psychologique si nécessaire Implication du/de la partenaire si souhaité ≥3 aspects de suivi = 2 points, 2 aspects = 1 point	0	0	0	0
10. Évaluation globale de la qualité de la prise en charge Prise en charge cohérente et bien conduite Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non	0	0	0	0

Communication (25%) Score: 0/2					: 0/20		
Critères			Α	В	С	D	Е
Réponse aux sentiments e Empathie, écoute active, validate Explique le déroulement de la commence l'anamnèse par un émotions, fournit du soutient	ion des émotions consultation et vérifie le		0	0	0	0	0
Structure de l'entretien Organisation logique, transitions Se présente par son nom et se s'enchaînent de manière logique.	a fonction, les étapes de	l'entretien sont identifiables et	0	0	0	0	0
3. Expression verbale Clarté, vocabulaire adapté, vérification de la compréhension Langage adapté au niveau du patient, pas de jargon, explications compréhensibles, reformulations quand nécessaire, répétitions des points clés, fait une synthèse de la consultation, bonne articulation, ton et volume adéquats			0	0	0	0	0
Expression non verbale Contact visuel, posture, gestuell Distance interpersonnelle adé et expression faciale adéquats	quate, posture adéquate	e, gestes adéquats, contact visuel saire	0	0	0	0	0
5. Évaluation générale de la Qualité globale de l'interaction n			0	0	0	0	0
Score Global		% par Section			No	te Glob	ale
0%	Anamnèse 0%	Examen clinique 0% Communication 0% A-E					
Échelle de notation							
A ≥90%	B 80-89%	C 70-79%	60-6	9%		E <60%	

Éléments non évalués

- Anamnèse : Présentation du médecin
- Anamnèse : Exploration du problème principal
- Anamnèse : Caractérisation temporelle du problème
- Anamnèse : Symptômes associés
- Anamnèse : Fonction érectile
- Anamnèse : Antécédents cardiovasculaires
- Anamnèse : Autres antécédents médicaux
- Anamnèse : Symptômes généraux
- · Anamnèse : Médicaments
- Anamnèse : Bien-être psychologique et relationnel
- Anamnèse : Mode de vie
- Anamnèse : Substances
- Anamnèse : Anamnèse familiale
- Anamnèse : Anamnèse sociale
- Anamnèse : Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse
- Examen clinique : Hygiène et préparation
- Examen clinique : Signes vitaux et mesures anthropométriques
- Examen clinique : Inspection générale
- Examen clinique : Examen cardiovasculaire
- Examen clinique : Examen vasculaire périphérique
- Examen clinique : Examen pulmonaire
- Examen clinique : Examen neurologique
- Examen clinique : Toucher rectal
- Examen clinique : Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique
- Management : Diagnostic principal
- Management : Diagnostics différentiels et étiologies
- Management : Identification des facteurs de risque
- Management : Examens complémentaires Biologie
- Management : Examens complémentaires Autres
- Management : Bilan cardiologique
- Management : Prise en charge non médicamenteuse
- Management : Prise en charge médicamenteuse
- Management : Suivi et accompagnement
- Management : Évaluation globale de la qualité de la prise en charge
- Communication : Réponse émotionnelle
- Communication : Structure
- Communication : Expression verbale
- Communication : Expression non verbale
- Communication : Évaluation générale