

# Grille d'évaluation ECOS - AMBOSS-21 - Hématurie - Homme 23 ans

📍 Service d'urgence

👤 Matthew Black, homme de 23 ans, consultant pour sang dans les urines

T° 37°C	TA 135/85 mmHg	FC 80 bpm	FR 14/min
------------	-------------------	--------------	--------------

Anamnèse (25%)

Score : 0/48

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Motif principal [J'ai du sang dans mes urines]	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Caractérisation de l'hématurie				0
Début [Il y a 2 jours]	<input type="checkbox"/>			
Constant/intermittent [Mon urine est vraiment rouge à chaque fois que j'urine. Ça me fait peur]	<input type="checkbox"/>			
Événements précipitants [Hmm... Je ne suis pas sûr. J'ai eu un rhume il y a 3 semaines. Mais je ne pense pas que ça ait un rapport]	<input type="checkbox"/>			
Progression [C'est pareil depuis 2 jours]	<input type="checkbox"/>			
Épisodes antérieurs [Non, jamais]	<input type="checkbox"/>			
Facteurs améliorants [Rien]	<input type="checkbox"/>			
Facteurs aggravants [Rien]	<input type="checkbox"/>			
Symptômes associés [J'ai l'impression d'avoir encore un peu de toux]	<input type="checkbox"/>			
3. Caractérisation de la toux				0
Début [Il y a 3 semaines quand j'ai eu ce rhume]	<input type="checkbox"/>			
Progression [Non]	<input type="checkbox"/>			
Expectoration [Non]	<input type="checkbox"/>			
Hémoptysie [Non]	<input type="checkbox"/>			
4. Recherche de symptômes spécifiques				0
Céphalées [Non]	<input type="checkbox"/>			
Œdème des chevilles [Maintenant que vous le dites, mes jambes sont un peu gonflées depuis quelques jours, oui. J'ai même eu du mal à enfiler mes chaussures ce matin]	<input type="checkbox"/>			
Fièvre/frissons [Seulement quand j'ai eu le rhume il y a 3 semaines]	<input type="checkbox"/>			
Sueurs nocturnes [Non]	<input type="checkbox"/>			
Fatigue [Je me sens un peu fatigué depuis 2 semaines]	<input type="checkbox"/>			
Éruption cutanée/changements cutanés [Non]	<input type="checkbox"/>			
Douleur thoracique [Non]	<input type="checkbox"/>			
Dyspnée [Non]	<input type="checkbox"/>			
Douleurs articulaires [Non]	<input type="checkbox"/>			
Problèmes urinaires/changements de fréquence [Je pense que j'ai uriné un peu moins cette semaine que d'habitude]	<input type="checkbox"/>			
Variations pondérales [Je n'ai pas remarqué de changement de poids]	<input type="checkbox"/>			
Mal de gorge [En ce moment je n'ai pas mal à la gorge. Il y a 3 semaines quand j'avais mon rhume, ma gorge était vraiment douloureuse par contre]	<input type="checkbox"/>			
Douleur dorsale [Les côtés de mon dos me font mal depuis 3 jours, oui]	<input type="checkbox"/>			
Nez qui coule [Eh bien, mon nez est toujours un peu bouché]	<input type="checkbox"/>			
Mal d'oreille [Non]	<input type="checkbox"/>			
Changements de vision [Non]	<input type="checkbox"/>			
5. Antécédents médicaux [Aucun]	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0

6. Allergies [Aucune]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
7. Médicaments [Juste mon spray nasal salin quotidien]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
8. Hospitalisations et antécédents chirurgicaux			0
Hospitalisations [Jamais]	<input type="checkbox"/>		
Antécédents chirurgicaux [Aucun]	<input type="checkbox"/>		
9. Contacts malades [Aucun]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
10. Antécédents familiaux [Tout le monde dans ma famille est vraiment en bonne santé]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
11. Habitudes et mode de vie			0
Travail [Je viens de terminer ma licence, et maintenant je postule pour l'école de droit]	<input type="checkbox"/>		
Domicile [Je viens de retourner vivre chez mes parents, mais c'est juste jusqu'à ce que je sois accepté à l'école de droit]	<input type="checkbox"/>		
Alcool [Je prendrai une bière ou deux le week-end, mais je ne bois généralement pas pendant la semaine]	<input type="checkbox"/>		
Drogues récréatives [Jamais]	<input type="checkbox"/>		
Tabac [Oui. Je fume environ un paquet par jour depuis 5 ans]	<input type="checkbox"/>		
Exercice [Je faisais de la natation à l'université, et je vais encore nager quelques fois par semaine habituellement. Mais ces 3 dernières semaines j'étais trop fatigué]	<input type="checkbox"/>		

Examen clinique (25%)			Score : 0/25	
Critères	Oui	±	Non	Points
1. Mesures d'hygiène				0
Lavage des mains	<input type="checkbox"/>			
Respect de la pudeur avec drap	<input type="checkbox"/>			
2. Examen de la tête, yeux, oreilles, nez et gorge				0
Inspection de la tête	<input type="checkbox"/>			
Palpation de la tête	<input type="checkbox"/>			
Inspection des conjonctives	<input type="checkbox"/>			
Inspection des oreilles	<input type="checkbox"/>			
Palpation des oreilles	<input type="checkbox"/>			
Otoscopie	<input type="checkbox"/>			
Inspection du nez	<input type="checkbox"/>			
Inspection de l'oropharynx	<input type="checkbox"/>			
3. Examen du cou	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
Palpation des ganglions lymphatiques de la tête et du cou				
4. Examen du dos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
Recherche de douleur à l'angle costo-vertébral [Sensibilité légère bilatérale à l'angle costo-vertébral]				
5. Examen cardiovasculaire	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
Auscultation cardiaque				

## 6. Examen thoracique

0

Inspection du thorax	<input type="checkbox"/>
Palpation du thorax	<input type="checkbox"/>
Percussion des champs pulmonaires	<input type="checkbox"/>
Auscultation pulmonaire	<input type="checkbox"/>
Recherche de frémits	<input type="checkbox"/>

## 7. Examen des extrémités

Recherche d'œdème déclive

☐
☐

0

## 8. Examen cutané

☐
☐

0

## Management (25%)

Score : 0/20

### Critères

Oui

±

Non

Points

### 1. Hypothèses diagnostiques

☐
☐
☐

0

2 points si au moins 2 diagnostics pertinents mentionnés, 1 point si 1 diagnostic

### Diagnostics différentiels à considérer

#### Glomérulonéphrites aiguës

##### • Glomérulonéphrite post-streptococcique → ASLO, complément C3, analyse urinaire

##### Arguments POUR:

- ☐ Syndrome néphritique typique : hématurie + HTA + œdèmes
- ☐ Infection ORL il y a 3 semaines (délai classique)
- ☐ Mal de gorge important lors du rhume (pharyngite streptococcique ?)
- ☐ Âge compatible (pic 5-12 ans mais possible jeune adulte)
- ☐ Fatigue et oligurie (atteinte rénale)
- ☐ Douleur flancs bilatérale (distension capsulaire)
- ☐ Évolution subaiguë typique

##### • Néphropathie à IgA (maladie de Berger) → Analyse urinaire, IgA sériques, biopsie rénale si doute

##### Arguments POUR:

- ☐ Présentation néphritique similaire
- ☐ Âge typique (20-30 ans)
- ☐ Rhinite chronique (nez toujours bouché)
- ☐ Plus fréquente chez l'homme

Contre : Délai 3 semaines trop long (habituellement 2-5 jours post-infection)

##### • Granulomatose avec polyangéite (Wegener) → c-ANCA, radiographie thoracique, biopsie si suspicion

##### Arguments POUR:

- ☐ Syndrome pneumo-rénal (toux persistante + néphrite)
- ☐ Rhinite chronique (90% des cas)
- ☐ Fatigue générale
- ☐ Atteinte rénale avec hématurie

Contre : Âge jeune (pic 65-74 ans), pas de signes systémiques graves, histoire infectieuse récente plus évocatrice

#### Autres causes d'hématurie

##### • Pyélonéphrite → ECBU, hémocultures si fièvre

Douleur flancs, mais pas de fièvre actuelle ni symptômes urinaires irritatifs

##### • Lithiase urinaire → Échographie rénale, scanner abdominal sans contraste

Douleur flancs présente mais bilatérale, pas de colique typique

##### • Tuberculose génito-urinaire → Recherche BK urinaire × 3, Quantiféron

Toux persistante, mais pas de signes systémiques

## 2. Examens complémentaires de première intention

0

- Échographie rénale [peut montrer des reins augmentés de taille dans la glomérulonéphrite post-streptococcique] ☐
- Analyse d'urine avec microscopie [Le sédiment néphritique est un signe classique de glomérulonéphrite post-streptococcique, néphropathie à IgA et GPA] ☐
- FSC, VS [La FSC peut montrer une anémie dans la GPA et la glomérulonéphrite post-streptococcique. Une VS significativement élevée est typique de la GPA] ☐
- Urée, créatinine [La fonction rénale doit être évaluée dans tous les cas de suspicion de maladie rénale] ☐
- Titre antistreptolysine, niveaux de complément [La glomérulonéphrite post-streptococcique après une infection de la gorge entraîne typiquement un titre antistreptolysine élevé et un complément C3 diminué, qui est normal dans la néphropathie à IgA] ☐
- c-ANCA [positif chez près de 90% des patients avec GPA] ☐

## 3. Examens d'imagerie et biopsie

0

- Radiographie thoracique [La radiographie/CT peut montrer de multiples lésions nodulaires cavitaires bilatérales dans la GPA] ☐
- Biopsie rénale [Dans la glomérulonéphrite post-streptococcique et la néphropathie à IgA, l'histoire du patient et l'évaluation en laboratoire suffisent généralement pour le diagnostic. Cependant, la biopsie rénale est le seul test diagnostique capable de vraiment confirmer ces diagnostics, et elle est donc utilisée dans les cas ambigus ou les maladies sévères ou progressives. Le diagnostic de GPA doit être confirmé par biopsie du tissu affecté, par exemple des reins] ☐

## 4. Communication avec le patient

0

- Explications au patient des impressions diagnostiques préliminaires ☐
- Explication du plan de prise en charge ☐
- Utilisation d'un langage non médical et clarification des termes médicaux ☐
- Évaluation de l'accord du patient avec le plan diagnostique ☐
- Recherche des préoccupations et questions du patient ☐
- Ne pas répéter les manœuvres douloureuses pendant l'examen physique ☐

## 5. Conseil et soutien

0

- Conseil sur l'arrêt du tabac ☐
- Réaction appropriée au défi concernant la dialyse ☐
- Rassurer sur le pronostic généralement favorable ☐
- Soutien émotionnel face à l'inquiétude ☐

### Prise en charge de la glomérulonéphrite post-streptococcique probable

- Surveillance étroite :
  - Hospitalisation si œdèmes importants ou HTA sévère
  - Monitoring TA, diurèse, poids quotidien
  - Bilan rénal régulier (créatinine, urée)
    - Traitement symptomatique :
      - Restriction hydrosodée (< 2g sel/jour)
      - Diurétiques de l'anse si œdèmes (furosémide)
  - Antihypertenseurs si HTA persistante (IEC/ARA2)
  - Repos au lit phase aiguë
    - Antibiothérapie :
      - Pénicilline V 10 jours si streptocoque encore présent
      - Érythromycine si allergie pénicilline
        - Évolution habituelle :
          - Résolution spontanée 95% cas en 3-4 semaines
          - Normalisation C3 en 6-8 semaines
          - Hématurie microscopique peut persister 1-2 ans
          - Pronostic excellent chez l'adulte jeune

## Clôture de consultation

### Défi : Inquiétude sur la dialyse

[Est-ce que j'aurai besoin de dialyse ?]

### Réponse type du candidat

M. Black, étant donné les symptômes que vous décrivez, je suis préoccupé par le fait que vos reins pourraient être affectés d'une certaine manière. Cependant, tous les patients atteints de maladie rénale ne doivent pas subir de dialyse, et selon la nature du problème, les reins peuvent souvent récupérer par eux-mêmes. Je suis content que vous soyez venu aujourd'hui. J'aimerais faire quelques tests pour déterminer exactement ce qui se passe, puis nous pourrions procéder à partir de là. Qu'est-ce que vous en pensez ?

## Communication (25%)

Score : 0/20

Critères	A	B	C	D	E
<b>1. Réponse aux sentiments et besoins du patient</b> <i>Empathie, écoute active, validation des émotions Explique le déroulement de la consultation et vérifie les préoccupations du patient, commence l'anamnèse par une question ouverte ; reconnaît, verbalise et légitime les émotions, fournit du soutien</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>2. Structure de l'entretien</b> <i>Organisation logique, transitions fluides, gestion du temps Se présente par son nom et sa fonction, les étapes de l'entretien sont identifiables et s'enchaînent de manière logique, gestion du temps, adaptation à la situation</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>3. Expression verbale</b> <i>Clarté, vocabulaire adapté, vérification de la compréhension Langage adapté au niveau du patient, pas de jargon, explications compréhensibles, reformulations quand nécessaire, répétitions des points clés, fait une synthèse de la consultation, bonne articulation, ton et volume adéquats</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>4. Expression non verbale</b> <i>Contact visuel, posture, gestuelle appropriée Distance interpersonnelle adéquate, posture adéquate, gestes adéquats, contact visuel et expression faciale adéquats, pauses quand nécessaire</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>5. Évaluation générale de la communication</b> <i>Qualité globale de l'interaction médecin-patient</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Score Global

0%

### % par Section

Anamnèse  
0%

Examen clinique  
0%

Management  
0%

Communication  
0%

### Note Globale

A-E

## Échelle de notation

A

≥90%

B

80-89%

C

70-79%

D

60-69%

E

<60%

### Œdème prenant le godet du membre inférieur

*Le tissu est nettement œdémateux au-dessus de la ligne jusqu'à laquelle la chaussette du patient avait précédemment été remontée.*

*Après avoir appliqué une pression sur la zone pré-tibiale, l'indentation résiduelle caractéristique de l'œdème prenant le godet devient visible.*



### Vascularite nécrosante des doigts

*Main droite d'une patiente de 62 ans avec suspicion de granulomatose avec polyangéite.*





### Vascularite nécrosante des orteils

Pied gauche d'un patient de 62 ans avec vascularite nécrosante des orteils (I-IV).

Le bilan a confirmé le diagnostic de granulomatose avec polyangéite.




### Glomérulonéphrite dans la granulomatose avec polyangéite

Photomicrographie d'un échantillon de biopsie rénale (coloration H&E, très fort grossissement).

Un corpuscule rénal (centre de l'image) est visible avec une nécrose fibrinoïde rouge (éosinophile) au pôle supérieur du glomérule (superposition bleue) et un infiltrat inflammatoire comprenant un mélange de neutrophiles (exemples indiqués par les pointes de flèches) et de lymphocytes (exemples indiqués par la superposition jaune).

Ces résultats indiquent une glomérulonéphrite.


Le diagnostic de granulomatose avec polyangéite a été posé sur la base d'autres résultats de biopsie non visibles ici (présence de vascularite nécrosante dans les vaisseaux sanguins rénaux de petite à moyenne taille), d'études de laboratoire supplémentaires (analyse d'urine) et de la présentation clinique (par exemple, arthralgies, atteinte oculaire).



### **Vascularite nécrosante rénale dans la granulomatose avec polyangéite**

Photomicrographie d'un échantillon de biopsie rénale (coloration H&E, grossissement moyen).

Un vaisseau sanguin rénal de taille moyenne est visible avec infiltration de neutrophiles (exemples indiqués par les pointes de flèches) et une zone de nécrose fibrinoïde (stries rouges ; superposition jaune), indiquant une vascularite nécrosante. Il y a également une abondance d'histiocytes extravasculaires (cellules épithélioïdes ; exemples indiqués par les flèches) et d'infiltrats lymphoplasmocytaires (exemples indiqués par la superposition bleue) formant des granulomes en palissade.



### **Glomérulonéphrite post-infectieuse**

Image microscopique d'une biopsie rénale (coloration PAS, fort grossissement).

Un corpuscule rénal entouré de nombreux tubules peut être vu au centre de l'image.


Parce que le corpuscule rénal est nettement élargi, l'espace entre les capillaires glomérulaires et la couche pariétale de la capsule de Bowman (contour pointillé noir) est rétréci.

Au sein du glomérule, il y a une hypercellularité due à la prolifération des cellules endothéliales (pointes de flèches jaunes) et des cellules mésangiales (pointes de flèches noires).

Un infiltrat inflammatoire, principalement des neutrophiles (pointes de flèches bleues) et des monocytes (pointes de flèches blanches), est également présent.

En conséquence, les lumières des capillaires ne sont pas clairement identifiables.

C'est l'apparence histopathologique de la glomérulonéphrite post-infectieuse.





## Néphropathie à IgA

Photomicrographie de tissu rénal (coloration PAS).


Un glomérule entouré de nombreux tubules est visible au centre de chaque image.

Il y a une prolifération de cellules mésangiales (exemples marqués par des cercles jaunes) avec dépôt de matrice extracellulaire au sein des glomérules.

Dans la néphropathie à IgA, ces changements peuvent aller de focaux segmentaires (exemples indiqués par des flèches noires) à diffus (exemples indiqués par des pointes de flèches jaunes).

C'est l'apparence histopathologique caractéristique de la néphropathie à IgA.

Contours bleus : Capillaires glomérulaires.



## Cylindres hématiques dans le sédiment urinaire


Photomicrographie du sédiment urinaire (microscopie à contraste de phase).

Un cylindre tubulaire (superposition bleue) est visible au centre de l'image.

Le cylindre est composé de nombreux globules rouges, identifiables par leur forme biconvexe caractéristique (exemples soulignés en jaune), dans une matrice de fibrine et de protéines plasmatiques.

Plusieurs cellules épithéliales entourant le cylindre hématique sont également visibles.

Les cylindres hématiques dans le sédiment urinaire sont typiquement observés dans la glomérulonéphrite.



## Nodules pulmonaires cavitaires 1/2

CT thoracique (avec contraste ; plan axial ; fenêtre pulmonaire)  
d'un patient avec antécédent de granulomatose avec  
polyangéite.

Un nodule pulmonaire caveolaire à paroi épaisse (superposition)  
est visible dans l'apex pulmonaire droit.

La granulomatose avec polyangéite (GPA) est une vascularite  
nécrosante c-ANCA positive multisystémique qui implique les  
vaisseaux sanguins de petite à moyenne taille et montre une  
prédisposition pour le système respiratoire et les reins.

Les nodules pulmonaires sont fréquents et peuvent se caviter.


La GPA peut également se manifester par une consolidation  
pulmonaire, une hémorragie et des opacités interstitielles.

L'atteinte trachéale peut entraîner une sténose sous-glottique.

LBV : veine brachiocéphalique gauche ;

RBV : veine brachiocéphalique droite ;

T : trachée.



## Scénario pour le patient standardisé

**Nom :** Matthew Black | **Âge :** 23 ans

**Contexte :** Jeune diplômé consultant aux urgences pour hématurie macroscopique

### Motif de consultation

**Plainte principale :** «J'ai du sang dans mes urines.»

**Si on demande s'il y a autre chose :** «Ça me fait vraiment peur.»

### Consignes

- Quand l'examineur tapote doucement sur les côtés de votre dos autour de la partie inférieure de votre cage thoracique, dire que ça fait un peu mal.
- Vous n'êtes pas au courant de la signification des termes médicaux (ex: échographie) et demandez des clarifications si l'examineur les utilise.
- Défi : Demander 'Est-ce que j'aurai besoin de dialyse ?'

### Histoire actuelle

#### Symptôme principal :

- Hématurie macroscopique depuis 2 jours
- Urine rouge à chaque miction
- Très inquiet et effrayé
- Pas d'amélioration
- Premier épisode

#### Symptômes associés :

- Œdème des chevilles depuis quelques jours
- Difficulté à enfiler chaussures ce matin
- Fatigue depuis 2 semaines
- Toux persistante depuis rhume
- Oligurie subjective cette semaine
- Douleur flancs bilatérale depuis 3 jours

### Simulation

#### Durant l'entretien :

- Paraître inquiet et effrayé
- Insister sur la peur du sang dans urines
- Mentionner rhume avec mal de gorge sévère il y a 3 semaines
- Demander clarifications termes médicaux
- Exprimer inquiétude sur dialyse

#### Durant le status :

- Douleur légère percussion angles costo-vertébraux
- Œdème visible chevilles
- TA légèrement élevée (135/85)
- Reste de l'examen normal
- Coopération totale

## Informations de l'expert

### Dossier médical de l'entretien

---

Homme de 23 ans avec syndrome néphritique aigu typique : hématurie macroscopique + HTA + œdèmes. Histoire très évocatrice de glomérulonéphrite post-streptococcique : pharyngite il y a 3 semaines (délai classique), âge compatible, présentation typique. Diagnostics différentiels : néphropathie IgA (délai trop long), GPA (peu probable à cet âge). Pronostic excellent avec récupération complète habituelle.

### Rôles et interventions de l'expert·e

---

L'expert·e intervient si l'étudiant·e fait :

- Analyse urine : hématurie +++, protéinurie ++, cylindres hématiques
- ASLO : 800 UI/mL (N < 200)
- C3 : 45 mg/dL (N: 90-180) - abaissé
- C4 : 25 mg/dL (N: 10-40) - normal
- Créatinine : 1.8 mg/dL (légèrement élevée)
- Échographie : reins taille augmentée, échostructure normale

### Points clés

---

- Délai 3 semaines post-pharyngite = typique GNPS
- Syndrome néphritique complet : hématurie + HTA + œdèmes
- C3 bas + ASLO élevé = diagnostic GNPS quasi certain
- Toujours rassurer : pronostic excellent jeune adulte
- Pas de corticoïdes dans GNPS (différent autres GN)
- Surveillance simple suffit souvent, hospitalisation si sévère

### Pièges

---

- Confondre avec néphropathie IgA (délai 2-5 jours)
- Prescrire antibiotiques systématiquement
- Oublier de rassurer sur dialyse
- Négliger surveillance TA et fonction rénale
- Faire biopsie d'emblée (réserver cas atypiques)

### **Diagnostic le plus probable**

Glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique (GNAPS)

### **Glomérulonéphrite post-streptococcique**

Complication immunologique post-infectieuse du streptocoque  $\beta$ -hémolytique groupe A :

- Épidémiologie : 1-2% après pharyngite, 5-10% après impétigo
- Délai : 1-3 semaines post-pharyngite, 3-6 semaines post-impétigo
- Mécanisme : complexes immuns circulants  $\rightarrow$  dépôts sous-épithéliaux
- Activation complément  $\rightarrow$  inflammation  $\rightarrow$  syndrome néphritique
- Souches néphritogènes : types M 1, 2, 4, 12, 18, 25
- Âge : pic 5-12 ans, mais possible tout âge

### **Syndrome néphritique aigu**

Triade classique avec manifestations inflammatoires glomérulaires :

- Hématurie : macroscopique (urines coca-cola) ou microscopique
- HTA : rétention sodée  $\rightarrow$  hypervolémie  $\rightarrow$  HTA parfois sévère
- Œdèmes : faciès le matin, chevilles le soir, prise poids
- Protéinurie : habituellement  $< 3\text{g}/24\text{h}$  (non néphrotique)
- Oligurie : diminution DFG par inflammation glomérulaire
- Cylindres hématiques : pathognomoniques de glomérulonéphrite

### **Diagnostic biologique GNAPS**

Marqueurs spécifiques confirmant l'étiologie post-streptococcique :

- ASLO : pic 3-5 semaines,  $> 200 \text{ UI/mL}$  (pharyngite++)
- Anti-DNase B : plus sensible pour impétigo
- C3 bas : consommation par activation voie alterne (90% cas)
- C4 normal : voie classique non activée
- Normalisation C3 en 6-8 semaines = bon pronostic
- Cylindres hématiques : globules rouges moulés tubules

### **Néphropathie à IgA vs GNAPS**

Diagnostic différentiel principal avec timing différent :

- IgA : hématurie 1-3 jours post-infection (synpharyngitique)
- GNAPS : délai 1-3 semaines (post-infectieux)
- IgA : C3/C4 normaux, IgA sériques  $\uparrow$  (50% cas)
- GNAPS : C3 bas transitoire, ASLO élevé
- IgA : récurrences fréquentes avec infections
- GNAPS : épisode unique habituel

### **Granulomatose avec polyangéite**

Vascularite systémique avec atteinte ORL-poumons-reins :

- Triade : sinusite chronique + nodules pulmonaires + glomérulonéphrite
- c-ANCA/PR3 positifs 90% formes généralisées
- Âge : pic 65-74 ans (rare jeune adulte)
- Évolution : subaiguë à chronique
- Signes systémiques : fièvre, amaigrissement, arthralgies
- Urgence thérapeutique si atteinte rénale rapidement progressive

### **Évolution et pronostic GNAPS**

Généralement excellent chez l'enfant et l'adulte jeune :

- Résolution spontanée 95% cas en 3-4 semaines
- Diurèse normale en 1-2 semaines



- TA normale en 2-3 semaines
- Hématurie microscopique peut persister 1-2 ans
- Protéinurie traces acceptable jusqu'à 6 mois
- Récupération rénale complète > 95% enfants, 90% adultes
- IRC rare : 1% enfants, 10% adultes > 60 ans

## Rappels thérapeutiques

- Restriction hydrosodée : < 2g sel/jour, liquides selon diurèse
- Furosémide : 1-2 mg/kg si œdèmes importants
- Antihypertenseurs si TA > 95e percentile :
  - - IEC/ARA2 première ligne (néphroprotection)
  - - Amlodipine si contre-indication ou insuffisant
- Pénicilline V : 250-500 mg × 2/j × 10j si streptocoque actif
- Prophylaxie familiale si cas récents streptocoque
- Repos relatif phase aiguë (pas alitement strict)
- Surveillance : TA, poids, diurèse, créatinine hebdomadaire

## Examens complémentaires

- Analyse urine + sédiment : hématurie, protéinurie, cylindres
- ASLO + anti-DNase B : confirmer infection streptococcique
- C3, C4, CH50 : C3 bas typique, normalisation 6-8 semaines
- Créatinine, urée : évaluer fonction rénale
- FSC : anémie dilution possible
- Échographie rénale : reins augmentés taille, échostructure normale
- Culture gorge : recherche streptocoque actif
- Biopsie rénale si : évolution atypique, C3 bas > 8 sem, IRC progressive