

# Grille d'évaluation ECOS - Vaccinations

Contexte : Cabinet de médecine générale

Patient : Mère venant consulter pour un conseil sur les vaccinations (jumeaux de 3 semaines, fille et garçon)

## Anamnèse (40%)

Score : 0/26

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Présentation avec nom, fonction et objectif de la consultation	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Explorer les questions de la mère [Quelles questions avez-vous concernant les vaccinations ?]	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
3. Antécédents vaccinaux et expériences Statut vaccinal de la mère [elle-même vaccinée] Profession des parents [à explorer] Niveau de connaissances sur les vaccinations [à évaluer] ≥2 antécédents vaccinaux = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. Explorer les craintes et l'environnement social Angoisses spécifiques concernant les vaccinations Influence de l'entourage (famille, amis, groupe de parents) ≥1 crainte explorée = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
5. Gestion des questions sur les effets secondaires Effets secondaires courants (douleur locale, rougeur, fièvre légère) Effets secondaires graves très rares Balance bénéfice-risque favorable Comparaison avec les risques des maladies évitées ≥3 aspects des effets secondaires = 2 points, 2 aspects = 1 point	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
6. Réponse aux préoccupations sur l'autisme Aucun lien scientifique prouvé entre vaccinations et autisme Coïncidence temporelle uniquement Études nombreuses confirmant la sécurité ≥2 arguments scientifiques = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
7. Explication de l'âge de vaccination précoce Vaccination dès 8 semaines car système immunitaire encore immature Protection nécessaire justement parce que les bébés sont vulnérables Anticorps maternels diminuent après quelques mois ≥2 explications sur l'âge = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
8. Gestion de la pression sociale négative Explication du concept d'immunité collective Responsabilité collective pour protéger les plus vulnérables Approche empathique face aux critiques ≥2 aspects de la pression sociale = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
9. Sensibilisation aux maladies évitables par vaccination Nous sommes privilégiés grâce aux vaccinations Maladies graves devenues rares donc méconnues Conséquences potentiellement dramatiques des maladies ≥2 aspects de sensibilisation = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
10. Information sur le caractère non obligatoire Pas d'obligation vaccinale en Suisse Décision parentale mais avec responsabilité des conséquences Certaines structures peuvent exiger des vaccinations ≥2 aspects légaux = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0

11. Explication des échecs vaccinaux possibles

☐☐☐

0

Nécessité de doses multiples pour une protection optimale

Échecs vaccinaux rares mais possibles

Importance du respect du calendrier vaccinal

*≥2 aspects des échecs vaccinaux = 2 points*

12. Information sur la prise en charge financière

☐☐☐

0

Vaccinations de base remboursées par l'assurance maladie

Vaccinations recommandées prises en charge

*≥1 aspect financier = 2 points*

13. Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse

☐☐☐

0

Anamnèse ciblée et bien conduite

*Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non*

**Examen clinique (30%)****Score : 0/14**

Critères	Oui	±	Non	Points
<b>1. Explication du plan vaccinal DTPa-IPV-Hib-HBV</b> Schéma: 2, 4, 6, 15-24 mois, 4-7 ans, 11-15 ans, 25-29 ans Diphthérie: croup, obstruction des voies respiratoires, myocardite, polyneuropathie Tétanos: contractions musculaires graves, potentiellement mortel Coqueluche: attention particulière chez les nourrissons (risque d'apnée) Poliomyélite: paralysie, encore présente dans certains pays Haemophilus influenzae b: méningite, épiglottite, pneumonie Hépatite B: protection précoce importante <i>≥5 valences expliquées = 2 points, 3-4 valences = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>
<b>2. Explication vaccination pneumocoques</b> Schéma: 2, 4 et 12 mois Protection contre méningite, pneumonie, septicémie Particulièrement dangereux pour les nourrissons <i>≥2 aspects pneumocoques = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>
<b>3. Explication vaccination ROR</b> Schéma: 12 mois et 15-24 mois Rougeole: >1 million décès/an dans le monde, complications: otite, pneumonie, encéphalite (1/1000, létalité 30%) Oreillons: méningite, surdité, orchite avec risque de stérilité Rubéole: dangereux pendant la grossesse, encéphalite rubéoleuse <i>≥3 aspects ROR = 2 points, 2 aspects = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>
<b>4. Explication vaccination méningocoques</b> Schéma: 12-15 mois et 11-15 ans Méningite fulminante avec létalité de 10% Septicémie méningococcique <i>≥2 aspects méningocoques = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>
<b>5. Information sur les autres vaccinations</b> HPV: 11-14 ans (2 doses) Varicelle: si pas contractée naturellement, vaccination à 11-14 ans Hépatite A: selon voyages et exposition FSME: selon région et activités Grippe: annuelle pour groupes à risque <i>≥3 autres vaccinations = 2 points, 2 vaccinations = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>
<b>6. Utilisation du carnet de vaccination</b> Importance du suivi vaccinal Conservation des dates et lots Document officiel pour voyages et inscriptions <i>≥2 aspects du carnet = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>
<b>7. Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique</b> Examen clinique ciblé et bien conduit <i>Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>0</b>

Critères	Oui	±	Non	Points
<b>1. Remise de documentation officielle</b> Guide de vaccination de l'OFSP Brochures d'information adaptées Site web de référence pour informations fiables <i>≥2 documents officiels = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>2. Planification concrète du suivi vaccinal</b> Proposition de premier rendez-vous à 2 mois Explication du calendrier complet Convenir que la mère recontacte pour fixer le rendez-vous <i>≥2 aspects de planification = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>3. Disponibilité pour questions supplémentaires</b> Offrir un nouvel entretien si nécessaire Possibilité de contact téléphonique Porte ouverte pour toute inquiétude <i>≥2 modalités de contact = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>4. Mise en garde sur les sources d'information</b> Prudence vis-à-vis des informations Internet non vérifiées Privilégier les sources officielles (OFSP, pédiatre) Éviter les forums et réseaux sociaux pour information médicale <i>≥2 conseils sur les sources = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>5. Encouragement bienveillant à la vaccination</b> Renforcement positif de la démarche de s'informer Rappel des bénéfices pour les enfants Respect du processus décisionnel parental <i>≥2 aspects d'encouragement = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>6. Information sur les maladies infectieuses émergentes</b> <i>≥2 catégories vaccinales = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<b>Vaccins de base (0-2 ans)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTPa-IPV-Hib-HBV (2, 4, 6 mois)</li> <li>• Pneumocoques (2, 4, 12 mois)</li> <li>• ROR (12 mois, 15-24 mois)</li> <li>• Méningocoques C (12 mois)</li> <li>• Surveillance clinique et calendrier vaccinal</li> </ul>				
<b>Vaccins complémentaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HPV (11-14 ans, 2 doses)</li> <li>• Varicelle (11-14 ans si non contractée)</li> <li>• Hépatite A (voyages, exposition)</li> <li>• FSME (zones endémiques)</li> <li>• Grippe (groupes à risque, annuelle)</li> </ul>				
<b>Suivi et surveillance</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carnet de vaccination à jour</li> <li>• Surveillance des effets indésirables</li> <li>• Rappels selon calendrier</li> <li>• Information continue des parents</li> <li>• Coordination avec le pédiatre</li> </ul>				
<b>7. Gestion des contre-indications</b> <i>≥2 catégories de contre-indications = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0

## Contre-indications et précautions vaccinales

### Contre-indications absolues

- Allergie grave à un composant vaccinal
- Réaction anaphylactique à une dose précédente

- Immunodéficience sévère (vaccins vivants)
- Grossesse (vaccins vivants)

### Contre-indications temporaires

- Fièvre élevée (>38,5°C)
- Maladie aiguë modérée à sévère
- Traitement immunosuppresseur en cours
- Transfusion récente (vaccins vivants)

### Faussees contre-indications

- Rhume sans fièvre
- Traitement antibiotique
- Antécédents familiaux d'effets indésirables
- Prématurité (respecter l'âge chronologique)

### Situations particulières

- Enfants immunodéprimés (protocole adapté)
- Voyageurs (vaccins spécifiques)
- Contacts de personnes immunodéprimées
- Rattrapage vaccinal (enfants non vaccinés)

### 8. Évaluation globale de la qualité de la prise en charge

○ ○ ○ 0

Prise en charge cohérente et bien conduite

Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non

### Communication (10%)

Score : 0/16

Critères	A	B	C	D	E
1. Réponse aux sentiments du patient <i>Empathie, écoute active, validation des émotions</i>	○	○	○	○	○
2. Structure de l'entretien <i>Organisation logique, transitions fluides, gestion du temps</i>	○	○	○	○	○
3. Expression verbale <i>Clarté, vocabulaire adapté, vérification de la compréhension</i>	○	○	○	○	○
4. Expression non verbale <i>Contact visuel, posture, gestuelle appropriée</i>	○	○	○	○	○

### Score Global

0%

### % par Section

Anamnèse  
0%

Examen clinique  
0%

Management  
0%

Communication  
0%

### Note Globale

A-E

### Échelle de notation

A (Excellent)

≥ 65 points (90%)

B (Très bien)

58-63 points (80-89%)

C (Bien)

51-56 points (70-79%)

D (Suffisant)

44-49 points (60-69%)

E (Insuffisant)

< 44 points (< 60%)

## Éléments non évalués

- Anamnèse : Présentation avec nom, fonction et objectif de la consultation
- Anamnèse : Explorer les questions de la mère
- Anamnèse : Antécédents vaccinaux et expériences
- Anamnèse : Explorer les craintes et l'environnement social
- Anamnèse : Gestion des questions sur les effets secondaires
- Anamnèse : Réponse aux préoccupations sur l'autisme
- Anamnèse : Explication de l'âge de vaccination précoce
- Anamnèse : Gestion de la pression sociale négative
- Anamnèse : Sensibilisation aux maladies évitables par vaccination
- Anamnèse : Information sur le caractère non obligatoire
- Anamnèse : Explication des échecs vaccinaux possibles
- Anamnèse : Information sur la prise en charge financière
- Anamnèse : Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse
- Examen clinique : Explication du plan vaccinal DTPa-IPV-Hib-HBV
- Examen clinique : Explication vaccination pneumocoques
- Examen clinique : Explication vaccination ROR
- Examen clinique : Explication vaccination méningocoques
- Examen clinique : Information sur les autres vaccinations
- Examen clinique : Utilisation du carnet de vaccination
- Examen clinique : Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique
- Management : Remise de documentation officielle
- Management : Planification concrète du suivi vaccinal
- Management : Disponibilité pour questions supplémentaires
- Management : Mise en garde sur les sources d'information
- Management : Encouragement bienveillant à la vaccination
- Management : Information sur les maladies infectieuses émergentes
- Management : Gestion des contre-indications
- Management : Évaluation globale de la qualité de la prise en charge
- Communication : Réponse émotionnelle
- Communication : Structure
- Communication : Expression verbale
- Communication : Expression non verbale