Grille d'évaluation ECOS - Yeux rouges

Contexte : Cabinet de médecine générale

Patient : Jeune homme de 20 ans consulte pour des yeux rouges bilatéraux avec démangeaisons

| Anamnèse (40%) | | | Scor | re: 0/34 |
|--|------------|---|------------|----------|
| Critères | Oui | ± | Non | Points |
| 1. Présentation avec nom, fonction et objectif de la consultation | \bigcirc | | \bigcirc | 0 |
| 2. Caractérisation du symptôme principal Yeux rouges bilatéraux [oui, les deux yeux] Démangeaisons importantes [oui, ça gratte beaucoup] Latéralité et symétrie ≥2 caractéristiques principales = 2 points | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Symptômes oculaires associés Sensation de corps étranger [oui] Douleurs oculaires [non] Baisse d'acuité visuelle [non] Photophobie [non] Vision floue Halos lumineux ≥4 symptômes oculaires = 2 points, 3 symptômes = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sécrétions et larmoiement Larmoiement [oui, les yeux coulent] Type de sécrétions (claires, purulentes) Paupières collées le matin [pas spécialement] Croûtes sur les cils ≥3 aspects des sécrétions = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Chronologie et évolution Début des symptômes [depuis quelques semaines] Mode d'installation (brutal/progressif) Évolution [progressivement aggravé] Variations journalières [pas forcément pire le matin] Facteurs déclenchants ou améliorants ≥4 aspects chronologiques = 2 points, 3 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Symptômes ORL et respiratoires associés Rhinorrhée [oui, le nez coule] Éternuements fréquents [oui] Obstruction nasale Prurit nasal Symptômes de sinusite ≥3 symptômes ORL = 2 points, 2 symptômes = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Contexte environnemental et saisonnier Période de l'année (printemps/été) Exposition à des allergènes Animaux domestiques Changements récents d'environnement Exposition professionnelle/scolaire ≥3 facteurs environnementaux = 2 points, 2 facteurs = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| 8. Port et entretien des lentilles de contact | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | 0 |
|--|------------|------------|------------|---|
| Port de lentilles [oui habituellement] | 0 | 0 | 0 | |
| Type de lentilles (souples/rigides) | | | | |
| Port aujourd'hui [non, pas aujourd'hui] | | | | |
| Durée de port quotidien | | | | |
| Hygiène et entretien | | | | |
| Changements récents de produits | | | | |
| ≥4 aspects des lentilles = 2 points, 3 aspects = 1 point | | | | |
| 9. Anamnèse familiale d'allergie | | | \bigcirc | 0 |
| Allergies dans la famille [père a toujours ça aussi] | \circ | \cup | \circ | U |
| Asthme familial [père asthmatique] | | | | |
| Eczéma/dermatite atopique [sœur a une peau bizarre] | | | | |
| Rhinite allergique familiale | | | | |
| ≥3 antécédents familiaux = 2 points, 2 antécédents = 1 point | | | | |
| | | | | |
| 10. Antécédents personnels d'atopie | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | 0 |
| Asthme personnel [oui] | | | | |
| Eczéma/dermatite atopique | | | | |
| Rhinite allergique | | | | |
| Allergies alimentaires [pommes] | | | | |
| Allergies aux animaux [chats] | | | | |
| Autres allergies [latex des gants du professeur] | | | | |
| ≥4 antécédents d'atopie = 2 points, 3 antécédents = 1 point | | | | |
| 11. Correction optique et réfraction | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | 0 |
| Port de lunettes/lentilles | | | | |
| Degré de myopie [légèrement myope, -2 dioptries] | | | | |
| Dernière consultation ophtalmologique | | | | |
| ≥2 aspects de la correction = 2 points | | | | |
| 40 NAS diagraphs at traite as a starting to the starting training and the starting training at the starting at the sta | _ | | | |
| 12. Médicaments et traitements | | \circ | \circ | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] | \circ | \circ | \circ | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques | 0 | 0 | 0 | |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] | 0 | 0 | 0 | |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] | 0 | 0 | 0 | |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] | 0 | 0 | 0 | |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances | 0 | 0 | 0 | |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités | 0 | 0 | 0 | |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens | 0 | 0 | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST | 0 | 0 | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication 23 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances 23 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens 23 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST Activité sexuelle récente [nouvelle petite amie depuis 4 semaines] | 0 | | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST Activité sexuelle récente [nouvelle petite amie depuis 4 semaines] Protection utilisée [rapports non protégés] | 0 | 0 | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST Activité sexuelle récente [nouvelle petite amie depuis 4 semaines] Protection utilisée [rapports non protégés] Symptômes urogénitaux | 0 | 0 | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST Activité sexuelle récente [nouvelle petite amie depuis 4 semaines] Protection utilisée [rapports non protégés] Symptômes urogénitaux Antécédents d'IST | 0 | | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST Activité sexuelle récente [nouvelle petite amie depuis 4 semaines] Protection utilisée [rapports non protégés] Symptômes urogénitaux | 0 | | | 0 |
| Bronchodilatateurs [Ventolin au besoin] Corticoïdes inhalés Antihistaminiques Collyres utilisés Automédication ≥3 médicaments explorés = 2 points, 2 médicaments = 1 point 13. Habitudes et toxiques Tabagisme [4-5 cigarettes par jour] Consommation d'alcool [non] Cannabis [haschisch occasionnellement] Autres substances ≥3 substances explorées = 2 points, 2 substances = 1 point 14. Contexte social et activités Scolarité [lycée/gymnase] Intégration sociale [bien intégré] Sports et loisirs Stress/examens ≥3 aspects sociaux = 2 points, 2 aspects = 1 point 15. Anamnèse sexuelle et IST Activité sexuelle récente [nouvelle petite amie depuis 4 semaines] Protection utilisée [rapports non protégés] Symptômes urogénitaux Antécédents d'IST | 0 | | | 0 |

| 16. Symptômes généraux État général [sinon en bonne santé] Fièvre Asthénie Arthralgies ≥3 symptômes généraux = 2 points, 2 symptômes = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|
| 17. Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse Anamnèse ciblée et bien conduite Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Examen clinique (30%) | Score : | | | re: 0/24 |
|--|---------|---|-----|----------|
| Critères | Oui | ± | Non | Points |
| 1. Inspection générale des yeux et annexes Hyperhémie conjonctivale bilatérale Type d'injection (diffuse, localisée, péricornéenne) Chémosis Aspect des paupières Position des cils Sourcil latéral manquant [particularité notée] ≥4 aspects de l'inspection = 2 points, 3 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Examen des paupières Œdème palpébral Érythème Croûtes, squames Éversion des paupières (recherche corps étranger) Papilles tarsales Follicules ≥4 aspects palpébraux = 2 points, 3 aspects = 1 point | 0 | | 0 | 0 |
| 3. Examen des sécrétions Nature des sécrétions (muqueuses, purulentes, aqueuses) Quantité Localisation (angle interne/externe) ≥2 aspects des sécrétions = 2 points | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Examen pupillaire Taille et symétrie des pupilles Réflexe photomoteur direct [normal] Réflexe consensuel [normal] Déficit pupillaire afférent relatif ≥3 aspects pupillaires = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Mesure de l'acuité visuelle Sans correction Avec correction [1.0 bilatéral] Vision de près Champ visuel par confrontation ≥3 tests visuels = 2 points, 2 tests = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Examen à la lampe à fente Examen des paupières et cils Film lacrymal Conjonctive bulbaire et tarsale Cornée (transparence, épithélium) Chambre antérieure (profondeur, Tyndall) Iris et cristallin ≥4 structures examinées = 2 points, 3 structures = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Test à la fluorescéine Recherche d'érosion cornéenne [négative] Recherche d'ulcère [négatif] Temps de rupture du film lacrymal [normal] Pattern de coloration ≥3 aspects fluorescéine = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| 8. Pression intraoculaire Palpation comparative Mesure si disponible Signes de glaucome aigu ≥2 aspects de la PIO = 2 points | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|
| 9. Examen ORL complémentaire Rhinoscopie antérieure Muqueuse nasale (pâle, œdématiée) Cornets Sécrétions ≥3 aspects ORL = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auscultation pulmonaire Auscultation systématique antérieure Auscultation systématique postérieure Recherche de sibilants Recherche de signes d'exacerbation asthmatique ≥3 aspects pulmonaires = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Examen cutané Recherche de lésions eczémateuses Dermographisme Signes de dermatite atopique ≥2 aspects cutanés = 2 points | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique Examen clinique ciblé et bien conduit Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Management (20%) | | | Scoi | re: 0/20 |
|---|-----|---|---------|----------|
| Critères | Oui | ± | Non | Points |
| 1. Diagnostic principal évoqué Conjonctivite allergique saisonnière Arguments en faveur du diagnostic Corrélation avec le terrain atopique ≥2 arguments diagnostiques = 2 points | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Diagnostics différentiels pertinents ≥3 catégories diagnostiques = 2 points, 2 catégories = 1 point | 0 | 0 | \circ | 0 |
| Conjonctivites infectieuses Conjonctivite virale (adénovirus) Conjonctivite bactérienne (pneumocoque, staphylocoque) Conjonctivite à Chlamydia trachomatis Conjonctivite gonococcique Conjonctivites non infectieuses Conjonctivite allergique (saisonnière, perannuelle) Conjonctivite irritative (chimique, physique) Conjonctivite giganto-papillaire (lentilles) Syndrome sec oculaire Atteintes cornéennes Kératite infectieuse Érosion cornéenne traumatique Corps étranger cornéen ou sous-tarsal Kératite liée aux lentilles Pathologies palpébrales Blépharite (séborrhéique, infectieuse) Orgelet/chalazion Ectropion/entropion Trichiasis Urgences ophtalmologiques Glaucome aigu par fermeture de l'angle Uvéite antérieure aiguë Épisclérite/sclérite Hémorragie sous-conjonctivale | | | | |
| 3. Examens complémentaires proposés Prélèvement conjonctival pour bactériologie [résultat négatif] Recherche de Chlamydia si indiqué Tests allergologiques cutanés (prick tests) [positifs aux pollens de graminées] IgE spécifiques si nécessaire Frottis conjonctival (éosinophiles) ≥3 examens pertinents = 2 points, 2 examens = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| 4. Traitement antiallergique local ≥2 catégories thérapeutiques = 2 points Traitement topique oculaire • Antihistaminiques topiques (lévocabastine, azélastine) • Stabilisateurs de mastocytes (cromoglycate, nédocromil) • Associations antihistaminique/stabilisateur • Collyres corticoïdes en cure courte si sévère • Larmes artificielles sans conservateur Traitement systémique • Antihistaminiques oraux (cétirizine, loratadine) • Corticoïdes nasaux si rhinite associée • Optimisation du traitement de l'asthme • Anti-leucotriènes si asthme sévère • Désensibilisation si échec Mesures adjuvantes • Compresses froides • Hygiène palpébrale quotidienne • Éviction des allergènes identifiés • Port de lunettes de soleil • Arrêt temporaire des lentilles | | | | 0 |
|--|---|---|---|---|
| 5. Traitement systémique Antihistaminiques oraux (cétirizine, loratadine) Optimisation du traitement de l'asthme Corticoïdes nasaux si rhinite associée ≥2 traitements systémiques = 2 points | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Mesures préventives et conseils Éviction des allergènes identifiés Port de lunettes de soleil Lavage des cheveux le soir Fenêtres fermées en période pollinique Arrêt temporaire des lentilles Hygiène palpébrale Sevrage tabagique conseillé ≥5 mesures préventives = 2 points, 3-4 mesures = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Éducation sur les IST Information sur les risques Importance de la protection Proposition de dépistage IST Conseils de prévention ≥3 aspects de prévention IST = 2 points, 2 aspects = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Planification du suivi Réévaluation si persistance des symptômes Consultation ophtalmologique si aggravation Suivi allergologique Contrôle de l'observance ≥3 modalités de suivi = 2 points, 2 modalités = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Critères de référence spécialisée Baisse d'acuité visuelle Douleur oculaire importante Photophobie marquée Échec du traitement Suspicion de complication ≥4 critères de référence = 2 points, 3 critères = 1 point | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Évaluation globale de la qualité de la prise en charge Prise en charge cohérente et bien conduite Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Communication (10% | b) | | | | | | Score | : 0/16 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| Critères | | | | Α | В | С | D | E |
| Réponse aux sentiments Empathie, écoute active, valid | • | | | \circ | \circ | \circ | 0 | 0 |
| 2. Structure de l'entretien Organisation logique, transitio | ns fluides, gestion (| du temps | | \circ | \circ | \circ | \circ | \circ |
| 3. Expression verbale Clarté, vocabulaire adapté, vé | rification de la com | préhension | | \circ | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | \circ |
| 4. Expression non verbale Contact visuel, posture, gesture | elle appropriée | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score Global | | % par | Section | | | No | te Glob | ale |
| 0% | Anamnèse 0% | Examen clinique 0% | Management 0% | Communio 0% | | | A-E | ı |
| Échelle de notation | | | | | | | | |
| A (Excellent) | | | | | | ì | ≥ 85 poin | ts (90%) |
| B (Très bien) 76-83 pc | | | | 3 points (| 30-89%) | | | |
| C (Bien) 66-74 po | | | | 4 points (| 70-79%) | | | |
| D (Suffisant) | | | | | | 57-64 | 4 points (| 60-69%) |

< 57 points (< 60%)

E (Insuffisant)

Éléments non évalués

- Anamnèse : Présentation avec nom, fonction et objectif de la consultation
- Anamnèse : Caractérisation du symptôme principal
- · Anamnèse : Symptômes oculaires associés
- · Anamnèse : Sécrétions et larmoiement
- Anamnèse : Chronologie et évolution
- Anamnèse : Symptômes ORL et respiratoires associés
- Anamnèse : Contexte environnemental et saisonnier
- Anamnèse : Port et entretien des lentilles de contact
- Anamnèse : Anamnèse familiale d'allergie
- Anamnèse : Antécédents personnels d'atopie
- Anamnèse : Correction optique et réfraction
- · Anamnèse : Médicaments et traitements
- Anamnèse : Habitudes et toxiques
- Anamnèse : Contexte social et activités
- Anamnèse : Anamnèse sexuelle et IST
- Anamnèse : Symptômes généraux
- Anamnèse : Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse
- Examen clinique : Inspection générale des yeux et annexes
- Examen clinique : Examen des paupières
- Examen clinique : Examen des sécrétions
- Examen clinique : Examen pupillaire
- Examen clinique : Mesure de l'acuité visuelle
- Examen clinique : Examen à la lampe à fente
- Examen clinique : Test à la fluorescéine
- Examen clinique : Pression intraoculaire
- Examen clinique : Examen ORL complémentaire
- Examen clinique : Auscultation pulmonaire
- Examen clinique : Examen cutané
- Examen clinique : Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique
- Management : Diagnostic principal évoqué
- Management : Diagnostics différentiels pertinents
- Management : Examens complémentaires proposés
- Management : Traitement antiallergique local
- Management : Traitement systémique
- Management : Mesures préventives et conseils
- Management : Éducation sur les IST
- Management : Planification du suivi
- Management : Critères de référence spécialisée
- Management : Évaluation globale de la qualité de la prise en charge
- Communication : Réponse émotionnelle
- Communication : Structure
- Communication : Expression verbale
- Communication : Expression non verbale