

Intoxication par le **paracétamol**

- Nausées, vomissements
- Douleurs abdominales
- Insuffisance hépatique (dans les cas graves)
 - Charbon activé** (si ingestion récente)
 - N-acétylcystéine** (antidote spécifique)

Intoxication par les **opioïdes**

- Somnolence, coma
- Dépression respiratoire
- Miosis (pupilles contractées)
 - Naloxone** 0.4mg i.v.
 - Support respiratoire**

Intoxication par les **benzodiazépines**

- Somnolence, confusion
- Hypotension
- Dépression respiratoire (dans les cas graves)
 - Surveillance** des signes vitaux
 - Flumazénil** (antidote spécifique, mais à utiliser avec précaution)

Intoxication par les **organophosphates (inh. AChE)**, par **nicotine, pilocarpine**

- Larmes et diarrhées :
- Salivation, larmimation
- Bronchoconstriction
- Altération état de conscience
- Miosis (pupilles contractées)
 - Atropine** (anti-cholinergique)
 - Support respiratoire**

Intoxication par les antidépresseurs **tricycliques**

- Tachycardie, arythmies
- Hypotension
- Convulsions, coma
 - Charbon activé** (si ingestion récente)
 - Bicarbonate de sodium** (pour les arythmies)
 - Benzodiazépines** (pour les convulsions)

Intoxication par les **bêta-bloquants**

- Bradycardie
- Hypotension
- Insuffisance cardiaque
 - Glucagon** (antidote spécifique)
 - Atropine** (pour la bradycardie)
 - Catécholamines** (pour l'hypotension)

Intoxication par les **inhibiteurs calciques**

- Bradycardie, hypotension
- Hyperglycémie
- Défaillance cardiaque
 - Charbon activé** (si ingestion récente)
 - Gluconate de calcium**
 - Insuline à haute dose et glucose**

Intoxication par les salicylates (**aspirine**)

- Acouphènes
- Hyperventilation

- Acidose métabolique
 - Charbon activé (si ingestion récente)
 - Alcalinisation des urines avec bicarbonate de sodium
 - Dialyse (dans les cas graves)

Intoxication par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

- Nausées, vomissements
- Insuffisance rénale
- Saignements gastro-intestinaux
 - Charbon activé (si ingestion récente)
 - Support symptomatique (réhydratation, etc.)

Intoxication par les anticoagulants

- Saignements excessifs
- Hématomes spontanés
 - Vitamine K (pour les anticoagulants coumariniques)
 - Prothrombine complexe concentré ou plasma frais congelé (en cas de saignements sévères)

Intoxication par les antipsychotiques

- Sédation, coma
- Hypotension
- Syndrome malin des neuroleptiques (fièvre, rigidité musculaire)
 - Charbon activé (si ingestion récente)
 - Benzodiazépines (pour l'agitation ou les convulsions)
 - Dantrolène ou bromocriptine (pour le syndrome malin des neuroleptiques)