



UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Nom de l'étudiant : -----

N° d'identification de l'étudiant : -----

CAHIER QCM

Répertoire du lundi 22 juin 2009

AVEC REPONSES

A M C

•

J U I N 2009

DIRECTIVES POUR LES QUESTIONS 1 A 8 - TYPE A

L'énoncé de la question est suivi de cinq options A) B) C) D) E), dont il faut indiquer la seule juste, ou la plus juste, sur le cahier et la feuille de réponse. Lorsque l'énoncé se termine par « sauf », c'est l'option fausse, ou la plus fausse, qu'il faut indiquer.

1.	Une histoire de traumatisme, abus et/ou violence dans l'enfance est plus fréquente dans:
A)	trouble panique
B)	trouble de personnalité borderline
C)	trouble bipolaire
D)	trouble obsessionnel compulsif
E)	aucun des troubles précédents

Réponse :

2.	La prévalence de la maladie d'Alzheimer pour un sujet de 85 ans atteint:
A)	5%
B)	10%
C)	15%
D)	25%
E)	40%

Réponse :

3.	L'état de stress post-traumatique:
A)	ne se développe que si le patient a consommé des substances psychoactives
B)	fait partie des psychoses
C)	est considéré comme un équivalent dépressif
D)	atteint plus volontiers les personnes âgées
E)	toutes ces réponses sont fausses

Réponse :



4.	Un jeune patient âgé de 28 ans chez qui on a diagnostiqué depuis 6 mois une schizophrénie reçoit un traitement de clozapine qu'il supporte bien. Son médecin lui dit qu'il devrait contrôler régulièrement:
A)	sa formule sanguine
B)	tests hépatiques
C)	la prolactine
D)	son poids
E)	ECG

Réponse :



5.	Font partie de la prise en soins communautaire du patient souffrant de psychose chronique, <u>sauf</u> :
A)	psychothérapie individuelle
B)	activité groupale de réhabilitation
C)	soutien à l'emploi
D)	placement en milieu résidentiel
E)	séjour hospitalier de longue durée

Réponse :



6.	Est le médicament le plus fréquemment utilisé pour prévenir l'hyperactivité du SNC pendant le sevrage d'alcool:
A)	naltrexone (Nemexin®)
B)	buspirone (Buspar®)
C)	rispéridone(Risperdal®)
D)	oxazépam (Seresta®)
E)	clonidine (Catapresan®)

Réponse :



7.	L'effet placebo:
A)	est entièrement explicable par la sécrétion d'endorphines
B)	ne dépend pas du prescripteur
C)	est surtout observable en milieu psychiatrique
D)	est pris en compte dans toutes les études pharmacologiques
E)	est modulé par le contexte de prescription

Réponse :



8.	La démence frontale est:
A)	plus fréquente chez les femmes âgées de plus de 75 ans
B)	démontrée par la présence d'inclusions tau-positives dans les neurones pyramidaux
C)	dans 20 % des cas, liée à des mutations sur le gène codant de la protéine tau
D)	caractérisée par une atteinte prédominante des capacités de dénomination
E)	associée à une atteinte précoce des capacités de séquençage

Réponse :



DIRECTIVES POUR LES QUESTIONS 161 A 163 - TYPE R ET N

Les questions R et N se composent d'une ou plusieurs vignettes (chaque vignette = un numéro de question) et d'une série d'options de réponse (chaque option = une lettre de l'alphabet) se rapportant à ces vignettes. Pour chaque vignette, vous devez identifier la ou les option(s) juste(s), et reporter la (les) lettre(s) correspondante(s) sur le cahier d'examen et sur la feuille de réponse à lecture optique. Le nombre de réponses à donner est indiqué entre parenthèse à la fin de chaque vignette. Chaque option peut être sélectionnée une fois, plusieurs fois, ou pas du tout.

Il est conseillé de lire tout d'abord la liste des options pour vous faire une idée du contexte examiné. Ensuite, lire la(les) vignette(s) et essayer d'en déduire la problématique. Dans le troisième temps, rechercher dans la liste des options celle(s) qui convien(ne)t le mieux à votre interprétation de la vignette.

Vignettes 161 à 163

LISTE D'OPTIONS	
A. Agitation psychomotrice	G. Insomnie
B. Diminution de la concentration	H. Irritabilité
C. Diminution de la libido	I. Logorrhée
D. Elation de l'humeur	J. Manque du mot
E. Hallucinations auditives	K. Perte d'espoir
F. Idées délirantes de persécution	

Question introductive :

Sont les symptômes que l'on peut rencontrer lors d'une évaluation psychiatrique de ces cas cliniques.

161 : Une patiente de 50 ans qui est déprimée pour la 3^{ème} fois en 4 ans et qui est sous traitement anxiolytique. **(5 réponses)**

Réponses : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

162 : Un étudiant de 17 ans qui ne parvient plus à sortir de chez lui, a peur d'être suivi dans la rue et ne parle plus à ses amis depuis 2 mois. Il dit avoir l'impression qu'on lui parle dans sa tête. **(2 réponses)**

Réponses : ☐ ☐

163 : Une femme qui a acheté pour Fr 5'000,- de vêtements alors qu'elle a des dettes, qui a quitté la maison en trombe le matin à 6h, que son mari a retrouvée plus tard et a conduite chez son médecin tant bien que mal. Elle décrit avoir le projet de se lancer dans la mode et est vêtue d'habits très voyants. **(6 réponses)**

Réponses : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DIRECTIVES POUR LES QUESTIONS 121 A 124 - TYPE K'

L'énoncé de la question est suivi de quatre options A. B. C. D. Sur le cahier et la feuille de réponse, indiquez, **pour chacune des options**, si elle est juste (+) ou fausse (-) ; **4 cases** doivent donc être noircies, dans tous les cas, pour donner une réponse valable à ce type de questions. Les cases s'y rapportant sont imprimées à droite de la feuille de réponse et numérotées à partir de 121.

121.	Est un signe habituel de ralentissement psychomoteur dépressif:
+ - A	latence de réponse augmentée
+ - B	voix monocorde
+ - C	débit pauvre
+ - D	réponses brèves

Réponses : ☐ ☐

122.	Vous rencontrez en consultation la mère d'une jeune patiente de 18 ans qui vous demande comment aider sa fille. Celle-ci consommerait de grandes quantités de nourriture variée lorsqu'elle est seule au domicile et laisserait la cuisine dans un grand désordre. Elle dit qu'elle est laide, nulle et ne voit pas de sens à sa vie. La mère soupçonne que sa fille se fasse vomir ensuite, ce que la jeune fille nierait. Elle accepterait de venir pour un rendez-vous mais ne souhaite pas que sa mère soit présente, car elle a dit avoir trop honte. Vous semble être une intervention appropriée à ce stade:
+ - A	proposer à la mère de contrôler le poids de sa fille chaque jour
+ - B	donner des adresses de traitements spécialisés pour les troubles alimentaires
+ - C	intervenir à domicile en urgence pour hospitaliser la patiente
+ - D	proposer à la fille un RDV pour discuter de la situation

Réponses : ☐ ☐

123.	Est un antidépresseur inhibant spécifiquement la recapture de la sérotonine (SSRI):
+ - A	sertraline (Zoloft®)
+ - B	citalopram (Seropram®)
+ - C	miansérine (Tolvon®)
+ - D	trazodone (Trittico®)

Réponses : ☐ ☐

124.	Dans le traitement psychothérapeutique de la dépression le fait que le patient soit convaincu qu'il souffre d'une dépression:
+ - A	est de peu d'importance
+ - B	est un facteur motivationnel important
+ - C	facilite l'introduction d'une pharmacothérapie
+ - D	améliore le pronostic

Réponses :