Aufgabe NuS I-4: Magnetischer Kreis und Induktivität

Gegeben sei die Anordnung einer Induktivität, welche gemäss **Fig. 4.1** aus einer Wicklung mit Windungszahl N auf einem dreischenkligen Kern besteht. Die Schenkel **1** und **2** des Kerns weisen je einen Luftspalt mit den Spaltbreiten δ_1 bzw. δ_2 auf. Alle Querschnittsflächen des Kerns sind gleich gross und besitzen die Abmessungen a=5 mm und b=12 mm. Sie dürfen von einer relativen Permeabilität $\mu_\Gamma \to \infty$ des Kernmaterials ausgehen.




Fig. 4.1: Wicklung auf dreischenkligem Kern.

- Zeichnen Sie das zugehörige Reluktanzmodell der Anordnung in Fig. 4.1 und berechnen Sie die darin enthaltenen magnetischen Widerstände.

 (8 Pkt.)
- b) Wie gross kann die Windungszahl N der Induktivität maximal gewählt werden, damit für die magnetische Flussdichte noch folgendes gilt: $B < B_{sat}$. (8 Pkt.)
- c) Berechnen Sie die Induktivität L der Anordnung für das in b) berechnete N_{max} . (2 Pkt.)
- d) Was passiert (qualitativ), wenn die Spaltbreite δ_1 halbiert wird ($N = N_{max}$)? (2 Pkt.)