

不定方程与不定方程组

教学目标：

1. 利用整除及奇偶性解不定方程
2. 不定方程的试值技巧
3. 学会解不定方程的经典例题

知识要点：

一、知识点说明

历史概述

不定方程是数论中最古老的分支之一。古希腊的丢番图早在公元3世纪就开始研究不定方程，因此常称不定方程为丢番图方程。中国是研究不定方程最早的国家，公元初的五家共井问题就是一个不定方程组问题，公元5世纪的《张丘建算经》中的百鸡问题标志着中国对不定方程理论有了系统研究。宋代数学家秦九韶的大衍求一术将不定方程与同余理论联系起来。

考点说明

在各类竞赛考试中，不定方程经常以应用题的形式出现，除此以外，不定方程还经常作为解题的重要方法贯穿在行程问题、数论问题等压轴大题之中。在以后初高中数学的进一步学习中，不定方程也同样有着重要的地位，所以本讲的着重目的是让学生学会利用不定方程这个工具，并能够在以后的学习中使用这个工具解题。

二、不定方程基本定义

- 1、定义：不定方程（组）是指未知数的个数多于方程个数的方程（组）。
- 2、不定方程的解：使不定方程等号两端相等的未知数的值叫不定方程的解，不定方程的解不唯一。
- 3、研究不定方程要解决三个问题：①判断何时解；②有解时确定解的个数；③求出所有的解

三、不定方程的试值技巧

- 1、奇偶性
- 2、整除的特点（能被2、3、5等数字整除的特性）
- 3、余数性质的应用（和、差、积的性质及同余的性质）

例题精讲：

模块一、利用整除性质解不定方程

【例1】求方程 $2x - 3y = 8$ 的整数解

【解析】方法一：

由原方程，易得 $2x = 8 + 3y$, $x = 4 + \frac{3}{2}y$ ，因此，对 y 的任意一个值，都有一个 x 与之对应，并且，此时 x 与 y 的值必定满足原方程，故这样的 x 与 y 是原方程的一组解，即原方程的解可表为：
$$\begin{cases} x = 4 + \frac{3}{2}k \\ y = k \end{cases}$$
，其中 k 为任意数。说明 由 y 取值的任意性，可知上述不定方程有无穷多组解。

方法二：

根据奇偶性知道 $2x$ 是偶数，8 为偶数，所以若想 $2x - 3y = 8$ 成立， y 必为偶数，当 $y=0$ ， $x=4$ ；当 $y=2$ ， $x=7$ ；当 $y=4$ ， $x=10$，本题有无穷多个解。

【巩固】求方程 $2x + 6y = 9$ 的整数解

【解析】因为 $2x+6y=2(x+3y)$ ，所以，不论 x 和 y 取何整数，都有 $2|2x+6y$ ，但 $2 \nmid 9$ ，因此，不论 x 和 y 取什么整数， $2x+6y$ 都不可能等于 9，即原方程无整数解。

说明：此题告诉我们并非所有的二元一次方程都有整数解。

【例2】求方程 $4x + 10y = 34$ 的正整数解

【解析】因为4与10的最大公约数为2，而 $2|34$ ，两边约去2后，得 $2x+5y=17$ ， $5y$ 的个位是0或5两种情况， $2x$ 是偶数，要想和为17， $5y$ 的个位只能是5， y 为奇数即可； $2x$ 的个位为2，所以 x 的取值为1、6、11、16……

$x=1$ 时， $17-2x=15$ ， $y=3$ ，

$x=6$ 时， $17-2x=5$ ， $y=1$ ，

$x=11$ 时， $17-2x=17-22$ ，无解

所以方程有两组整数解为： $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}, \begin{cases} x=6 \\ y=1 \end{cases}$

【巩固】求方程 $3x + 5y = 12$ 的整数解

【解析】由 $3x+5y=12$ ， $3x$ 是3的倍数，要想和为12（3的倍数）， $5y$ 也为3的倍数，所以 y 为3的倍数即可，所以 y 的取值为0、3、6、9、12……

$y=0$ 时， $12-5y=12$ ， $x=4$ ，

$x=3$ 时， $12-5y=12-15$ ，无解

所以方程的解为： $\begin{cases} x=4 \\ y=0 \end{cases}$

【巩固】解不定方程： $2x + 9y = 40$ （其中 x, y 均为正整数）

【解析】方法一： $2x$ 是偶数，要想和为40（偶数）， $9y$ 也为偶数，即 y 为偶数，也可以化简方程 $2x + 9y = 40$ ，

$x = 40 - 9y = 20 - 5y$ ，知道 y 为偶数，所以方程解为： $\begin{cases} x=11 \\ y=2 \end{cases}$

模块二、利用余数性质解不定方程

【例3】求不定方程 $7x + 11y = 1288$ 的正整数解有多少组？

【解析】本题无论 x 或是 y ，情况都较多，故不可能逐一试验。检验可知1288是7的倍数，所以 $11y$ 也是7的倍数，则 y 是7的倍数。

设 $y = 7z$ ，原方程可变为 $x + 11z = 184$ ， z 可以为1, 2, 3, ……16。由于每一个 z 的值都确定了原方程的一组正整数解，所以原方程共有16组正整数解。

【例4】求方程 $3x + 5y = 31$ 的整数解

【解析】方法一：利用欧拉分离法，由原方程，得 $x = \frac{31-5y}{3}$ ，即 $x = 10 - 2y + \frac{1+y}{3}$ ，要使方程有整数解 $\frac{1+y}{3}$ 必须为整数。

取 $y=2$ ，得 $x = 10 - 2y + \frac{1+y}{3} = 10 - 4 + 1 = 7$ ，故 $x=7$ ， $y=2$

当 $y=5$ ，得 $x = 10 - 2y + \frac{1+y}{3} = 10 - 10 + 2 = 2$ ，故 $x=2$ ， $y=5$

当 $y=8$ ，得 $x = 10 - 2y + \frac{1+y}{3} = 10 - 16 + 3$ 无解

所以方程的解为： $\begin{cases} x=7 \\ y=2 \end{cases}, \begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}$

方法二：利用余数的性质

$3x$ 是3的倍数，和31除以3余1，所以 $5y$ 除以3余1（ $2y$ 除以3余1），根据这个情况用余数的和与乘积性质进行判定为：

取 $y=1$ ， $2y=2$ ， $2 \div 3 = 0 \dots 2$ （舍）

$y=2$ ， $2y=4$ ， $4 \div 3 = 1 \dots 1$ （符合题意）

$y=3$ ， $2y=6$ ， $6 \div 3 = 2$ （舍）

$y=4$ ， $2y=8$ ， $8 \div 3 = 2 \dots 2$ （舍）

$$y=5, 2y=10, 10\div 3=3\cdots 1 \text{ (符合题意)}$$

$$y=6, 2y=12, 12\div 3=4 \text{ (舍)}$$

当 $y>6$ 时, 结果超过 31, 不符合题意。

$$\text{所以方程的解为: } \begin{cases} x=7 \\ y=2 \end{cases}, \begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}$$

【巩固】解方程 $7x+4y=89$, (其中 x, y 均为正整数)

【解析】方法一: $7x+4y=89$, $4y$ 是 4 的倍数, 和 89 除以 4 余 1, 所以 $7x$ 除以 4 余 1 ($7\div 4=3$), 可以看成 $3x$ 除以 4 余 1, 根据这个情况用余数的和与乘积性质进行判定为 ($x<13$)

$$x=1, 3x=3, 3\div 4=3 \text{ (舍)}$$

$$x=2, 3x=6, 6\div 4=2 \text{ (舍)}$$

$$x=3, 3x=9, 9\div 4=1 \text{ (符合题意)}$$

$$x=4, 3x=12, 12\div 4=0 \text{ (舍)}$$

$$x=5, 3x=15, 15\div 4=3 \text{ (舍)}$$

$$x=6, 3x=18, 18\div 4=2 \text{ (舍)}$$

$$x=7, 3x=21, 21\div 4=1 \text{ (符合题意)}$$

$$x=8, 3x=24, 24\div 4=0 \text{ (舍)}$$

$$x=9, 3x=27, 27\div 4=3 \text{ (舍)}$$

$$x=10, 3x=30, 30\div 4=2 \text{ (舍)}$$

$$x=11, 3x=33, 33\div 4=1 \text{ (符合题意)}$$

$$x=12, 3x=36, 36\div 4=0 \text{ (舍)}$$

$$\text{所以方程的解为: } \begin{cases} x=3 \\ y=17 \end{cases}, \begin{cases} x=7 \\ y=10 \end{cases}, \begin{cases} x=11 \\ y=3 \end{cases}$$

方法二: 利用欧拉分离法, 由原方程, $y = \frac{89-7x}{4} = 22 - 2x + \frac{1+x}{4}$, ($x+1$) 的取值为 4 的倍数即可, 所以方程的解为:

$$\begin{cases} x=3 \\ y=17 \end{cases}, \begin{cases} x=7 \\ y=10 \end{cases}, \begin{cases} x=11 \\ y=3 \end{cases}$$

模块三、解不定方程组

【例 5】解方程 $\begin{cases} 1800a+1200b+800c=16000 \\ a+b+c=15 \end{cases}$ (其中 a, b, c 均为正整数)

【解析】根据等式的性质将第一个方程整理得 $\begin{cases} 9a+6b+4c=80 \\ a+b+c=15 \end{cases}$, 根据消元的思想将第二个式子扩大 4

倍相减后为: $(9a+6b+4c)-4(a+b+c)=80-4\times 15$, 整理后得 $5a+2b=20$, 根据等式性质, $2b$ 为偶数, 20 为偶数, 所以 $5a$ 为偶数, 所以 a 为偶数, 当 $a=2$ 时, $5\times 2+2b=20$, $b=5$, 所以 $c=8$, 当 $a=4$ 时, $5\times 4+2b=20$, $b=5$, 所以无解。所以方程解为

$$\begin{cases} a=2 \\ b=5 \\ c=8 \end{cases}$$

【例 6】解不定方程 $\begin{cases} 5x+3y+\frac{1}{3}z=100 \\ x+y+z=100 \end{cases}$ (其中 x, y, z 均为正整数)

【解析】根据等式的性质将第一个方程整理得 $\begin{cases} 15x+9y+z=300 \\ x+y+z=100 \end{cases}$, 根据消元思想与第二个式子相减得

$14x+8y=200$, 根据等式的性质两边同时除以 2 得: $7x+4y=100$, 根据等式性质 $4y$ 为 4 的倍数, 100 为 4 的倍数, 所以 $7x$ 为 4 的倍数, 所以 x 为 4 的倍数试值如下

$$\begin{cases} x=4 \\ y=18 \\ z=78 \end{cases}, \begin{cases} x=8 \\ y=11 \\ z=81 \end{cases}, \begin{cases} x=12 \\ y=4 \\ z=84 \end{cases}$$