

(a)
10-seed NEU range: 2.58–3.87 pp
(mean 3.20 pp; 38.5% claims ≤ 3.0 pp)
Literature median = +3.80 pp
NEU-DET (n = 121)
GC10-DET (n = 53)
Number of evaluations
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Claimed improvement over baseline ΔmAP@0.5 (pp)
(b)
Published ΔmAP@0.5
(median, IQR; n=174)
3.80 [2.12, 6.85]
Grouped-split span (10 splits)
(SD=2.61, 82.8% var.)
8.87 span (SD 2.61)
GC10 10-seed range
(5 dets., 50 runs)
5.00 [4.02, 6.57]
NEU 10-seed range
(5 dets., 50 runs)
3.20 [2.58, 3.87]
K=10 Leakage on T_leak
(100 runs, df=9 CI)
+4.08 [1.79, 6.37]
CBAM seed cherry-pick
(within-plat. max-min)
+2.80 / +3.06
Paired BiFPN (10 seeds)
(448 tensors, df=9 CI)
+0.33 [-0.64, +1.31]
Paired CBAM (10 seeds)
(448 tensors, df=9 CI)
+0.20 [-0.88, +1.28]
Paired EMA (10 seeds)
(448 tensors, df=9 CI)
+0.01 [-0.97, +0.99]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Magnitude / effect size on mAP@0.5 (pp)