

- 检测心理学现象
 - 样本表格
 - 回答标准
 - 数学符号自定义
- 问题回答
 - 问题 1：确认试验中的变量
 - 自变量X
 - 因变量Y
 - 问题 2a：建立假设
 - 零假设
 - 对立假设
 - 问题 2b：建立统计检验
 - 选择t检验还是z检验？
 - t检验满足条件
 - t检验临界区
 - 拒绝零假设
 - 问题 3：报告描述性统计分析
 - 相依样本a和b差值中心测量-平均值和中位数
 - 相依样本a和b差值变异测量-四分位距法判别异常值
 - 问题 4：绘制数据图
 - 绘制方法：使用python的可视化库Matplotlib
 - 直方图：
 - 箱线图：
 - 问题 5：执行统计检验并解读结果
 - 计算
 - 计算公式
 - 校验
 - 结论

检测心理学现象

样本表格

Congruent（样本a）	Incongruent（样本b）	样本差值 x_{ab}
12.079	19.278	7.199
16.791	18.741	1.95
9.564	21.214	11.65
8.63	15.687	7.057
14.669	22.803	8.134
12.238	20.878	8.64
14.692	24.572	9.88
8.987	17.394	8.407
9.401	20.762	11.361
14.48	26.282	11.802
22.328	24.524	2.196
15.298	18.644	3.346

Congruent（样本a）	Incongruent（样本b）	样本差值 x_{ab}
16.929	20.33	3.401
18.2	35.255	17.055
12.13	22.158	10.028
18.495	25.139	6.644
10.639	20.429	9.79
11.344	17.425	6.081
12.369	34.288	21.919
12.944	23.894	10.95
14.233	17.96	3.727
19.71	22.058	2.348
16.004	21.157	5.153

回答标准

标准	符合要求
问题 1：确认试验中的变量	Q1：问题回复正确确认了试验中的自变量和因变量。
问题 2a：建立假设	Q2a：零假设和对立假设均以文字和数学方式进行了明确说明。数学陈述中的符号也进行了定义。
问题 2b：建立统计检验	Q2b：通过统计检验来辩证提出的假设，并针对统计检验的假设前提进行说明
问题 3：报告描述性统计分析	Q3：为数据集组计算了描述性统计分析，包括至少一项中心性测量和一项可变性测量。
问题 4：绘制数据图	Q4：创建了展示数据的一项或两项可视化，包括用注释说明图中可观察到的信息。
问题 5：执行统计检验并解读结果	Q5：正确执行并报告了一项统计检验，包括检验统计量、P 值和检验结果。检验结果针对执行的试验任务进行了解释。

数学符号自定义

参数名	类型
X	自变量
Y	因变量
\bar{x}_a	样本a的均值
\bar{x}_b	样本b的均值
μ_a	文字和颜色一致情况下，总体的均值
μ_b	文字和颜色不一致情况下，总体的均值
H_0	零假设

参数名	类型
H_a	对立假设
\bar{x}_d	样本a和b的差异均值
n_f	自由度
S	样本误差
α	最小概率
exp	异常值
t	t检验统计量
n	样本个数

问题回答

问题 1：确认试验中的变量

自变量X

文字的颜色和文字的名字是否一致

因变量Y

识别文字所需要的反应时间

问题 2a：建立假设

零假设

$H_0: \mu_b = \mu_a (\alpha < 0.05)$

假设测试人员在文字名字和颜色一致和文字名字和颜色不一致的情况下，反应时间没有显著变化

对立假设

$H_a: \mu_b > \mu_a$

假设测试人员在文字名字和颜色一致和文字名字和颜色不一致的情况下，反应时间会明显加大

问题 2b：建立统计检验

选择t检验还是z检验？

- 1. 如果样本个数大于30

如果不清楚总体方差，那么使用t检验
如果清楚总体方差，那么使用z检验

- 2. 如果样本个数小于30

如果小于样本个数小于30，那么使用t检验

结合1和2，得出结论

从样本a和b中了解到，个数是小于30，因此我们使用t检验

t检验满足条件

- 1. 样本a和b总体方差大致相等
因为样本a和b是相依样本，因此直接满足这个条件，直接假设方差相等
- 2. 样本a和b是否是近似正态分布
从样本的直方图可以看出来样本a和b近似正态分布
- 3. 是否为相依样本
从样本a和b同一个类别看出来，是相依样本
- 4. 是否包含因变量Y和自变量X
从样本钟可以看出来存在自变量X和因变量Y

t检验临界区

如果去掉异常值，那么：

总体个数： $n = 23$

样本自由度根据公式 $n_f = n - 1$ 计算得到： $n_f = 22$

从样本数据我们是想了解实不一致的情况下比一致时间要长的多，那么我们使用单尾检测

t检验在 $\alpha < 0.05$, 查询n=23时的t-table表后得到t的临界区范围 **1.717**

拒绝零假设

t统计量	拒绝零假设	结论
$t > 1.714$	是	不一致的情况下反应时间显著加大
$t \leq 1.714$	否	不一致的情况下反应时间不明显

问题 3：报告描述性统计分析

相依样本a和b差值中心测量-平均值和中位数

平均值计算公式： $\bar{x}_{ab} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_b^i - x_a^i)}{n - 1}$

平均值： $\bar{x}_{ab} = 7.96$

按照升序排列 x_{ab} ：

序号	样本差值 x_{ab}
1	1. 95

序号	样本差值 x_{ab}
2	2. 196
3	2. 348
4	2. 437
5	3. 346
6	3. 401
7	3. 727
8	5. 153
9	6. 081
10	6. 644
11	7. 057
12	7. 199
13	8. 134
14	8. 407
15	8. 64
16	9. 79
17	9. 88
18	10. 028
19	10. 95
20	11. 361
21	11. 65
22	11. 802
23	17. 055
24	21. 919

中位数计算公式： $M = \frac{x_{ab}^{12} + x_{ab}^{13}}{2}$

中位数： $M = 7.67$

相依样本a和b差值变异测量-四分位距法判别异常值

序号	样本差值 x_{ab}	Q_n
1	1. 95	
2	2. 196	
3	2. 348	
4	2. 437	
5	3. 346	

序号	样本差值 x_{nh}	Q_n
6	3.401	Q_1
7	3.727	
8	5.153	
9	6.081	
10	6.644	
11	7.057	
12	7.199	Q_2
13	8.134	
14	8.407	
15	8.64	
16	9.79	
17	9.88	
18	10.028	Q_3
19	10.95	
20	11.361	
21	11.65	
22	11.802	
23	17.055	
24	21.919	

异常值计算判断： $\exp Q_3+1.5*(Q_3-Q_1)$

根据表格我们可以得到：

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 9.94$$

$$\exp < -7.99 || \exp > 19.968$$

因此第24条数据，我们认为21.919是异常的数据

问题 4：绘制数据图

绘制方法：使用python的可视化库Matplotlib

绘制代码：

```
# -*- coding:UTF-8 -*-


import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
import numpy as np

# 0、导入数据集
df = pd.read_excel('stroopdata.xlsx', 'stroopdata')

# 1、直方图
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.hist(df['D'], bins=7)
plt.title('D distribution')
plt.xlabel('D')
plt.ylabel('num')
plt.show()


# 2、箱线图
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.boxplot(df['D'])
plt.show()
```

直方图：



Alt text

箱线图：



Alt text

问题 5：执行统计检验并解读结果

计算

因为存在一个异常值，所以删除异常值的一行表格如下：

Congruent（样本a）	Incongruent（样本b）	样本差值 x_{ab}
12.079	19.278	7.199
16.791	18.741	1.95
9.564	21.214	11.65
8.63	15.687	7.057
14.669	22.803	8.134
12.238	20.878	8.64
14.692	24.572	9.88
8.987	17.394	8.407
9.401	20.762	11.361
14.48	26.282	11.802
22.328	24.524	2.196
15.298	18.644	3.346
15.073	17.51	2.437
16.929	20.33	3.401

Congruent（样本a）	Incongruent（样本b）	样本差值 x_{ab}
12.13	22.158	10.028
18.495	25.139	6.644
10.639	20.429	9.79
11.344	17.425	6.081
12.944	23.894	10.95
14.233	17.96	3.727
19.71	22.058	2.348
16.004	21.157	5.153

计算公式

样本大小n: $n = 23$

样本a平均值: $\bar{x}_a = \frac{\sum_{i=1}^n x_a^i}{n}$

样本b平均值: $\bar{x}_b = \frac{\sum_{i=1}^n x_b^i}{n}$

相依样本a和b平均值差值: $\bar{x}_d = \bar{x}_b - \bar{x}_a$

相依样本a和b差值的标准误差: $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_b^i - x_a^i)^2}{n-1}}$

t检验的统计量: $t = \frac{\bar{x}_d}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

根据计算公式，我们可以很快得出结论：

总体个数: $n = 23$

自由度: $n_f = 22$

相依样本a和b差值的标准误差: $S = 3.94$

相依样本a和b平均值差值: $\bar{x}_d = 7.36$

t检验的统计量: $t = 8.96$

t检验在 $\alpha < 0.05$ ，查询n=22时的t-table表后得到t的临界区范围 1.717

校验

那么根据表

t统计量	拒绝零假设	结论
$t > 1.717$	是	不一致的情况下反应时间显著加大

t统计量	拒绝零假设	结论
$t \leq 1.717$	否	不一致的情况下反应时间不明显

结论

我们得到结果是拒绝零假设，当文字名字和文字颜色不一致时，时间明显变大