

a
FGOALS-f3-L
TaiESM1
FGOALS-g3
GISS-E2-1-G
FIO-ESM-2-0
CESM2
CESM2-WACCM
HadGEM3-GC31-LL
BCC-CSM2-MR
ACCESS-ESM1-5
MPI-ESM1-2-LR
CMCC-ESM2
CMCC-CM2-SR5
UKESM1-0-LL
ACCESS-CM2
GFDL-CM4
EC-Earth3
CanESM5
MPI-ESM1-2-HR
CIESM
MIROC6
CNRM-CM6-1
IPSL-CM6A-LR
MRI-ESM2-0
NESM3
ORAS5
GLORYS12V1
ECCO-V4r4
model, 1950–1980
−0.2 −0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Mean F_{ovS}, 1993–2014 (Sv)
b
CMIP6 models
model row spanning more than 1° latitude
ORAS5
GLORYS12V1
ECCO-V4r4
Limb salinity contrast ΔS (PSU)
0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4 −0.6 −0.8
10 12 14 16 18 20 22 24 26
Northward limb transport T, 1993–2014 (Sv)
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
F_{ovS} (Sv)
c
Change at 34.5 ° S (Sv)
4 2 0 −2 −4 −6 −8 −10
−14 −12 −10 −8 −6 −4 −2 0 2
Change at 26.5 ° N (Sv)
d
Mean F_{ovS}, 1950–1980 (Sv)
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 −0.1 −0.2
−12 −10 −8 −6 −4 −2
Change at 26.5 ° N, 1850–1900 to 2081–2100 (Sv)
22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 10.0 7.5
Overturning at 26.5 ° N, 1850–1900 (Sv)