

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
Дары-дармектер жана медициналык
техникалар менен камсыздандыруу
департаментинин директорунун
биринчи орун басары
Дуйшеналиев Н. К.

« 15 » октябрь 2018 - ж.



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ТИМОГЕН®

Дары каражатын колдоно баштоонун алдында ушул нускаманы көңүл коюп окуп чыгыңыз.

Нускаманы сактап коюнуз, ал кайра керек болуп калышы мүмкүн.

Бул дары рецепти жок сатылат. Оптималдуу натыйжага жетүү үчүн нускамада көрсөтүлгөн сунуштамалардын баарын так аткаруу менен дарыны пайдалануу керек.

Эгер сизде суроолор жаралса дарыгерге кайрылыңыз.

Эгер 10 күндөн кийин Сиздин абалыңыз начарлап кетсе, же жакшыруу болбосо дарыгерге кайрылыңыз.

Дарынын соодадагы аталышы: Тимоген®

Эл аралык патенттеген аталышы: жок

Химиялык аталышы: альфа-глутамил-триптофан

Дарынын түрү: мұрунга чачыратма дозаланган спрей

Курамы: дарынын бир дозасында (0,1 мл)

Taasip берүүчү зат: альфа-глутамил-триптофан (Тимогенге кайра эсептелген натрий тимогени) 25 мкг.

Көмөкчү заттар: натрий хлориди, бензалконий хлориди, тазаланган суу.

Сүрөттөмөсү

Түссүз тунук суюктук. Бензалконий хлоридинин мұнәздүү жыты бар болушуна жол берилет.

Фармадарылык тобу: башка иммундук стимуляторлор
АТХ коду: L03AX.

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы: Клеткалық, гуморалдық иммунитеттин реакцияларына жана организмдин спецификалуу резистенттүүлүгүн жөнгө салуучу таасир берет. Алар басмырланган учурда регенерация процесстерин жөнгө салат. Клеткалық метаболизм процесстеринин жүрүшүн жакшыртат. Лимфоциттердеги дифференциациялоочу рецепторлордун экспрессиясын күчтөт, иммундук жетишсиздик абалы ар башка болгон адамдардагы Т-хелперлердин, цитотоксикалык Т-лимфоциттердин санын жана алардын катнашын нормалдаштырат.

Фармакокинетикасы: дары интраназалдуу киргизилгенден кийин системалуу кан ағымына ылдам барат. Альфа-глутамил-триптофан натрий пептидазалардын таасири алдында L-глутамин кычкылдыгына жана L-триптофанга бөлүнөт, алар организмдеги пептиддик синтезге катышат.

Колдонууга көрсөтмөлөр

- жогорку дем алуу жолдорунун курч жана өнөкөт вирустук жана бактериялык ооруларын алдын алуу жана комплекстүү дарылоо;
- жаракаттан кийинки жана операциядан кийинки мезгилде иммунитеттин, кан жаратуунун, регенерация процесстеринин басмырланышын алдын алуу;
- нур терапиясында, химиялык терапияда жана антибиотик терапиясында кайталанган иммундук тартыштыкты түзөтүү максатында комплекстүү адъеванттуу терапия;
- иммунитеттин төмөндөшү менен коштолгон курч жана өнөкөт жугуштуусезгенүү ооруларын комплекстүү дарылоо.

Зарыл болгон учурда, сураныч, дарыны колдонуу алдында дарыгер менен кеңешиниз.

Колдонууга каршы көрсөтмөлөр

- дарынын курам бөлүктөрүнө жогорку сезгичтик сезгичтик;
- 1 жашка чейинки балдар.

Зарыл болгон учурда, сураныч, дарыны колдонуу алдында дарыгер менен кеңешиниз.

Кош бойлуу жана бала эмизген мезгилде: клиникалык маалыматтар жетишиз болгонуна байланыштуу кош бойлуу мезгилде жана бала эмизген мезгилде эгер эне үчүн болжолдонгон пайда түйүлдүк жана бала үчүн потенциалдуу тобокелчиликтен жогору болсо дарыгердин дайындоосу боюнча гана дары колдонулушу мүмкүн. Сураныч, дарыны колдонуу алдында дарыгерден кеңеш алыңыз.

Колдонуу жолу жана дозалары: жергиликтүү.

Флакондун түбү баш бармак менен, ал эми дозалагыч түзүлүш ортон менен сөөмөйдүн ортосуна кармалат. Дозалагыч түзүлүштүн форсункасын жогору карай вертикалдуу абалында мурунга салуу керек. Форсунканы бир жолу басуу керек.

Дары төмөнкү дозалар менен интраназалдуу киргизилет:

Чоңдорго: мурундун ар бир тарабына 1 дозадан суткасына 2 жолу 10 күн дарылоо максатында же 3-5 күн алдын алуу максатында.

Балдарга: 1 жаштан 6 жашка чейин мурдунун бир тарабына 1 доза суткасына 1 жолу, 7 жаштан 14 жашка чейин мурдунун бир тарабына 1 доза суткасына 1 жолу. Дары дарылоо максатында 10 күн, профилактика максатында 3-5 күн колдонулат. Тимоген менен кайталап дарылоо курсу 1 айдан кийин гана жүргүзүлөт.

Дарыны нускамада көрсөтүлгөн колдонуу ыкмасына ылайык жана көрсөтүлгөн дозаларда гана колдонунуз. Зарыл болгон учурда сураныч, дарыны колдонуу алдыда дарыгерден кеңеш алыңыз.

Колдонуудагы этияттуулук чаралары: талап кылбынбайт.

Ашыкча доза: ашыкча доза алган учурда мурундун былжыр челинин секрети өтө көп бөлүнүп чыгат, дары токтолулгандан кийин токтойт. Дарылоо талап кылбынбайт.

Дарыны кокусунан ичип алган учурда ашказанды суу менен жууп жана дароо дарыгерге кайрылуу керек.

Өзгөчө көрсөтмөлөр: Биринчи колдонгон жана токтолулган учурларда дарынын таасир берүү өзгөчөлүктөрү жок. Өнөкөт оорулары бар балдарга жана чондорго дары каражатын колдонуунун өзгөчөлүктөрү жок.

Кыйыр таасирлери: аллергиялык ринит. Эгер сизде көрсөтүлгөн кыйыр таасир же нускамада көрсөтүлбөгөн кыйыр таасирлер пайда болсо, дарыгерден кеңеш алыңыз.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасирлери: Химиялык терапия дары каражаттарынын (цитостатикалык, антибактериалык дары каражаттары) жана нур терапиясынын натыйжасын жогорулатат. Глюокортикоид дары каражаттарынын чоң дозалары менен бир убакта колдонуу сунушталбайт. Аталган дарылардын чоң дозаларынын иммундепрессордук натыйжасы альфа-глутамил-триптофандын иммун жөнгө салуучу таасириин нивелирлейт.

Медицинада колдонуу үчүн дары каражатынын транспорт каражаттарын, механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө тийгизгүүчү ыктымалдуу таасири тууралуу маалыматтар: дары транспорт каражаттарын башкаруу жана көңүл буруунун жогорку концентрациясын жана психомотордук реакциялардын тездигин талып кылган иштердин потенциалдуу кооптуу түрлөрү менен алектенүү жөндөмдүүлүгүнө терс таасир тийгизбейт.

Чыгаруу formasы: 25 мкг/доза 10 мл дозаланган назалдык спрей күнүрт айнектен жасалган же полимер флаконго куюлат. Флаконго пластик корпустуу, форсункасы жана коргоочу капкагы бар насос-дозатор (100 мкл) орнотулат. Бир флакон колдонуу боюнча нускама менен бирге картон кутуга салынат. Флакондогу дозалардын саны 80ден аз эмес.

Сактоо шарттары: 2°Сдан 8°Сга чейинки аба табында сакталат. Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү: 2 жыл 6 ай. Таңгакчасында көрсөтүлгөн жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонууга болбайт.

Берүүнүн шарттары: рецепти жок

Өндүрүүчү/каттоо күбөлүгүнүн ээси/дарынын сапаты боюнча жарнамаларды кабыл алган уюм:

“Цитомед” медициналык-биологиялык илимий-изилдөө комплекси” ЖАК Дареги: Россия 191023, Санкт-Петербург шаары, Мучной пер., 2, тел/факс: 8 (800) 505-03-01

www.cytomed.ru

Өндүрүш жайгашкан жердин дареги: 199178, Санкт-Петербург шаары, Васильев аралы, Малый проспект, 57-үй, 4-корпус, Ж. лит.