

# Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα Τέταρτη Εργασία

Σιώρος Βασίλειος  
Ανδρινοπούλου Χριστίνα

Νοέμβριος 2019

**1. Consider the problem**

$$\min_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}} 2 \cdot x_1 + 3 \cdot |x_2 - 10|$$

*s.t.*

$$|x_1 + 2| + |x_2| \leq 5$$

**and reformulate it a linear programming problem.**

**2. (Road lighting)** Consider a road divided in  $n$  segments that is illuminated by  $m$  lamps. Let  $p_j$  be the power of the  $j$ th lamp. The illumination  $I_i$  of the  $i$ th segment is assumed to be  $\sum_{j=1}^m a_{ij} \cdot p_j$  where  $a_{ij}$  are known coefficients. Let  $I_i^*$  be the desired illumination of road  $i$ . We are interested in choosing the lamp powers  $p_j$  so that the illuminations  $I_i$  are close to the desired  $I_i^*$ . Provide a reasonable linear programming formulation of this problem.

Έστω δρόμος χωρισμένος σε  $n$  κομμάτια.

Για να καταφέρουμε στο  $i$  κομμάτι του δρόμου ο υπάρχον φωτισμός  $I_i$  να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον επιθυμητό φωτισμό  $I_i^*$  πρέπει η διαφορά των δύο φωτισμών να είναι η μικρότερη δυνατή.

Συνεπώς, πρέπει να διαλέξουμε:

$$\min |I_i^* - I_i| \text{ για } 1 \leq i \leq n$$

Συνολικά, για ολόκληρο τον δρόμο πρέπει:

$$\min \sum_{i=1}^n |I_i^* - I_i|$$

και επειδή  $I_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} \cdot p_j$  η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί και ως

$$\min \sum_{i=1}^n \left| I_i^* - \sum_{j=1}^m a_{ij} \cdot p_j \right|$$

Η μεταβλητή που ψάχνουμε είναι τα  $p_j$ .

Οι περιορισμοί είναι (για προφανείς λόγους):

$$p_j \geq 0 \text{ για } 1 \leq j \leq m$$

3. Consider a school district with  $I$  neighborhoods,  $J$  schools and  $G$  grades at each school. Each school  $j$  has a capacity  $C_{jg}$  for grade  $g$ . In each neighborhood  $i$ , the student population of grade  $i$  is  $S_{ig}$ . Finally the distance of school  $j$  from neighborhood  $i$  is  $d_{ij}$ . Formulate a linear programming problem whose objective is to assign all students to schools, while minimizing the total distance traveled by all students. (You may ignore the fact that numbers of students must be integer).

Στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η απόσταση που διανύουν οι μαθητές για να φτάσουν στο σχολείο τους.

Οι περιορισμοί εδώ είναι:

- κάθε σχολείο μπορεί να δεχτεί συγκεκριμένο αριθμό μαθητών
- όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο.

Η κωδικοποίηση των απαραίτητων μεγεθών για το πρόβλημα είναι η εξής:

- $I$  γειτονιές
- $J$  σχολεία
- $G$  τάξεις
- $C_{jg}$  χωρητικότητα μαθητών στο σχολείο  $j$  στην τάξη  $g$
- $S_{ig}$  πληθυσμός παιδιών στη γειτονιά  $i$  στην τάξη  $g$
- $d_{ij}$  απόσταση γειτονιάς  $i$  από σχολείο  $j$
- $k_{igj}$  οι μαθητές τάξης  $g$  που μένουν στη γειτονιά  $i$  και πηγαίνουν στο σχολείο  $j$

Θέλουμε να μειωθεί η συνολική απόσταση που διανύουν οι μαθητές, άρα:

$$\min \sum_{\forall i \in I} \sum_{\forall j \in J} \sum_{\forall g \in G} k_{igj} \cdot d_{ij}$$

Υπό τους περιορισμούς:

- : το σχολείο  $j$  μπορεί να δεχτεί μέχρι  $C_{jg}$  μαθητές στην τάξη  $g$

$$\sum_{\forall i \in I} k_{igj} \leq C_{jg} \quad \forall g \in G \quad \forall j \in J$$

- Κάθε παιδί πρέπει να πηγαίνει σχολείο:

$$\sum_{\forall j \in J} k_{igj} = S_{ig} \quad \forall g \in G \quad \forall i \in I$$

- Δε μπορεί η αντιστοίχιση μαθητών σε σχολεία να είναι αρνητική:

$$k_{igj} \geq 0$$

#### 4. Consider a set $P$ described by linear inequality constraints

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i^T \cdot x \leq b_i, i = 1, \dots, m\}$$

**A ball with center  $y$  and radius  $r$  is defined as the set of all points within distance  $r$  from  $y$ . We are interested in finding a ball with the largest possible radius, which is entirely contained within the set  $P$ . Provide a linear programming formulation of this problem.**

Παρατηρούμε ότι μια σφαίρα, η οποία βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του συνόλου  $P$ , πρέπει να συμμορφώνεται στους εξής περιορισμούς:

1. Το κέντρο της σφαίρας πρέπει να ανήκει στο σύνολο  $P$ .
2. Η απόσταση, του κέντρου της σφαίρας από οποιοδήποτε υπερεπίπεδο αντιστοιχεί σε μία από τις εξισώσεις  $a_i^T \cdot x = b_i, i = 1, \dots, m$ , που περιγράφουν το σύνολο  $P$ , πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με  $r$ .

Η απόσταση, μεταξύ ενός σημείου  $p$  και ενός υπερεπιπέδου  $\kappa \cdot x + \lambda$ , δίνεται από την έκφραση

$$\frac{|\kappa \cdot p + \lambda|}{\|\kappa\|}$$

Λοιπόν, μπορούμε να εκφράσουμε μαθηματικά τους παραπάνω περιορισμούς ως εξής:

$$a_i^T \cdot c \leq b_i, i = 1, \dots, m \quad (1)$$

$$\frac{|a_i^T \cdot c - b_i|}{\|a_i^T\|} \geq r, i = 1, \dots, m \quad (2)$$

Παρατηρούμε ότι ο δεύτερος περιορισμός δεν είναι γραμμικός. Ωστόσο μπορεί να μετατραπεί σε γραμμικό.

$$(2) \stackrel{(1)}{\Rightarrow} \frac{b_i - a_i^T \cdot c}{\|a_i^T\|} \geq r, i = 1, \dots, m$$

Καταλήγουμε επομένως σε δύο γραμμικούς περιορισμούς.

Τέλος, ως αντικειμενική συνάρτηση επιλέγουμε τη σχέση

$$\max_{c \in \mathbb{R}^n, r \in \mathbb{R}} r$$