

Patrones de Asociación y Diversidad Descritos por la Familia Fabaceae Mimosoideae en una Isla Subtropical, Cuenca del Mar Caribe.

Patterns of Association and Diversity Described by the Family Fabaceae Mimosoideae on a Subtropical Island, Caribbean Sea Basin.

Welifer Junior Lebron Vicente

Estudiante de Ciencias Geográficas, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Mi resumen

Keywords: palabra clave 1, palabra clave 2

1 Introducción

El análisis de biodiversidad forestal viabiliza la obtención de información sobre el comportamiento de las especies en su hábitat, los efectos de cambios geoestacionarios, y las probables consecuencias de actividades antrópicas en el ciclo vital de los bosques. La función de los bosques tropicales puede ser productiva (madera, fibra, leña, productos no maderables); ambientales (regulación del clima, reserva de biodiversidad, conservación de suelos y agua, etc.); y social (subsistencia de poblamientos humanos locales y su cultura) (Montagnini, Jordan, & others, 2005).

La isla Barro Colorado, de coordenadas [9° 9' 0"N, 79° 51' 0" W], es una plataforma basáltica miocénica sobre la que descansa un bosque tropical primario compuesto por 305 especies arbóreas (Condit et al., 1999). En el período 1981-2015 fue el emplazamiento de ocho censos forestales realizados por el Smithsonian Tropical Research Institute, donde la subfamilia *Fabaceae Mimosoideae* representa el 5.9% de las especies registradas en la parcela de 50 hectáreas delimitada en 1980 [Cita3,WebP].

El registro forestal en la isla Barro Colorado forma parte de una serie de parcelas delimitadas en distintas latitudes y longitudes, pero dentro de la zona tropical. Las parcelas poseen diferencias climáticas específicas con el objetivo de contabilizar, supervisar y medir variables demográficas que viabilicen realizar comparaciones atendiendo a cuestionamientos científicos, registro detallado del comportamiento en ecología vegetal o problemáticas resultantes de la intervención humana en el equilibrio natural (Condit, 1998).

Las fabáceas se encuentran ampliamente distribuidas por la práctica totalidad de climas terrestres, concentrando su diversidad en la franja tropical y subtropical. Están presentes en zonas árticas, litoral costero, ambientes alpinos, bosque lluvioso, bosque estacional, sabanas, bosque seco, desiertos áridos, pantanos y manglares. Poseen características especializadas que las hacen vitales para el equilibrio ecológico y para la supervivencia del ser humano. El 88% de las especies de esta familia pueden formar nódulos con bacterias fijadoras de nitrógeno (rhizobia) para fijar el N₂ en la atmósfera mediante una asociación simbiótica, fisiología rica en proteínas, etc. Asimismo, sus semillas son empleadas para tratar células cancerígenas, sus componentes químicos las hacen esenciales para diversos tipos de industrias, y el grano de las leguminosas representa por sí solo




Figure 1: Área del censo forestal, Barro Colorado Island (1981-2015).

el 33% del nitrógeno necesario en la dieta de los seres humanos (Saikia, Nag, Anurag, Chatterjee, & Khan, 2020).

La familia *Mimosoideae* dentro del clado mimosoide es una subfamilia sumamente variable; compuesta principalmente por árboles y arbustos de flores asimétricas cigomorfas. El clado filogenético mimosoide es propio de climas tropicales y subtropicales, sus flores son simétricas con pétalos valvados y sus especímenes tienen un gran número de estambres prominentes (Hasanuz-zaman, Araújo, & Gill, 2020). En BCI se encuentran 18 de estas especies.

Atendiendo a la flexibilidad en la distribución de las fabáceas, su importancia económica, y social; se busca entender qué factores ambientales intervienen en la proliferación, agrupamiento o decaimiento de sus poblaciones en bosques tropicales que comparten características con los hallados en República Dominicana, en esta ocasión tomando la data cincuentenaria recolectada y provista por The Center for Tropical Forest Science en BCI.

La ecología numérica es el campo de estudio que brinda las técnicas, índices, y herramientas necesarias para obtener conclusiones a partir de data forestal, animal, y biotopo. En ese sentido, R es un software de código abierto y ambiente de programación que brinda una amplia variedad de facilidades para el manejo, creación, y visualización gráfica de ciencia de datos (???).

...

2 Metodología

Una vez obtenida la data censal de Barro Colorado, se empleó el software de código abierto R para realizar análisis estadísticos, gráficos, matrices, y mapas.

Utilizando los paquetes *vegan*, *tydiverse*, y *sf* se extrajo la familia *Fabaceae Mimosoideae* de la data censal, se obtuvieron las estadísticas, gráficos lineales y diagramas de cajas. A través de *mapview* se crearon, proyectaron y almacenaron los mapas. *RColorBrewer* se empleó para obtener una gama de colores más amplia en los gráficos y mapas (Batlle, 2020).

La caracterización geomorfológica se elaboró a partir del algoritmo *r.geomorphons* por (Batlle, 2020) siguiendo el modelo de (Jasiewicz & Stepinski, 2013). (Ver tabla)

Crear tabla.

Mapas de ubicación, abundancia de individuos, riqueza de especies, agrupamiento de parce-

las, pH, nitrógeno y otras variables presentes en el relieve, clima, y edafología del lugar se emplearon para determinar patrones asociativos entre las especies de fabáceas.

Se determinó la asociación interespecífica y de sitios muestrales mediante los métodos R y Q respectivamente. En el modo Q se obtuvo mediante la métrica de distancia euclídea o similaridad de Jaccard, verificando la paradoja de orlóci (1978); transformación de cuerdas (*chord*); *ji*-cuadrado; y *Hellinger*. Mientras que en el modo R se calculó el índice de correlación de Pearson aplicando la transformación de *chi* para corregir alteraciones producidas por outliers en los datos; la matriz de comunidad transpuesta convertida a binaria (presencia/ausencia) para calcular distancia entre especies con la similaridad de Jaccard; el índice *rho* de Sperman y *tau* de Kendall (Batlle, 2020).




Figure 2: Riqueza de especies acorde a su ubicación por cuadrante).

...

3 Resultados

La parcela de 50ha en BCI posee 3847 individuos de la familia *Fabaceae Mimosoideae* agrupados en 18 especies distribuidas de forma aleatoria en 50 sitios de 1ha cada uno. La especie más abundante es *Inga Marginata* [767], seguida de cerca por *Inga Umbellifera* [765]; mientras que la más escasa es *Cojoba Rufescens* [2], seguida de *Inga Oerstediana* [4]. La abundancia específica acorde a una organización ascendente por número de individuos presenta una mediana de 57 individuos [*Inga Punctata* e *Inga Laurina*], siendo la mitad más pobre de especies el equivalente a un 5.82% [224] y la mitad más presente el 94.18% [3623]. La riqueza de especies por cuadrante evidencia una distribución también desproporcional, el C26 presenta la riqueza más débil [5] y el C30 la más fuerte [13]. No obstante, aunque no existe relación directa entre la riqueza y la abundancia por cuadrante, en C26 coincide y en algunos otros cuadros puede existir cierta aproximación.

(ver tabla 1 y figura 3)

Table 1: Abundancia por especie de la familia *Fabaceae-Mimosoideae*.

Latin	n
<i>Inga marginata</i>	767

Latin	n
Inga umbellifera	765
Inga acuminata	606
Inga nobilis	557
Inga goldmanii	297
Inga thibaudiana	232
Inga sapindoides	197
Inga peizizifera	145
Inga laurina	57
Inga punctata	57
Inga cocleensis	54
Acacia melanoceras	48
Inga spectabilis	20
Abarema macradenia	19
Enterolobium schomburgkii	12
Inga ruiziana	8
Inga oerstediana	4
Cojoba rufescens	2




Figure 3: Abundancia por especie por quadrat

El terreno eminentemente describe una geomorfología en vertiente, siendo esta característica la más destacada en el 88% de los C 1Ha; en tanto que el 12% restante describe una geomorfología donde predomina el relieve llano. La parcela madre está compuesta en un 52% por bosque adulto en meseta baja distribuido ampliamente, un 24% por bosque adulto en pendiente con presencia marcada en las parcelas [C41-C45], un 16% por bosque adulto en meseta alta concentrado en las parcelas [C3-C34; C37-C40], mientras que el 8% restante hábitat pantanoso y bosque joven en forma equitativa. No parece existir una relación directa entre la morfología del espacio y un determinado hábitat, exepctuando el bosque joven que se encuentra tanto en llanura como en vertiente de forma considerable. En general, se percibe un leve aumento de la riqueza específica a medida que aumenta la abundancia de individuos; destacando la abundante riqueza de especies en el hábitat pantanoso, su pobreza en el bosque adulto en zona alta, la abundancia marcada el bosque adulto en zona baja y su riqueza equilibrada . (Ver Gráficos lineales 1 y 2).

Insertar Gráfs_Regresión_Lineal_aed_2.

—Podría interpretar mejor el boxplot— *Sería interesante dedicar un acápite para la descripción de la composición mineral del suelo, hacer un análisis de las variables de elementos tomando en cuenta 5 C con más y 5 C con menos presencia.

Las fabáceas

4 Discusión

5 Agradecimientos

6 Información de soporte

...

7 Script reproducible

...

Referencias

Battle, J. R. M. (2020). biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI: Long coding sessions (Version v0.0.0.9000). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4402362>

Condit, R. (1998). *Tropical forest census plots: Methods and results from barro colorado island, panama and a comparison with other plots*. Springer Science & Business Media.

Condit, R., Ashton, P. S., Manokaran, N., LaFrankie, J. V., Hubbell, S. P., & Foster, R. B. (1999). Dynamics of the forest communities at pasoh and barro colorado: Comparing two 50-ha plots. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 354(1391), 1739–1748.

Hasanuzzaman, M., Araújo, S., & Gill, S. S. (2020). *The plant family fabaceae: Biology and physiological responses to environmental stresses*. Springer Nature.

Jasiewicz, J., & Stepinski, T. F. (2013). Geomorphons—a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms. *Geomorphology*, 182, 147–156.

Montagnini, F., Jordan, C. F., & others. (2005). *Tropical forest ecology: The basis for conservation and management*. Springer Science & Business Media.

Saikia, P., Nag, A., Anurag, S., Chatterjee, S., & Khan, M. L. (2020). Tropical legumes: Status, distribution, biology and importance. In *The plant family fabaceae* (pp. 27–41). Springer.