

Inventario de las poblaciones de la familia Arecaceae presentes en la parcela permanente de 50ha, Barro Colorado.

Estudio poblacional, biodiversidad, agrupamiento y asociación.

Ecología numérica con R

Marcos Antonio González Reyes *Estudiante, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)*

Resumen del manuscrito

Keywords: Arecaceae, BCI, Lago Gatún, Panamá

1 Introducción

Barro Colorado es una isla localizada en el lago Gatún del Canal de Panamá. Es un área protegida, en la cual se estudian los bosques tropicales y que junto con otras cinco penínsulas cercanas, forma el Monumento Natural Barro Colorado. Estructurado en 1923 y está administrado por el Instituto Smithsonian desde 1946.

Forma parte de The Center for Tropical Science, una red compuesta por alrededor de 15 países, que estudian los bosques tropicales y la metodología estandarizada en grandes parcelas permanentes, siendo Barro Colorado la primer gran parcela en ser establecida, censada por primera vez en los años 1981-1983 (Condit, 1998). Esto con el fin de recolectar y analizar datos ecológicos para monitorear la dinámica de poblaciones y la diversidad en localidades permanentes a largo plazo.

Esto se conoce como Long-Term Monitoring, puede ser definido como el levantamiento de datos durante determinado período de tiempo en áreas contaminadas o con un alto índice de pérdida de especies. En palabras de Lindenmayer & Likens (2010), son las mediciones empíricas repetidas basadas en el campo, se recopilan continuamente y luego se analizan durante al menos 10 años.

Es un estudio a largo plazo cuando documenta los procesos importantes que componen el ecosistema o el tiempo de generación del organismo dominante, así, su duración se mide con la velocidad dinámica del sistema que se está estudiando (Franklin, 1989).

2 Metodología

El área de estudio es la parcela de 50ha en Isla Barro Colorado, localizada en el Lago Gatún en Panamá (Hubbell, Condit, & Foster, 2005) (ver figura 1). Cuenta con una extensión de terreno de 54km², cada hectarea tiene 1km²; la familia de plantas a examinar es Arecaceae Schultz Sch. Para este estudio se utilizó el software estadístico R (R Core Team, 2020), los paquetes vegan (Oksanen et al., 2019), tidyverse (Wickham, 2017), sf (Pebesma, 2018), mapview (Appelhans, Detsch, Reudenbach, & Woellauer, 2019), leaflet (Cheng, Karambelkar, & Xie, 2018), ez (Lawrence, 2016),

psych(Revelle, 2019), adespatial (Dray et al., 2020), y scripts del repositorio “Scripts de análisis de BCI” (Batlle, 2020).

También se realizaron análisis exploratorios de datos, determinación de presencia-ausencia y abundancia/riqueza de especies de la familia, para observar en cuales sitios había mayor o menor número de especies y cuales sitios presentaron las abundancias más altas o más bajas; análisis de agrupamiento, para determinar cuales sitios compartían similitudes y características que los pudieran identificar como grupo. Mediciones de asociación, con el fin de explorar las variables (geomorfológicas, ambientales, suelo, etc.) asociadas a distintas especies y sitios; diversidad biológica para evaluar como están estructuradas las comunidades en los sitios muestrados (R. Kindt & Coe, 2005); y ecología espacial que nos permite evaluar la autocorrelación inherente al área de estudio.

Se utilizó una matriz ambiental con los datos generales del área muestreada, una tabla censal de la familia estudiada; índices de Jaccard, transformada de Hellinger, Bootstrap, y distancia Euclidea para el estudio de biodiversidad, agrupamiento y determinar que sitios tienen las mayores probabilidades de formar clusters.

R Core Team (2020), R es un lenguaje y un entorno para la computación y los gráficos estadísticos, proporciona una amplia variedad de técnicas estadísticas (modelado lineal y no lineal, pruebas estadísticas clásicas, análisis de series de tiempo, clasificación, agrupamiento, etc.) y técnicas gráficas, y es altamente extensible, uno de los puntos fuertes de R es la facilidad con la que se pueden producir gráficos con calidad de publicación bien diseñados, incluidos símbolos matemáticos y fórmulas cuando sea necesario.

El paquete vegan proporciona herramientas para la ecología descriptiva de comunidades. Tiene las funciones más básicas de análisis de diversidad, ordenación de comunidades y análisis de disimilitud. La mayoría de sus herramientas multivariadas también se pueden utilizar para otros tipos de datos (Oksanen et al., 2019).

Con el paquete ‘leaflet’ se pueden crear y personalizar mapas interactivos usando la librería de JavaScript y el paquete ‘htmlwidgets’ (Cheng et al., 2018).

Paquete ‘ez’, las funciones de este paquete tienen como objetivo proporcionar una especificación simple, intuitiva y coherente de análisis y visualización de datos; las funciones de visualización también incluyen la visualización del diseño para la auditoría de datos previos al análisis y la visualización de la matriz de correlación; finalmente, este paquete incluye funciones para el análisis no paramétrico, incluidas las pruebas de permutación y remuestreo bootstrap (Lawrence, 2016).

Paquete ‘psych’, utilizado para el análisis multivariado y la construcción de escalas utilizando análisis factorial, análisis de componentes principales, análisis de conglomerados y análisis de confiabilidad, aunque otras proporcionan estadísticas descriptivas básicas (Revelle, 2019).

3 Resultados

Se muestran los resultados del estudio realizado a la familia Arecaceae en la parcela de 50ha de Barro Colorado.

En la Tabla 1 se muestran las especies presentes en la parcela permanente y la abundancia de individuos de cada especie, siendo *Oenocarpus mapora* la especie con el mayor número de individuos y *Chamaedorea tepejilote* la especie con el menor número de individuos; la figura 2 resume los datos, mostrando la distribución de las especies en la parcela, la cantidad de individuos de las especies presentes en cada sitio y cuales especies tienen mayor o menor presencia en el área de estudio, donde *Oenocarpus mapora* es la especie que mayor presencia presenta, se encuentra en




Figure 1: Área de estudio, parcela de 50ha, Isla Barro Colorado.

todos los sitios muestreados, y *Elaeis oleifera* la especie con menor presencia, solo encontrada en 3 sitios de muestreo.

Table 1: Abundancia de individuos por especie de la familia Arecaceae.

Latin	n
<i>Oenocarpus mapora</i>	1802
<i>Socratea exorrhiza</i>	500
<i>Astrocaryum standleyanum</i>	152
<i>Bactris major</i>	112
<i>Attalea butyracea</i>	32
<i>Elaeis oleifera</i>	20
<i>Bactris coloniata</i>	10
<i>Bactris barronis</i>	5
<i>Chamaedorea tepejilote</i>	4





Figure 2: Abundancia de individuos por especie en cada cuadrante.






Figure 4: Mapa de riqueza global.




Figure 5: Mapa de abundancia de individuos por cuadrante de la familia Arecaceae.




Figure 6: Mapa de riqueza de especies de la familia Arecaceae.




Figure 7: Mapa de pendiente, parcela de 50ha.




Figure 8: Mapa de nitrógeno, parcela de 50ha.




Figure 9: Mapa de pH, parcela de 50ha.

- 4 **Discusión**
- 5 **Agradecimientos**
- 6 **Información de soporte**

...

- 7 **Script reproducible**

...

Referencias

- Appelhans, T., Detsch, F., Reudenbach, C., & Woellauer, S. (2019). *Mapview: Interactive viewing of spatial data in r*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=mapview>
- Batlle, J. R. M. (2020). biogeografia-master/scripts-de-analisis-BCI: Long coding sessions (Version v0.0.0.9000). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4402362>
- Cheng, J., Karambelkar, B., & Xie, Y. (2018). *Leaflet: Create interactive web maps with the javascript 'leaflet' library*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=leaflet>
- Condit, R. (1998). *Tropical forest census plots: Methods and results from barro colorado island, panama and a comparison with other plots*. Springer Science & Business Media.
- Dray, S., Bauman, D., Blanchet, G., Borcard, D., Clappe, S., Guenard, G., ... Wagner, H. H. (2020). *Adespatial: Multivariate multiscale spatial analysis*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=adespatial>
- Franklin, J. F. (1989). Importance and justification of long-term studies in ecology. In *Long-term studies in ecology* (pp. 3–19). Springer.
- Hubbell, S., Condit, R., & Foster, R. (2005). *Forest census plot on barro colorado island*. <http://ctfs.si.edu/webatlas/datasets/bci/>.
- Kindt, R., & Coe, R. (2005). *Tree diversity analysis. a manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies*. Retrieved from <http://www.worldagroforestry.org/output/tree-diversity-analysis>
- Lawrence, M. A. (2016). *Ez: Easy analysis and visualization of factorial experiments*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=ez>
- Lindenmayer, D. B., & Likens, G. E. (2010). The science and application of ecological monitoring. *Biological Conservation*, 143(6), 1317–1328.
- Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., ... Wagner, H. (2019). *Vegan: Community ecology package*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>
- Pebesma, E. (2018). Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal*, 10(1), 439–446. <https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009>
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. Retrieved from <https://www.R-project.org/>
- Revelle, W. (2019). *Psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=psych>
- Wickham, H. (2017). *Tidyverse: Easily install and load the 'tidyverse'*. Retrieved from <https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse>