Distribución y abundancia relativa de la familia Rubiaceae en la parcela permanente Isla Barro Colorado Subtítulo Subtítulo

J. Alberto Meléndez Juan Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Resumen del manuscrito

Keywords: palabra clave 1, palabra clave 2

1 Introducción

Las comunidades vegetales de los bosques neotropicales ejemplifican la diversidad y complejidad ecológica de la región tropical. El estudio continuo de la riqueza y la abundancia relativa en estas comunidades permite identificar las especies raras, las cuales son más vulnerables a los cambios en su hábitat y propensas a extinguirse localmente (Volkov, Banavar, Hubbell, & Maritan, 2003). Conocer estos aspectos de las comunidades ecológicas y como se encuentran distribuidas en el espacio las especies que las componen, ofrece la oportunidad de comprender como evolucionan en el tiempo y los factores que inciden en su conservación (Moreno, 2001).

La familia Rubiaceae es un importante grupo de plantas vasculares de distribución cosmopolita con una marcada diversidad en regiones tropicales y subtropicales (Davis et al., 2009). Las rubieaceas son especialmente diversas en el neotrópico y resulta un grupo idóneo para estudios ecológicos con énfasis en la estructura de las comunidades de la región. El presente estudio intenta averiguar la relación entre abundancia relativa de especies de la familia rubiaceae y su distribución en una porción de bosque húmedo tropical en la parcela permanente Barro Colorado Island, Panamá—[]. Los parámetros de riqueza y abundancia relativa obtenidos mediante análisis de datos de los censos realizados en el área de estudio indicarán el aporte de la familia rubiaceae a la diversidad de su comunidad.

Muchas especies dentro de la familia rubiaceae se encuentran adaptadas a rangos elevados de ácides y otras condiciones específicas de los componentes del suelo, como diversos grados de concentración de distintos metales(Jansen, Robbrecht, Beeckman, & Smets, 2000). En ese sentido, este trabajo aprovecha la información disponible sobre las características del hábitat en el cual crecen las poblaciones de plantas para conocer posibles patrones en la distribución de las especies objeto de este estudio y como varía la diversidad alpha con respecto a estas propiedades del terreno y otras condiciones ambientales medibles.

Además de las condiciones ambientales, estudios anteriores sugieren que interacciones interespecíficas entre rubiaceas del sotobosque amazonico (Torres-Leite et al. (2019)) podrían determinar como se organizan estas especies de plantas en la comunidad vegetal y conocer la relación entre la ocurrencia de las distintas especies de rubiaceas en nuestra área de estudio forma parte de los objetivos de este trabajo.

Estudios anteriores de la diversidad beta de la zona, especificamente del bosque tropical panameño, sugieren una tendencia a la disimilaridad en la composición de las comunidades entre sí que aumenta con la distancia en la cual las comunidades se encuentran separadas en el espacio. (co-

munidades comparadas lejanas unas de otras son más diferentes en cuanto a su composición floristica).

Como se estructuran las comunidades ecológicas refiere al número de individuos de cada taxa que las componen(Ricotta, 2004), además de su distribución en el espacio. Este número se encuentra sujeto a diversas variables las cuales aún no se conocen del todo ni en qué grado inciden en la estructura de la comunidad (Neda, Horvat, Tohati, Derzsi, & Balogh, 2008).

2 Metodología

. . .

3 Resultados

Como indica la tabla 1

Table 1: Abundancia por especie.

Latin	n
Faramea occidentalis	24989
Alseis blackiana	7928
Psychotria horizontalis	2453
Coussarea curvigemmia	2010
Palicourea guianensis	1118
Randia armata	937
Psychotria marginata	761
Alibertia edulis	417
Pentagonia macrophylla	306
Guettarda foliacea	252
Hamelia axillaris	128
Macrocnemum roseum	87
Posoqueria latifolia	73
Psychotria limonensis	70
Genipa americana	67
Psychotria graciliflora	65
Psychotria grandis	57
Psychotria deflexa	38
Amaioua corymbosa	19
Psychotria chagrensis	16
Psychotria acuminata	14
Tocoyena pittieri	8
Psychotria racemosa	7
Psychotria cyanococca	4
Chimarrhis parviflora	3
Coutarea hexandra	3
Psychotria brachiata	3
Appunia seibertii	2

Latin	n
Borojoa panamensis	1
Psychotria hoffmannseggiana	1
Rosenbergiodendron formosum	1




Figure 1: Número de individuos de cada especie por hectárea.

c1	c2	c3	c4	c5
	adasdadaadadadasdasdasdadadadasdasdasdaadasdas			asdsd asdasddad

- 4 Discusión
- 5 Agradecimientos
- 6 Información de soporte

• • •

7 Script reproducible

. . .

Referencias

Davis, A. P., Govaerts, R., Bridson, D. M., Ruhsam, M., Moat, J., & Brummitt, N. A. (2009). A global assessment of distribution, diversity, endemism, and taxonomic effort in the rubiaceae1. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, *96*(1), 68–78.

Jansen, S., Robbrecht, E., Beeckman, H., & Smets, E. (2000). Aluminium accumulation in rubiaceae: An additional character for the delimitation of the subfamily rubioideae? *IAWA Journal*, 21. https://doi.org/10.1163/22941932-90000245

Moreno, C. E. (2001). *Manual de métodos para medir la biodiversidad*. Universidad Veracruzana. Neda, Z., Horvat, S., Tohati, H. M., Derzsi, A., & Balogh, A. (2008). A spatially explicit model for tropical tree diversity patterns. *arXiv E-Prints*, arXiv:0803.3704.

Ricotta, C. (2004). A parametric diversity measure combining the relative abundances and taxonomic distinctiveness of species. *Diversity and Distributions*, 10(2), 143–146. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1366-9516.2004.00069.x

Torres-Leite, F., Cavatte, P. C., Garbin, M. L., Hollunder, R. K., Ferreira-Santos, K., Capetine, T. B., ... Carrijo, T. T. (2019). Surviving in the shadows: Light responses of co-occurring rubiaceae species within a tropical forest understory. *Flora*, *261*, 151487. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.151487

Volkov, I., Banavar, J. R., Hubbell, S. P., & Maritan, A. (2003). Neutral theory and relative species abundance in ecology. *Nature*, 424(6952), 1035–1037. https://doi.org/10.1038/nature01883