

# Título

## Subtítulo

## Subtítulo

**Darihana Linares Laureano**     *Estudiante de Licenciatura en Geografía mención recursos naturales y ecoturismo, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)*

---

Resumen del manuscrito

*Keywords:* palabra clave 1, palabra clave 2

---

### 1 Introducción

Desde mediados del siglo XVII es posible visualizar el interés del hombre a estudiar la flora, la fauna y el medio en el que están en conjunto con las interacciones que se producen entre ellos, pero no es hasta mediados del siglo XIX cuando se introduce el término Ecología y su definición, que se empieza a englobar en este tipo de estudios en una categoría (De la Llata Loyola, 2003). A partir de este punto se reconocieron distintos campos de estudios y se implementaron nuevos métodos de análisis, entre los cuales destacan la ecología numérica y métodos como el análisis multivariático. Según P. Legendre & Legendre (2012), la ecología numérica no es más que una de las disciplinas de la ecología cuantitativa, la cual a la vez es una de las divisiones de la ecología matemática.

La ecología numérica se concentra en el estudio y análisis de conjuntos de datos ecológicos, a fin de poder detallar y comprender la configuración de los conjuntos de datos, combinando diversas perspectivas numéricas y disciplinas, procedentes de la Geografía, las matemáticas física, taxonomía numérica, parámetros estadísticos y otros más (P. Legendre & Legendre, 2012). El análisis de conjuntos de datos ecológicos, especialmente de la flora, resulta importante tanto para la ciencia, como para la economía o el sector de salud, por eso se han establecido distintas parcelas permanentes de medición y monitoreo forestal donde se colectan datos sobre la diversidad forestal, su estructura, el crecimiento y su productividad (Pineda, 2014). En el estudio de las plantas a través de la Ecología Numérica se usan diversas técnicas que permiten obtener información sobre el rango de asociación, agrupamiento, ordenamiento, diversidad, autocorrelación, etcétera, diferentes herramientas para usar las técnicas (ver tabla ??).

La medición de la asociación es un coeficiente que sirve para medir y asociar los datos de variables cualitativos y cuantitativos. La medición de estas variables se puede hacer por dos modos el Q y el R, el primero consiste en hacer una comparación de un dúo de objetos y el segundo consiste en realizar una descripción de un par de objetos y luego compararlos. Para el modo Q se miden la asociación según la similitud o disimilitud de un par de objetos. Mientras que para el modo R se mide el grado de dependencia existente entre las variables, entre los cuales se puede mencionar la covarianza o el coeficiente de correlación (Borcard, Gillet, Legendre, & others, 2011).

En cambio, el análisis de agrupamiento o cluster análisis es una técnica que consiste en separar un conjunto de datos y luego estructurarlos, sin dejar uno fuera de lugar, como subconjuntos con distintas categorías o jerarquías de acuerdo a sus características. La finalidad de hacer un agrupamiento es identificar los pequeños grupos dispersos en un espacio discreto pero constante,

este agrupamiento divide en conjunto de objetos a estudiar, por lo que es necesario e importante que cada objeto agrupado en otros subgrupos no se encuentre en otros (Borcard et al., 2011).

En el caso del análisis de ordenamiento, son técnicas que consisten en simplificar la magnitud de los datos. Todas estas técnicas muestran las predisposiciones esenciales de variabilidad de cada dato que se encuentran en un campo de dimensiones simplificadas, organizando los ejes con rangos decreciente de varianza explicada en cada uno de los ejes sucesivo, de forma convencional. Estos tipos de análisis pueden ser tanto no restringido o simple, como restringido o canónico. En donde para el primero, las tendencias o predisposiciones del grupo que interesa no está restringida por otro grupo. Entre sus técnicas principales de análisis están los de componentes principales (PCA) basado en un vector propio y se utiliza en datos cuantitativos sin tratamiento preservando la distancia euclídea, los de correspondencia (CA) que se usa en datos frecuentes con dimensiones uniformes y positivos, y los de coordenadas principales (PCoA) que se concentra en organizar las matrices de disimilaridad, usualmente, con el modo Q en vez de tablas de sitio por variables (Borcard et al., 2011).

Mientras que, para el segundo análisis de ordenamiento, restringido o canónico, a diferencia de la simple, es una técnica que relaciona dos o más conjunto de datos en el proceso de organización u ordenación. Algunas de sus técnicas principales son análisis de redundancia (RDA) que consiste en la combinación de la regresión y PCA que funciona como una extensión de diversos análisis que muestran la respuesta multivariante de datos, y el análisis de correspondencia canónica (CCA) que funciona como un aproximado de una regresión Gaussiana multivariante, además, este se caracteriza por organizar las especies en todos los ejes canónicos acorde a su configuración ecológica óptima (Borcard et al., 2011).

En cuanto a la diversidad, según Borcard et al. (2011) y Magurran (1988), esto alude a la variedad y cantidad de especies en un espacio determinado, esta variedad también se produce a nivel de comunidad. La diversidad puede ir desde la diversidad local, hasta heterogeneidad espacial de esta diversidad. La diversidad de especies considerada como un número único puede ser medida por la riqueza o la rarefacción de especies usando la notación  $q$  o por la presencia o ausencia de los datos de esta. Según Whittaker (1972), el entendimiento de la diversidad y los cambios que conllevan, asociados a la configuración del relieve los componentes alfa, beta y gamma serían de mucha utilidad. Donde la primera se refiere a la riqueza de las especies existentes en una comunidad determinada, considerada homogénea. La segunda, se trata de el rango de cambios que se producen en la estructura de especies que están en diferentes comunidades en un espacio. Y la última, se refiere a la riqueza de especies de forma conjunta que hay en una comunidad y que integra un espacio determinado.

La autocorrelación, según Borcard et al. (2011), forma parte de los análisis espaciales aplicados a datos ecológicos, que se produce por distintos procesos y que mide puntos cercanos para afirmar si estos poseen valores similares o distintos, por lo que la correlación puede ser una correlación positiva o negativa.

La Myrtaceae son una familia de plantas de árboles y arbustos bastante numerosas compuestas caracterizadas por ser leñosas. Esta familia de plantas pertenece al orden de los Myrtales, teniendo a nivel mundial 129 géneros y aproximadamente 5330 especies (Perez & R, s.f.). De sus características físicas se destacan sus hojas simples y opuestas, tienden a ser perennes por lo que resulta poco común ver individuos caducifolios, sus flores son hermafroditas y comúnmente son de color blanco con simetría radial, según la especie de esta familia los frutos tienen forma de bayas o cápsulas secas. De esta familia el género más conocido es el Eucalypto *Eucalyptus* por sus propiedades medicinales y su madera dura. Esta familia está distribuida en todos los continentes, pero predominan en América, África y Oceanía, en climas templados, tropicales y subtropicales. Muchos consideran que la importancia de esta familia está en lo económico, como la producción

de frutas para venta de zumos y mermeladas, producción de madera, producción de papel, de carbón, además de ser usadas en la industria farmacéutica, se usa en la cosmetología y en la producción de especias (Almeida, 2019; Britannica, 2016; Lorenzo-Cáceres, s.f.).

El estudio de la biodiversidad de la flora en especial de una especie vegetal es importante, debido a que permite conocer sus características propias, ecosistémicas, su distribución, su capacidad productiva, su potencial de uso y aportes a los humanos como a su ecosistema. Por todo lo anterior, es importante determinar el objetivo de este estudio es: a) identificar si los grupos de mi familia, Myrtaceae, se organizan de forma discontinua y acorde a la composición de las especies; b) indagar si existe algún tipo de patrón que sea o no sea consistente con alguna variable ambiental o atributo; c) determinar cuantas especies indicadoras hay o si hay alguna con preferencia por ciertas condiciones ambientales o atributos; d) investigar si hay tendencias de ordenación que se distingan

## **2 Área de estudio**

BCI (Isla de Barrio Colorado) es una isla que pertenece a Panamá, con una parcela permanente de medición y monitoreo forestal con

### *2.1 Preguntas de investigación a incorporar.*

Técnicas de ordenación (ordination analysis, to): En un espacio bidimensional, ¿existen tendencias apreciables de ordenación de las especies de mi familia seleccionada? Si existen tendencias de ordenación, ¿se asocian éstas con variables ambientales/atributos?

Diversidad (di): Según los análisis de estimación de riqueza, ¿está suficientemente representada mi familia? Consideremos como buena representación un 85% ¿Existe asociación de la diversidad alpha con variables ambientales/atributos? ¿Con cuáles? ¿Existe contribución local o por alguna especie a la diversidad beta?

Ecología espacial (ee): ¿Alguna(s) especies de mi familia presenta(n) patrón aglomerado? ¿Cuál(es)? ¿Se asocia con alguna variable? ¿Predicen bien la ocurrencia de dicha(s) especie(s) los modelos de distribución de especies (SDM)?

## **3 Metodología**

...

## **4 Resultados**

Ver tabla ?? y figura ??

## **5 Discusión**

## **6 Agradecimientos**

## **7 Información de soporte**

...

## 8 *Script* reproducible

...

### Referencias

- Almeida, S. (2019). *Myrtaceae, familia*. Retrieved from <https://knoow.net/es/ciencias-tierra-vida/biologia-es/myrtaceae-familia/>
- Borcard, D., Gillet, F., Legendre, P., & others. (2011). *Numerical ecology with r* (Vol. 2). Springer.
- Britannica, E. (2016). *Myrtaceae*. Retrieved from <https://www.britannica.com/plant/Myrtaceae>
- De la Llata Loyola, M. D. (2003). *Ecología y medio ambiente*. Editorial Progreso.
- Legendre, P., & Legendre, L. (2012). *Numerical ecology*. Elsevier.
- Lorenzo-Cáceres, J. M. S. de. (s.f.). *Familia myrtaceae*. Retrieved from <https://www.arbolesornamentales.es/Myrtaceae.htm>
- Magurran, A. E. (1988). *Ecological diversity and its measurement*. Princeton university press.
- Perez, R., & R, C. (s.f.). *Tree atlas of panama*. Retrieved from <http://ctfs.si.edu/PanamaAtlas/famdescr.php?Family=Myrtaceae>
- Pineda, P. (2014). *Análisis del sistema de parcelas permanentes de medición en los bosques de guatemala. informe final*. Guatemala: Proyecto" Sistemas de información sobre la productividad de los ....
- Whittaker, R. H. (1972). Evolution and measurement of species diversity. *Taxon*, 21(2-3), 213–251.