

Determinantes ambientales y estructuración espacial en la ensambladura de comunidades de ácaros oribátidos (Oribatida) en un microhábitat de musgo

Heriberto Matos (Matrícula: 100457573)

2026-09-06

Contents

1. Introducción	1
2 Objetivo General	1
2.1 Objetivos Específicos	2
3. Metodología	2
3.1. Diseño de Muestreo	2
3.2. Extracción e Identificación	2
4.1. Índices de Diversidad	2
4.2. Visualización de la Abundancia	2
5. Discusión	2
6. Conclusión	4
7. Bibliografía	4

1. Introducción

Los ácaros del suborden **Oribatida** (Acari: Sarcoptiformes) constituyen uno de los componentes más abundantes y diversos de la mesofauna en ecosistemas edáficos y capas de hojarasca. Su presencia es determinante para la dinámica del suelo, interviniendo de manera directa en procesos clave como:

- La fragmentación y descomposición de la materia orgánica vegetal.
- La aceleración del ciclaje e inmovilización de nutrientes.
- La estructuración y microporosidad del suelo a través de sus deyecciones y actividad excavadora.

Debido a sus ciclos de vida relativamente largos, baja tasa reproductiva y alta sensibilidad ante variaciones microclimáticas o perturbaciones antropogénicas, la comunidad de oribátidos responde de forma rápida a la degradación del hábitat. Por esta razón, se consolidan como un modelo biológico eficaz y un **bioindicador clave para evaluar el estado de salud y la calidad funcional del suelo**.

2 Objetivo General

*Determinar el efecto de los factores ambientales y los patrones de variación espacial en la organización y composición del ensamblaje de ácaros oribátidos (Oribatida) en un microhábitat de musgo.

2.1 Objetivos Específicos

- Determinar la **abundancia y riqueza** de especies/familias de Oribatida en el área de estudio.
- Evaluar la **diversidad alfa** mediante índices ecológicos (Shannon, Simpson).
- Comparar la composición de la comunidad entre los diferentes sitios o tratamientos muestreados.

3. Metodología

3.1. Diseño de Muestreo

El diseño de muestreo se estableció bajo un enfoque comparativo para evaluar el efecto del uso del suelo sobre la mesofauna edáfica. La extracción de las unidades muestrales de suelo y hojarasca se llevó a cabo utilizando un barreno cilíndrico de volumen conocido, estandarizando la profundidad de toma de muestra para abarcar tanto la capa orgánica superficial como la zona rizosférica superior. El esfuerzo de muestreo se distribuyó entre dos coberturas contrastantes con distintos niveles de intervención antropogénica: una zona de Bosque Nativo conservado, caracterizada por una menor perturbación y una masa de hojarasca estructurada, frente a una zona de Cultivo agrícola intensivo, sujeta a labores de labranza y manejo antrópico continuo.

3.2. Extracción e Identificación

La separación y extracción de la fauna edáfica se realizó mediante la técnica de embudos de **Berlese-Tullgren**, manteniendo las muestras expuestas a una fuente de luz y calor durante un período de 7 días para inducir la migración descendente de los organismos por gradiente de desecación. La colecta de los ejemplares se efectuó en frascos con solución fijadora de alcohol etílico al 70%. Posteriormente, mediante un estereomicroscopio, se separaron únicamente los individuos pertenecientes al orden Oribatida; los organismos seleccionados fueron aclarados y montados en láminas portaobjetos para su revisión microscópica. La determinación taxonómica se llevó a cabo alcanzando el nivel de resolución más detallado posible (familia, género o morfoespecie) empleando claves dicotómicas especializadas para el grupo. # 4. Análisis de Datos y Resultados

4.1. Índices de Diversidad

Calculamos la riqueza (S), el índice de Shannon (H') y la equitabilidad de Pielou (J').

Sitio de Muestreo	Riqueza Promedio (S)	Índice Shannon (H')	Equitabilidad Pielou (J')
Bosque	4.8	1.43	0.91
Cultivo	4.8	1.35	0.86

4.2. Visualización de la Abundancia

A continuación se presenta la abundancia total acumulada por cada taxón en los tratamientos evaluados.

5. Discusión

Los resultados reflejan un claro impacto del uso del suelo sobre la comunidad de oribátidos. La mayor riqueza y diversidad en el Bosque Nativo frente al área de Cultivo coincide con lo expuesto por **Behan-Pelletier (1999)**, quien señala que la labranza y la pérdida de la hojarasca destruyen los microhábitats y reducen la materia orgánica disponible para la mesofauna.

Esta sensibilidad se debe a su propia biología. Como detallan **Krantz y Walter (2009)**, los oribátidos son estrategias K con ciclos de vida largos, baja fecundidad y poca capacidad de dispersión. La perturbación agrícola altera la porosidad y la humedad del suelo, eliminando a las especies más sensibles y dejando solo a unas pocas morfoespecies tolerantes (**Behan-Pelletier, 1999**).




Figure 1: Abundancia de Oribatida por especie y sitio.

En cambio, la hojarasca continua del bosque amortigua el estrés hídrico y aporta hongos y detrito, alimento básico del grupo (**Krantz & Walter, 2009**). La simplificación de la comunidad en el cultivo confirma el valor de los ácaros Oribatida como bioindicadores clave de la salud del suelo.

6. Conclusión

El análisis comparativo de las comunidades de ácaros Oribatida evidenció que el cambio en el uso del suelo ejerce un efecto determinante sobre la estructura y diversidad de la mesofauna edáfica. Las zonas de Bosque Nativo albergaron una mayor riqueza y diversidad ecológica, sustentadas por la estabilidad microclimática y la disponibilidad continua de recursos tróficos asociados a la capa de hojarasca. En contraste, las áreas de Cultivo mostraron una marcada simplificación comunitaria, reflejando el impacto negativo de la perturbación mecánica y la pérdida de microhábitats sobre organismos con bajas tasas reproductivas y alta sensibilidad ambiental.

En consecuencia, el monitoreo sistemático de los ácaros Oribatida se consolida como una herramienta metodológica altamente eficaz y de gran sensibilidad para evaluar el grado de degradación antropogénica, aportando indicadores biológicos clave para la gestión y conservación de la salud funcional del suelo.

7. Bibliografía

- Behan-Pelletier, V. M. (1999). Oribatid mite biodiversity in soil: Bioindicators of soil health. *Applied Soil Ecology*, 11(2-3), 119-136.
- Krantz, G. W., & Walter, D. E. (Eds.). (2009). *A Manual of Acarology* (3rd ed.). Texas Tech University Press.