

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ТАДЖИКСКОЙ ССР
СЕКЦИЯ БИОЛОГИИ**

ДУШАНБЕ—1985

УДК 595.733

С.Н.Борисов

СТРЕКОЗЫ /INSECTA, ODONATA / ПАМИРА
/Институт зоологии и паразитологии АН Таджикской ССР/

Имеющиеся сведения о стрекозах Памира довольно скудные. И.Я.Янковская /1965/ указывает на нахождение *Orthetrum brunneum* Fons. на теплом источнике возле к.Шаймак /3900/. *Pantala flavescens* Fabr. найдена К.Б.Городковым /1961/ около устья р. Зулумарт /3730/ и в долине Баландкика /4300/.

Основой данного сообщения послужили наши исследования на Памире в июле-августе 1980 г., а также обработка небольшой коллекции стрекоз, собранных летом 1983 г. сотрудником ИЗМЭЖ АН СССР О.Н.Голуб. Говоря о фауне стрекоз Памира, мы включаем сюда и виды, обнаруженные в переходной между Памиром и Бадахшаном зоне, с высот не менее 3300 м над ур.м. Ниже приводится аннотированный список 7 видов стрекоз, обнаруженных на Памире.

1. *Orthetrum brunneum* Fons.

Стрекозы этого вида найдены только на термальных источниках: Джаушангоз /3360/, Джиланды /3550/ и источнике на юго-восточном берегу оз.Яшилкуль /3800/. На разливах источника Джаушангоз плотность экзувиев *O.brunneum* на 10 кв.м береговой полосы достигала 70 шт., а на заболоченных местах, образованных источником Джиланды, до 170 шт. На термальном источнике возле оз.Яшилкуль численность стрекоз не высокая, так как теплые ручьи не образуют разливов на сильно покатом склоне. Необходимо отметить, что обитание преимагинальных фаз *O.brunneum* в термальных источниках на более низких высотах, явление вполне обычное в горных районах Таджикистана.

2. *Sympetrum tibiale* Ris

Стрекозы этого вида в небольшом количестве найдены на разливах термальных источников Джаушангоз /3360/ и Джиланды /3550/. Интересно нахождение этого вида на Памире, в то время как на остальной территории Таджикистана и в Киргизии он не отмечен, а на юге Казахстана является обычным.

3. *Sympetrum haritjanovi* Borisov

Ранее стрекозы этого вида были известны только из горных районов центрального Таджикистана /Борисов, 1983/. В сборах О.Н.Голуб на термальном источнике Джиланды /3550/ от 3

сентября 1983 г. оказался один самец *S. haritonovi*. Это самая восточная и наиболее высокогорная находка стрекоз этого вида.

4. *Sympetrum fonscolombei* Selys

Самец и самка этого вида стрекоз собраны О.Н. Голуб 28 июля на р. Маркансу /3800/. Это самая высокогорная, из известных, находка *S. fonscolombei*, но при отсутствии подходящих водоемов для развития преимагинальных фаз, по всей вероятности, связана с залетом этих стрекоз.

5. *Pantala flavescens* Fabr.

Стрекозы этого вида собраны нами во многих местах Памира: к. Джаушангоз /3360/, оз. Турумтайкуль /4260/, оз. Каракуль /3900/, р. Маркансу /3700/. Отдельные пролетающие особи наблюдались вдоль Памирского тракта от перевала Акбайтал /4650/ до Сары-Таш в Алайской долине. Личинки же этих стрекоз нигде не обнаружены. Склонность *P. flavescens* к значительным перелетам позволяет предположить, что на Памире он является мигрирующим. Отмечены направленные перелеты этих стрекоз. Наиболее сильный пролет наблюдался 3 августа 1980 г. возле к. Сары-Таш. Стрекозы летели с севера на юг вдоль Памирского тракта на небольшой высоте /1-2 м/ против несильного ветра. Через учетную полосу шириной 3 м за 15 минут пролетало до 90 особей.

6. *Ischnura rufilio* Charp.

Широко распространенный в горных районах Средней Азии вид. На Памире *I. rufilio* найден только на разливах термального источника Джаушангоз /3360/. Это самая высокогорная из известных находок стрекоз этого вида. Численность стрекоз 19 июля 1980 г. была довольно высокой.

7. *Enallagma cyathigerum* Charp.

Единственная самка поймана 19 июля 1980 г. на разливах термального источника Джаушангоз /3360/. На такой высоте над ур. м. *E. cyathigerum* ранее нигде не отмечалась.

Таким образом, в суровых условиях высокогорья фауна стрекоз Памира резко обеднена. Преимагинальные фазы этих насекомых способны развиваться здесь только в горячих источниках с благоприятным термическим режимом и химизмом воды.