

МАТЕРИАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ТАДЖИКСКОЙ ССР

Секция биологии и медицины

Издательство "Дониш"

Душанбе - 1987

С.Н.БОРИСОВ

К ФАУНЕ СТРЕКОЗ (INSECTA, ODONATA) САРЫ-ЧЕЛЕКСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

(Институт зоологии и паразитологии АН Тадж.ССР)

Сары-Челекский заповедник расположен на южных склонах Ферганского хребта (Западный Тянь-Шань). До настоящего времени какие-либо сведения об одонатофауне заповедника отсутствовали. Основой данного сообщения послужил материал, собранный автором 27-31 июля 1985 г. в окрестностях озера Сары-Челек (2000 м над ур. моря) и вытекающей из него реки Ходжа-Ата - у истока (1800-2000 м) и в среднем её течении (1300-1500 м). Обнаружено 15 видов стрекоз, обзор которых приводится ниже.

1. *Ophiogomphus reductus* Calv.

Восточносредиземноморский вид. В заповеднике многочислен. Личинки специализированы к обитанию в проточных водоемах. Экзувии в массе найдены по берегам реки (1300-2000 м).

2. *Cordulegaster coronatus* Mort.

Ареал вида охватывает горы Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Личинки реофилы. Имаго единично отмечены возле реки (1900 м) и у ручья (1350 м).

3. *Aeschna juncea mongolica* Bart.

Циркумбореальный вид, обитающий в Средней Азии только в горах. В заповеднике обычен. Личинки найдены как в озере, так и в реке у её выхода из озера.

4. *Orthetrum brunneum* Fonsc.

Средиземноморский вид. В небольшом количестве отмечен на заболоченностях вдоль реки (1300-1500 м).

5. *Libellula quadrimaculata quadrimaculata* L.

Циркумбореальный вид, находящийся в Средней Азии у южных границ своего распространения. Старые особи в небольшом количестве отмечены в редколесье на склонах возле озера.

6. *Sympetrum flaveolum* L.

Евразийский вид. В заповеднике обычен на абсолютных высотах 1300-2000 м.

7. *Sympetrum vulgatum flavum* Bart.

Евразийский вид. Отдельные экземпляры отмечены в редколесье на склонах возле озера.

8. *Sympetrum sanguineum* Müll.

Евразийский вид. Малочислен у озера.

9. *Coenagrion pulchellum asiaticum* Belys.

Евразийский вид. Обычен на озере среди зарослей тростника. Отмечен интенсивный выплод.

10. *Ischnura pumilio* Charp.

Евразийский вид. Обычен на заболоченностях вдоль реки (1300-1500 м), у озера не найден.

11. *Ischnura elegans* Lind.

Евразийский вид. Самый многочисленный из равнокрылых стрекоз на озере. Личинки отмечены также в реке (1900-2000 м). Примерно половина самок в популяции - вариации *aureantiaca*. Подобное для Средней Азии отмечается впервые.

12. *Enallagma cyathigerum* Charp.

Циркумбореальный вид. В заповеднике обычен на озере. Отмечен интенсивный выход имаго из личинок.

13. *Lestes barbara* Fabr.

Средиземноморский вид. Единственный самец пойман у озера.

14. *Calopteryx maracandica* Bart.

Восточносредиземноморский вид. Обычен в среднем течении реки Ходжа-Ата (1300-1500 м), выше не найден. Личинки строгие реофилы.

15. *Calopteryx splendens* Harr.

Евразиатский вид. В заповеднике редок в среднем течении реки, многочислен в месте её выхода из озера (1800-2000 м).

Одна из интересных особенностей одонатофауны заповедника — обитание реофильных видов стрекоз в бурной горной реке на абсолютных высотах до 2000 м. При этом они достигают высокой численности. Здесь же отмечены личинки эвритопных видов, которые обычно в горах развиваются только в непроточных водоемах. Такое уникальное для гор Средней Азии явление возможно благодаря своеобразному термическому режиму реки Ходжа-Ата, вытекающей из озера Сары-Челек, где вода значительно прогревается.