

УДК 595.733

С. Н. БОРИСОВ

**НОВЫЙ ВИД СТРЕКОЗЫ РОДА SYMPETRUM NEWMAN
(ODONATA, LIBELLULIDAE) ИЗ ТАДЖИКИСТАНА**

В 1981 — 1982 гг. в горных районах Центрального Таджикистана собраны стрекозы неизвестного вида. Ниже приводится его описание.

Sympetrum haritonovi Borisov sp. nov. (рис.)

Самец. Нижняя и верхняя губы, лицо светлые. Первый членик антенны в основании светлый, постепенно темнеющий к концу. Задняя часть головы светлая.

На первом и втором боковых швах груди очень тонкие черные полосы, местами прерывающиеся на отдельные штрихи. Ноги светлые с узкими темными полосками на наружной стороне голеней. Крылья прозрачные, иногда со слабыми следами желтого налета в основании. Птеростигма желтая, однотонная у *juv* и красно-бурая с желтыми краями у *adlt*.

I тергит брюшка светлый, со слабой темной поперечной полоской у заднего края, II тергит светлый, с темной полоской у переднего края, часто в виде треугольника с размытыми краями. III — VII тергиты светлые. В передней части VIII тергита вдоль срединного ребра темный треугольный значок. На IX тергите такой же значок, но развит слабее, с размытыми краями. X тергит светлый. У ♂ *adlt* происходит характерное для стрекоз рода *Sympetrum* покраснение окраски. В этом случае на тергитах различаются небольшие светлые пятна различной формы. На II тергите, в его задней части, эти пятна в виде поперечных светлых полосок с каждой стороны тергита. На III тергите светлые пятнышки овальной формы, на IV — VIII тергитах светлые пятнышки округлой формы. Стерниты черные.

Внутренние ветви генитальных крючочков копулятивного органа на II сегменте брюшка в основании широкие. Ширина их у основания больше половины длины. Без учета длины темных зубчиков на концах, внутренние ветви генитальных крючочков близки по форме к равностороннему треугольнику. Заостренные их концы направлены в противоположные стороны, как у *S. vulgatum* L.

Анальные придатки желтые или красноватые. У ♂ *adlt* концы верхних могут быть темными. Верхний край верхних придатков прямой и заканчивается черным острием. На нижнем крае верхних придатков в их дистальной половине ряд черных зубчиков. Нижний анальный придаток своим концом заметно заходит за нижне-задний угол верхних (рис. 1, а).

Размеры: брюшко с анальными придатками 17 — 22, задние крылья 19 — 23 мм.

Самка. Голова и грудь как у самца. I — II тергиты, как у самца. На боках III — X тергитов, с каждой их стороны, темные продольные полосы, хорошо заметные у ♀ *juv* и незаметные у ♀ *adlt*. У ♀ *adlt*




Рис. 1. *Sympetrum haritonovi* Borisov sp. nov. а, б, в — анальные придатки самца; г, д, е — вершина брюшка самки; а, г — сбоку, б, д — сверху, в, е — снизу.

брюшко часто с сизым налетом. На верхней стороне VIII и IX тергитов вдоль срединного ребра темные полосы, более широкие на передних краях тергитов, постепенно суживающиеся к заднему краю.

Генитальная пластинка нормально выдающаяся, равна по длине примерно четверти длины IX сегмента, а по высоте его трети. Немного отклонена вперед, вершина ее выше основания (рис. 1, e). Дистальная часть округлая с ровными краями, иногда на вершине пластинки имеется неглубокая выемка с очень плавными изгибами. Края генитальной пластинки заметно закруглены вовнутрь, стенки ее выглядят поэтому массивными, овально оканчивающимися. Последнее очень характерно для вида.

Размеры: брюшко с анальными придатками 17—21, задние крылья 19—23 мм.

Материал. Голотип — самец: Таджикистан, Западные отроги хребта Петра I, в 30 км к юго-востоку от развилки дорог Гарм и Хорог, оз. Голубое, 4 VIII 1982 (Борисов). Паратипы — там же, 21 ♂♂, 18 ♀♀, 4 VIII 1982 (Борисов); южный склон Гиссарского хребта, к. Зидды, 8 ♂♂, 15 ♀♀, 1 VII 1982 (Борисов); западные отроги хребта Петра I, к. Тавильдара, 4 ♂♂, 1 ♀, 5 VIII 1982 (Борисов); заповедник «Рамит», 1 ♂, 29 IX 1981 (Борисов).

Вид назван именем одонатолога А. Ю. Харитонов. Типовой экземпляр и паратипы нового вида хранятся в коллекциях Биологического института Сибирского отделения Академии наук СССР (г. Новосибирск).

Для большинства видов рода *Sympetrum* надежным диагностическим признаком служит строение копулятивного органа на II сегменте брюшка и форма анальных придатков самцов, а у самок — строение генитальной пластинки (Бартенев, 1915). Самцы нового вида по строению копулятивного органа и форме анальных придатков наиболее схожи с самцами *S. vulgatum*, отличаясь от последних следующими деталями в строении: внутренние ветви генитальных крючков копулятивного органа у самцов *S. haritonovi* широкие в основании, больше половины их длины. Без учета темных зубчиков на концах по форме они приближаются к равнобедренному треугольнику. У самцов *S. vulgatum* внутренние ветви генитальных крючков более вытянутые. Ширина в их основании более чем в два раза меньше длины. Нижний анальный придаток у самцов *S. haritonovi* заходит своим концом за нижне-задний угол верхних придатков, а у *S. vulgatum* конец нижнего анального придатка только доходит до нижне-заднего угла верхних придатков. Кроме того, самцы нового вида отличаются мелкими размерами. Самые крупные среди них мельче самых мелких самцов *S. vulgatum*.

Самки *S. haritonovi* легко отличаются от самок *S. vulgatum* строением генитальной пластинки. У самок нового вида генитальная пластинка не отклонена вперед так сильно, как у *S. vulgatum*, по высоте она намного меньше, не заострена на вершине. Края генитальной пластинки у самок *S. haritonovi*, в отличие от *S. vulgatum*, закруглены во внутрь. Различия в размерах у самок *S. haritonovi* и *S. vulgatum* менее четкие, чем у самцов. Самые крупные самки нового вида по размерам приближаются к самым мелким самкам *S. vulgatum*.

ЛИТЕРАТУРА

Бартенев А. Н. Libellulidae. Фауна России и сопредельных стран. Насекомые ложносетчатокрылые. Вып. 1—2. Петроград, 1915—1919, 576 с.

Госкомитет Таджикской ССР
по лесному хозяйству

4 января 1983 г.