

УДК 595.733

С. Н. БОРИСОВ, А. Ю. ХАРИТОНОВ

ФАУНА СТРЕКОЗ (INSECTA, ODONATA) ТАДЖИКИСТАНА

Фауна стрекоз Таджикистана сравнительно богата и насчитывает в своем составе 59 видов (35% одонатофауны СССР), 17 из которых авторами обнаружены впервые в республике, 2 — впервые в СССР и 1 — новый для науки.

В работе А. Н. Поповой [1] по стрекозам Таджикистана, проводившей исследования в центральной части республики, в основном в окрестностях г. Душанбе, приводится 40 видов стрекоз. Сюда же вошли данные из неопубликованной рукописи А. Н. Бартенева о стрекозах Палеарктической Азии. Отдельные сведения о стрекозах Таджикистана приводятся в работах других авторов [2, 3, 4].

Систематическое исследование одонатофауны Таджикистана проводилось нами в 1977—1984 гг. Фаунистические сборы были проведены в низменных частях Северного и Юго-Западного, в горных районах Центрального Таджикистана и значительно более богато на Бадахшане и Памире. В итоге выявлено 56 видов стрекоз, в том числе найден и описан новый для науки — *Sympetrum haritonovi* Borisov [5]. Три вида из числа приводимых другими авторами нами в Таджикистане не обнаружены. Из них *Libellula depressa* L. известен по находке личинки в Куйбышевском районе [1], *Coenagrion pulchellum* Lind. отмечен для западной оконечности Гиссарского хребта [3], *Anorthogomphus kiritschenkoii* Bart. описан из Термеза [4]. Следует ожидать находок этого вида на юго-западе республики, поэтому provisionally мы включаем его в фауну Таджикистана. Упомянутая в работе А. Н. Поповой [1] «*Ischnura bidentata* Bart. (in litt)», название которой заимствовано ею, вероятно, из неопубликованной рукописи А. Н. Бартенева, нами во внимание не принимается, так как какие-либо сведения об описании, сохранности и местонахождении типовых экземпляров этого вида отсутствуют [6].

Вместе с имеющимися литературными данными на исследуемой территории в настоящее время известно 59 видов стрекоз (см. таблицу), что свидетельствует о достаточной изученности одонатофауны и ее сравнительном богатстве. Наиболее богата фауна Гиссаро-Дарваза, где найдено 44 вида. Фауна долин Северного и Юго-Западного Таджикистана насчитывает соответственно 36 и 42 вида стрекоз. Впервые для СССР и пока только на юго-западе республики отмечен *Diplacodes lefebvrei* Ram. [7]. В коллекциях Института зоологии и паразитологии АН Таджикской ССР среди сборов Е. К. Лупповой и Л. В. Соболевой из Юго-Восточной Туркмении оказались стрекозы ранее неизвестного в фауне СССР рода *Trithemis* Brauer и редкого вида *Oelychogomphus lefebvrei* Ram. Ожидая находок этих видов стрекоз в долинах рек Вахш и Кафирниган, мы включаем их в фауну этого региона. Фауна Бадахшана и особенно Памира резко обеднена — 24 и 7 видов соответственно. На Памире стрекозы найдены только на термальных источниках. Личинки же *Pantala flavescens* Fabr. нигде не обнаружены. Склонность этого вида к значительным перелетам [8, 9] позволяет предположить, что на Памире он является мигрирующим. Нами отмечены перелеты *P. flavescens* в различных местах Памира с общим направлением примерно с севера на юг. Подобное явление наблюдалось и в Гималаях [10]. Находки *Sympetrum fonscolombeii* Selys

Видовой состав и зональное распределение стрекоз в Таджикистане

Таблица

В И Д	Долины Северного Таджикистана	Долины Юго-Западно- го Таджикистана	Гиссаро-Дарваз	Бадхашан	Памир
Подотряд Anisoptera Selys, 1840					
Под Gomphus Leach, 1815					
G. flavipes lniatus Bartenev, 1929	1	1	0	0	0
Под Onychogomphus Selys, 1854					
O. flexuosus Schneider, 1845	2	2	1	0	0
O. lefebvrei Rambur, 1842	0	1	0	0	0
Под Ophiogomphus Selys, 1840					
O. reductus Calvert, 1898	1	2	1	0	0
Под Anormogomphus Selys, 1854					
A. kiritschenkoi Bartenev, 1913	0	1*	0	0	0
Под Lindenia Selys, 1840					
L. tetraphylla Vanderlinden, 1825	3	3	0	0	0
Под Cordulegaster Leach, 1815					
C. coronatus Morton, 1916	0	0	2	2	0
Под Aeschna Fabricius, 1775					
Ae. juncea Linnaeus, 1758	0	0	1	1	0
Ae. coluberculus Harris, 1782	2	2	1	0	0
Ae. affinis Vanderlinden, 1825	0	1	0	0	0
Под Anax Leach, 1815					
A. imperator Leach, 1815	2	0	3	0	0
A. parthenope parthenope Selys, 1839	3	3	2	0	0
Под Hemianax Selys, 1883					
H. ephippiger Burmeister, 1839	1	1	1	0	0
Под Anaciaeschna Selys, 1878					
A. isosceles Müller, 1767	0	1	2	0	0
Под Orthetrum Newman, 1833					
O. brunneum Fonscolombe, 1837	3	3	3	2	2
O. cancellatum Linnaeus, 1758	1	0	0	0	0
O. albistylum albistylum Selys, 1842	3	3	1	0	0
O. sabina sabina Drury, 1773	3	3	1	0	0
O. anceps Schneider, 1845	3	3	2	0	0
Под Libellula Linnaeus, 1758					
L. quadrimaculata Linnaeus, 1758	2	2	2	1	0
L. depressa Linnaeus, 1758	0	1*	0	0	0
Под Trithemis Brauer, 1863					
T. festiva Rambur, 1842	0	1	0	0	0
Под Crocothemis Brauer, 1868					
C. erythraea Brulle, 1832	3	3	2	1	0
C. servilia Drury, 1773	3	3	2	1	0
Под Diplacodes Kirby, 1889					
D. lefebvrei Rambur, 1842	0	2	0	0	0
Под Sympetrum Newman, 1833					
S. flaveolum Linnaeus, 1758	0	0	1	1	0
S. fonscolombi Selys, 1840	2	2	2	1	1
S. pedemontanum pedemontanum Allioni, 1766	2	0	1	0	0
S. depressiusculum Selys, 1841	3	1	1	1	0
S. tibiale Ris, 1897	0	0	0	1	1
S. haritonovi Borisov, 1983	0	0	3	3	3
S. vulgatum flavum Bartenev, 1915	0	0	2	1	0
S. striolatum pallidum Selys, 1887	2	1	2	2	0
S. decoloratum Selys, 1884	3	3	2	0	0
S. sanguineum armeniacum Selys, 1884	0	0	2	0	0
S. meridionale Selys, 1841	2	2	2	2	0
Под Pantala Hagen, 1860					
P. flavescens Fabricius, 1798	3	2	3	2	2
Под Selysiothemis Ris, 1897					
S. nigra Vanderlinden, 1825	2	3	0	0	0
Подотряд Zygoptera Selys, 1840					
Под Platycnemis Charpentier, 1840					
P. latipes dealbata Selys, 1863	1	2	0	0	0
Под Coenagrion Kirby, 1890					

В И Д	Долины Северного Таджикистана	Долины Юго-Западного Таджикистана	Гиссар-Дарваз	Бадахшан	Памир
<i>C. scitulum</i> Rambur, 1842	0	0	2	0	0
<i>C. pulchellum asiaticum</i> Belyshev, 1964	0	0	1*	0	0
Род <i>Erythromma</i> Charpentier, 1840					
<i>E. viridulum</i> Charpentier, 1840	3	2	0	0	0
Род <i>Ischnura</i> Charpentier, 1840					
<i>I. pumilio</i> Charpentier, 1825	2	2	3	2	2
<i>I. elegans</i> Vanderlinden, 1823	3	3	3	2	0
<i>I. fontainei</i> Morton, 1905	3	3	1	0	0
<i>I. forcipata</i> Morton, 1907	3	2	3	2	0
<i>I. evansi</i> Morton, 1919	3	3	1	0	0
Род <i>Enallagma</i> Charpentier, 1840					
<i>E. cyathigerum mongolicum</i> Benedek, 1968	0	0	2	2	1
Род <i>Lestes</i> Leach, 1815					
<i>L. macrostigma</i> Eversmann, 1836	0	1	0	0	0
<i>L. dryas</i> Kirby, 1890	0	0	1	1	0
<i>L. sponsa</i> Hahseemann, 1823	0	0	1	1	0
<i>L. barbara</i> Fabricius, 1798	0	1	2	0	0
<i>L. virens vestalis</i> Rambur, 1842	0	0	2	0	0
Род <i>Sympetma</i> Burmeister, 1839					
<i>S. paedisca paedisca</i> Brauer, 1877	3	3	1	1	0
<i>S. gobica</i> Foerster, 1900	2	3	2	0	0
<i>S. fusca</i> Vanderlinden, 1823	3	3	2	2	0
Подотряд <i>Caloptera</i> Zaleskij, 1932					
Род <i>Calopteryx</i> Leach, 1815					
<i>C. maracandica</i> Bartenev, 1913	0	1	1	1	0
<i>C. splendens</i> Harris, 1782	2	1	2	0	0
<i>C. intermedia</i> Selys, 1887	2	0	0	0	0
	36	42	44	24	7

Обозначения в таблице: 0 — вид не отмечен; 1 — редкий, 2 — обычный; 3 — массовый. Звездочками отмечены виды, приводимые по данным других авторов.

на Памире (река Маркансу), при отсутствии подходящих водоемов для развития преимагинальных фаз, также связаны с залетом этих насекомых.

Таксономия и номенклатура стрекоз даны согласно работе Р. С. Павлюка и А. Ю. Харитоновой [11] с некоторыми дополнениями и изменениями. Так, *Ophiogomphus reductus* Calv. и *Calopteryx intermedia* Selys мы считаем самостоятельными видами. Вместо названия *Sympetma bianchi* Bianchi мы используем *Sympetma paedisca* Brauer.

ЛИТЕРАТУРА

1. Погода А. Н. — Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1951, т. 9, с. 861—894.
2. Брауер Ф. — Изв. общ. люб. естеств., С-Пг, М., 1877, вып. 14, т. 2, ч. 5, с. 2—17.
3. Бельшев Б. Ф. — Fragmenta Faunistica. Warszawa, 1958, т. 8, N 5, с. 97—109.
4. Бартнев А. Н. — Русск. Энтомол. Обзор., 1913, т. 13, № 1, с. 176—187.
5. Борисов С. Н. — Изв. АН ТаджССР, Отд. биол. наук, 1983, № 2 (91), с. 68—70.

6. Харитонов А. Ю. — Тр. Вс. энтомол. общ., 1979, т. 61, с. 5—7.
7. Харитонов А. Ю., Борисов С. Н. — Энтомол. обозр., 1981, т. 60, № 3, с. 604—606.
8. Городков К. Б. — Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 4, с. 610—611.
9. Reichholf J. — Odonatologica, 1973, v. 2, N 2, p. 121—124.
10. Wojtusiak J. — Odonatologica, 1974, v. 3, N 2, p. 137—142.
11. Павлюк Р. С., Харитонов А. Ю. — В кн.: Полезные и вредные насекомые Сибири. Новосибирск, 1982, с. 12—42.

Институт зоологии и паразитологии
им. Е. Н. Павловского
АН Таджикской ССР

29 апреля 1985 г.

Биологический институт
Сибирского отделения
АН СССР

С. Н. БОРИСОВ, А. Ю. ХАРИТОНОВ

ФАУНАИ СУЗАНАКҲОН ТОҶИКИСТОН

Дар Тоҷикистон 59 намуд сӯзанак ёфт шудааст. ки 35%-и ҳамаи намудҳои аз СССР маълумбудаи ин ҳашаротхоро ташкил медиҳад. Аз он ҷумла 1 намуд барои илм, 17-тояш барои Тоҷикистон ва 2 намуд сӯзанак барои СССР аввалин маротиба кашф карда шудаанд.