

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ТОМ LX

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК



«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1981

С р а в н е н и е. *H. guranica* sp. n. наиболее близок к видам группы *flavescens*, распространенным в восточной и центральной части Северной Америки. От видов этой группы (*H. cruentata* Walsh, *H. dolosa* Traver, *H. flavescens* Walsh, *H. marginalis* Banks, *H. townesi* Traver), помимо особенностей строения гениталий, легко отличается окраской брюшка и хвостовых нитей. От дальневосточных *H. chinensis* Ulmer и *H. perflava* Brodsky также хорошо отличается окраской и строением гениталий самца.

Московский
государственный университет

А. Ю. Харитонов и С. Н. Борисов

DIPLACODES KIRBY — НОВЫЙ ДЛЯ ФАУНЫ СССР
РОД СТРЕКОЗ (ODONATA, LIBELLULIDAE)

[A. YU. KHARITONOV A. S. N. BORISOV. DIPLACODES
KIRBY — A NEW FOR THE USSR GENUS OF THE DRAGONFLIES
(ODONATA, LIBELLULIDAE)]

Род *Diplacodes* включает 9 видов, распространенных главным образом в Ориентальной, Эфиопской и Австралийской фаунистических областях. Один из видов рода — *D. lefebvrei* Rambur, будучи в основном эфиопско-мадагаскарским, проникает на севере в Средиземноморскую подобласть Субголарктической области, где известен в южной Испании, Турции, Сирии, Ираке и Иране. В сборах стрекоз, проведенных С. Н. Борисовым 2 IX 1978 на оз. Яккодинское в заповеднике «Тигровая Балка» на юго-западе Таджикской ССР, оказалось 2♂ и 6♀ этого вида. Это первая для СССР и наиболее удаленная на северо-восток находка вида.

Приводим краткий диагноз рода и характеристику вида *D. lefebvrei* по литературным (Бартенев, 1915) и нашим материалам.

Род *DIPLACODES* Kirby, 1889

Голова небольшая. Лобный пузырек спереди вертикальный, а с боков спускается отлого. Затылочный треугольник равен длине глазного шва или несколько короче его. Задняя лопасть переднегруди большая, приподнятая, но не вертикальная, посредине с продольной выемкой. Верхние анальные придатки ♂ прямые, с очень тупым невыдающимся нижним углом. Генитальная пластинка ♀ отстоящая или прилегающая, не длиннее половины 9-го сегмента. Крылья короткие, треугольник передних крыльев расположен немного дистальнее (приблизительно на ширину 1-й ячейки), чем на задних. Секторы дужки начинаются длинным общим стебельком. Предузелковых жилок 7—9, последняя из них неполная. В RS—Rspl 1 ряд ячеек. Дискоидальное поле передних крыльев начинается двумя рядами ячеек, число рядов ячеек начинает увеличиваться ближе к уровню узелка, нежели к уровню треугольника. Sc₁ задних крыльев отходит на некотором расстоянии от заднего угла треугольника.

Diplacodes lefebvrei Rambur, 1842 (рис. 1—7).

У ♂ adlt. лоб и лицо черные, с фиолетовым металлическим блеском, а у ♂ juv. и у ♀ — желтые. Грудь с черной полосой вдоль срединного шва, с полной черной плечевой полосой, с двойной, но неполной полосой в области 1-го бокового шва и с узкой полоской вдоль 2-го шва. Брюшко с черными срединной и боковыми полосами. Ширина и яркость всех полос груди и брюшка сильно варьирует у ♀ нашей серии, а у ♂ adlt. окраска всего тела становится однотонно черной. Ноги ♀ большей частью светлые, с черными боковыми полосами, у ♂ adlt. полностью черные.

Передняя лопасть генитального аппарата ♂ невыдающаяся, без отростков, дугообразная. Наружная ветвь генитальных крючочков очень широкая, закругленная, но не суженная на конце. Внутренняя ветвь короче наружной, очень тонкая, изогнутая, суживающаяся к вершине. Верхние анальные придатки ♂ тонкие, с острыми вер-

пинами, слабо изогнутые, почти цилиндрические; нижний анальный придаток достигает середины задней стороны верхних придатков (рис. 2). Генитальная пластинка ♀ небольшая, не больше $\frac{1}{4}$ длины 9-го сегмента, слабо отстоящая, с выемкой на вершине (рис. 7).




Рис. 1—7. *Diplacodes lefebvrei* Rambur.

1 — крылья, 2—4 — анальные придатки самца, 5—7 — вершина брюшка самки.
2 и 5 — сбоку, 3 и 6 — сверху, 4 и 7 — снизу.

Треугольник на передних крыльях свободный, t_1 у одной ♀ нашей серии с поперечной жилкой, у остальных свободный. Предузелковых жилок 6.5—7.5, иногда с нарушением симметрии на левом и правом крыльях. В основании задних крыльев маленькое пятно, бурое у ♂ adlt. и желтое у ♀ и ♂ juv. Вершины крыльев ♂ иногда с буроватым затемнением (рис. 1).

Размеры экземпляров изученной серии очень изменчивы. ♂: брюшко — 17.5 и 20 мм; заднее крыло — 20 и 22 мм. ♀: брюшко — 14.5—17.5 мм; заднее крыло — 17.5—19.5 мм.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

D. lefebvrei близок к ориентально-австралийскому *D. nebulosa* Fabricius, известному из северо-западной Индии, т. е. с территории, расположенной относительно близко от границ СССР. Разделяя эти виды в определительной таблице, Бартенев (1915) в качестве основного признака указывает различия в размерах: брюшко — 17—25 мм и заднее крыло — 19—29 мм для *D. lefebvrei* и брюшко — до 17 мм и заднее крыло — до 20 мм для *D. nebulosa*. Однако экземпляры нашей серии мельче средних размеров, приведенных А. Н. Бартевым, что сближает их с *D. nebulosa*. Очевидно, при различении этих видов размерам нельзя придавать важного диагностического значения. Необходимо сравнивать строение генитального аппарата. В отличие от *D. lefebvrei* наружная ветвь генитальных крючков у ♂ *D. nebulosa* суживается к вершине и всего в 2 раза шире внутренней (что, впрочем, не явствует из рисунка, приводимого Бартевым, 1915, с. 478). Самка *D. nebulosa* отличается от самки *D. lefebvrei* более длинной (около трети длины 9-го сегмента) и сильнее вырезанной на вершине генитальной пластинкой.

Среди стрекоз фауны СССР род *Diplacodes* по жилкованию крыльев ближе всего стоит к роду *Sympetrum* Newman, отличаясь от последнего главным образом структурой дискоидального поля. У *Sympetrum* d состоит из 3 рядов ячеек, и Sc_1 задних крыльев отходит от нижнего угла треугольника, тогда как у *Diplacodes* d — из 2 рядов ячеек, и Sc_1 задних крыльев отходит на некотором расстоянии от заднего угла треугольника. По окраске тела *D. lefebvrei* может быть спутан, особенно в полевых условиях, с многочисленным на юге Средней Азии видом *Selysiothemis nigra* V. D. Linden, но при ближайшем рассмотрении эти относящиеся к разным семействам виды различаются по многим признакам, из которых отметим, например, полную последнюю предузелковую жилку у *S. nigra*.

ЛИТЕРАТУРА

Бартенев А. Н. Libellulidae. Фауна России и сопредельных стран. Насекомые ложносетчатокрылые, вып. 1—2. Петроград, 1915—1919. 576 с.

Биологический институт
СО АН СССР,
Новосибирск.

SUMMARY

Diplacodes lefebvrei Rambur was found in the «Tigrovaja Balka» reserve in the southwestern Tajikistan. This is the extreme northeastern record of the genus *Diplacodes* Kirby and the first record from the USSR. A brief description of the species is given, with remarks on its considerable variability.