Table II Descriptive Polysomnographic Data

	Groups					
	CTL, n=7	**PD^{dys-}, n=8**	**PD^{dys+}, n=10**	**Stat (df1, df2)**	**p-value**	**Effect-size**
TIB, min	435.9± 50,59	488.5 ± 62,13	470.5 ± 46.17	ANOVA (2,22)	0.175	0.147
TST, min	302.9 ± 65.52	324.2 ± 47.18	296.5 ± 88.62	ANOVA (2,22)	0.707	0.031
SL, min	36.7 ± 35.81	28.6 ± 24.85	19. 8 ± 20.31	ANOVA (2,22)	0.413	0.010
SE, %	70.4 ± 17.64	66.6 ± 8.27	62.4 ± 15.12	KW (2, -)	0.499	0.028
WASO, min	94.9 ± 72.28	124.2 ± 57.22	144.6 ± 78.11	ANOVA (2,22)	0.377	0.085
REM, %	13.9 ± 7.72	19.9 ± 8.70	10.9 ± 8.61	ANOVA (2,22)	0.096	0.192
N1, %	14.9 ± 8.30	14.3 ± 11.17	16.6 ± 6.20	ANOVA (2,22)	0.838	0.016
N2, %	54.1 ± 5.66	46.2 ± 8.64	54.2 ± 13.71	KW (2, -)	0.281	0.025
N3, %	17.0 ± 13.62	19.5 ± 13.28	18.2 ± 12.23	WANOVA (2, 12)	0.855	0.014

CTL = control; KW = Kruskal–Wallis; MW = Mann–Whitney; PD^{dys-} = patients without dyskinesia; PD^{dys+} = dyskinetic patients; SE = Sleep Efficiency; SL = Sleep Latency; TIB = Time In Bed; TST = Total Sleep Time; WASO = Wake After Sleep Onset; WANOVA = Welch ANOVA.