UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

CURSO DE BIOMEDICINA

RÔMULO DO NASCIMENTO MENDONÇA

GIOVANNA D'AGUILA MENDES

FELIPE DAMASCENO GONCALVES

ANA PAULA SILVA COSTA

FERNANDA DE OLIVEIRA MORAIS

BRUNA LOUBACK NUNES

PESQUISA

TOXOPLASMA GONDII: CICLO PARASITÁRIO, TRANSMISSÃO, PREVENÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA

RIO DE JANEIRO - RJ

2026

RÔMULO DO NASCIMENTO MENDONÇA

GIOVANNA D’AGUILA MENDES

FELIPE DAMASCENO GONCALVES

ANA PAULA SILVA COSTA

FERNANDA DE OLIVEIRA MORAIS

BRUNA LOUBACK NUNES

PESQUISA

TOXOPLASMA GONDII: CICLO PARASITÁRIO, TRANSMISSÃO, PREVENÇÃO E IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA

Trabalho acadêmico apresentado à Universidade Veiga de Almeida, no curso de Biomedicina, como atividade da disciplina de Parasitologia.

Professora: Juliana Almeida da Silva Santos Cunha.

RIO DE JANEIRO - RJ

2026

1 INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, capaz de infectar seres humanos e diversos animais. Os felinos são os hospedeiros definitivos do parasito, desempenhando papel fundamental em seu ciclo biológico.




2 AGENTE ETIOLÓGICO

O agente etiológico da toxoplasmose é o protozoário intracelular obrigatório *Toxoplasma gondii*.

3 HOSPEDEIROS ENVOLVIDOS

Hospedeiro definitivo: gatos e outros felinos.

Hospedeiros intermediários: seres humanos, aves e diversos mamíferos.




4 FORMAS EVOLUTIVAS

Oocisto, taquizoíto, bradizoíto e cisto tecidual.


5 CICLO PARASITÁRIO

Os gatos eliminam oocistos nas fezes. Após a esporulação no ambiente, esses oocistos tornam-se infectantes. Humanos e outros animais podem ingerir oocistos presentes em água, solo ou alimentos contaminados. No organismo ocorre a formação de taquizoítos e posteriormente de cistos teciduais contendo bradizoítos. Os felinos se infectam ao ingerir hospedeiros intermediários contaminados, reiniciando o ciclo.



6 FORMAS DE TRANSMISSÃO

Consumo de carne crua ou mal cozida, ingestão de água contaminada, consumo de frutas e verduras mal higienizadas, contato com solo contaminado e transmissão congênita.



7 SINAIS E SINTOMAS

A maioria dos indivíduos é assintomática. Quando presentes, os sintomas incluem febre, fadiga, dores musculares e aumento dos linfonodos. Casos graves podem causar comprometimento ocular e neurológico.

8 DIAGNÓSTICO

Realizado principalmente por exames sorológicos (IgG e IgM) e técnicas moleculares, como PCR.



9 TRATAMENTO

Pode envolver o uso de pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, conforme avaliação médica.



10 PREVENÇÃO

Cozinhar adequadamente as carnes, consumir água tratada, higienizar frutas e verduras, utilizar luvas ao manusear solo e manter cuidados adequados com caixas de areia de gatos.

11 IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE PÚBLICA

A toxoplasmose possui ampla distribuição mundial e representa importante problema de saúde pública, especialmente devido aos riscos para gestantes, fetos e indivíduos imunossuprimidos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Toxoplasmose. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/toxoplasmose. Acesso em: 19 set. 2026.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). About Toxoplasmosis. Disponível em: https://www.cdc.gov/toxoplasmosis/. Acesso em: 19 set. 2026.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). DPDx - Toxoplasmosis. Disponível em: https://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/index.html. Acesso em: 19 set. 2026.