

FICHA TÉCNICA

CETUS 880 OL

Registro Nacional ICA No. PL0002122025

Titular del Registro: EASTCHEM COLOMBIA S.A.S.

GENERALIDADES

- **Producto:** CETUS 880 OL
- **Tipo de Producto:** Fungicida para Uso Agrícola
- **Formulación:** Líquido Miscible en Aceite (OL)
- **Categoría Toxicológica:** II – Moderadamente Peligroso
- **Cultivo:** Banano (*Musa × paradisiaca*)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CETUS 880 OL es un fungicida de acción sistémica con propiedades tanto protectoras como curativas.

Pertenece a la familia química de las morfolinás. Su principio activo opera bloqueando la biosíntesis de ergosterol, además de interferir en la creación de carbohidratos y proteínas celulares. Debido a su dinamismo de acción multisitio, se consolida como un componente clave en las estrategias para la prevención y manejo de resistencia frente a la Sigatoka Negra.

COMPOSICIÓN

- **Ingrediente activo:** Fenpropimorph (880 g/L)
cis-4-[(RS)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine
de formulación a 20°C
- **Ingredientes aditivos:** c.s.p. 1 L
-

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Agrónomo o Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Enfermedad	Dosis	L.M.R.	P.C.	P.R.
Banano (<i>Musa × paradisiaca</i>)	Sigatoka Negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	0.7 L/ha	2.0 mg/Kg	0 días	4 horas*

P.C. (Periodo de Carencia): Intervalo de tiempo obligatorio que debe transcurrir entre el tratamiento final y la recolección de la cosecha.

P.R. (Periodo de Reingreso): Tiempo de espera requerido para el acceso de operarios o animales a la zona o plantación tratada tras la aplicación.

L.M.R. (Límite Máximo de Residuos)

**Nota de seguridad:* Se autoriza el acceso a la plantación transcurridas dos (2) horas desde la última pulverización, únicamente bajo la aprobación del agrónomo o del supervisor técnico del cultivo. Para ello, se debe constatar que la superficie foliar se encuentre completamente seca, asegurar el uso estricto del equipo de protección individual (EPI) correspondiente y asentar la entrada en la bitácora de campo. PROHIBIDO EL ACCESO AL CULTIVO DURANTE LAS DOS (2) PRIMERAS HORAS POSTERIORES A LA APLICACIÓN.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Efectuar la aplicación cuando las variables climáticas estimulen la presión de la enfermedad o ante los síntomas iniciales de la misma. Esta intervención debe formar parte de un esquema de manejo integrado de plagas, alternando con agroquímicos de diferente mecanismo de acción o grupo molecular para mitigar el riesgo de generar resistencia en el patógeno.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

Verifique y ponga a punto el instrumental de aspersión. Se sugiere el empleo de boquillas de cono hueco calibradas para generar un diámetro de gota cercano a los 250 µm operando a una presión uniforme.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se aconseja ejecutar ensayos previos de miscibilidad antes de combinarlo con otros insumos. El producto no manifiesta efectos fitotóxicos si se emplea bajo las pautas descritas; en el caso de nuevas líneas, variedades o híbridos comerciales, se sugiere llevar a cabo pruebas de tolerancia a pequeña escala.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro avala que las propiedades físicas y químicas del insumo contenido en este empaque coinciden con las especificadas en el membrete y que demuestra idoneidad para los objetivos aquí sugeridos, siempre que se manipule y dosifique siguiendo estrictamente las instrucciones provistas”.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS (24 HORAS)

CISPROQUIM: 01 800 09 16012 (Línea Nacional)

En Bogotá: Comunicarse al Teléfono 288 6012