

Soluzioni Mantegazzario

Federico Franceschini, Dario Ascari, Dario Balboni, Umberto Pappalettera
Andrea Marino, Gianluca Tasinato, Marco Costa

7 febbraio 2015

Convenzioni

Nel seguito useremo le seguenti convenzioni:

- \sim verrà usato per indicare l'equipotenza tra cardinalità insiemistiche.
- Verranno spesso usate \geq e \leq per disuguaglianze tra cardinalità insiemistiche.
- La **NINI** (Non-empty Intersection of Nested Intervals) dice che dato un insieme numerabile di intervalli chiusi, ciascuno contenuto nel precedente, essi hanno intersezione non vuota. Vale anche per gli intervalli aperti se l'inclusione è stretta. (Nota: in generale vale per i compatti)
- Alle volte faremo uso della cosiddetta "*notazione intuitiva*" ideata dal grande teorico *D.C.B.* cioè se trovate una n è un naturale (casomai nullo) ma se trovate un $1/n$ è un naturale positivo e via dicendo...

1 Teoria degli Insiemi

1.30 $\Psi\Psi\Psi\Psi$

Riportiamo solo il polinomio bigettivo: $p(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + 1)(x + y) + x$. Questo polinomio conta i punti a coordinate intere sul piano per diagonal del tipo $x + y = k$.

1.31

$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$:

(\geq) Ad ogni numero reale nell'intervallo $(0, 1)$ si associa la successione delle sue cifre.

(\leq) Scriviamo le cifre in base due dell' i -esimo numero della successione nell' i -esima colonna di una tabella (a partire dalla cifra delle unità). Leggiamo ora queste cifre per diagonalì come le cifre dopo la virgola di un numero reale in base dieci in $[0, 1)$.

1.36

Le funzioni continue da \mathbb{R} in \mathbb{R} : basta conoscere i valori della funzione sui razionali ed estenderla per continuità. Dunque la cardinalità è $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}} \sim \mathbb{R}$.

1.39

Uso come lemma 1.44.

1.40

Uso come lemma la prima metà di 1.42.

1.41

Dimostro per prima cosa che $A \times A \sim A$: Considero l'insieme ordinato

$$\mathcal{F} := \{(f, X) \mid f : X \times X \rightarrow X, X \subseteq A, f \text{ bigettiva}, X \text{ infinito}\}$$

Osservo che è non vuoto. La relazione d'ordine \preceq definita da

$$(f, X) \preceq (g, Y) \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge g|_{X \times X} = f$$

.

Applico Zorn ed ottengo l'esistenza di un massimale (h, M) . Se $\text{card}(A \setminus M) < \text{card}(M)$ trovo una bigezione da A in M . Altrimenti trovo un elemento più grande del massimale. (Non immediato)

1.42

Per la prima metà usate Zorn. Per il punto 2 uso il lemma 1.40.

1.43

Uso come lemma 1.42 e leggo *per colonne e non per righe*.

1.44

Usate Zorn.

1.46

Devo dimostrare un po' di disuguaglianze tra cardinalità: ogni volta sostituisco dal lato che voglio dimostrare essere maggiore $X \times Y$ al posto di X (o Y) (usando 1.41 a palla).

Ad esempio: supponiamo $\text{card}(Y) \geq \text{card}(X)$; voglio trovare una funzione iniettiva Φ da $\{f : X \rightarrow Y\}$ in $\{g : X \rightarrow Y \mid g \text{ iniettiva}\}$: noto che, essendo $X \times Y \sim Y$, vale

$$\{g : X \rightarrow Y \mid g \text{ iniettiva}\} \sim \{g : X \rightarrow X \times Y \mid g \text{ iniettiva}\}$$

Definisco $\Phi(f)$ come la funzione g che manda $x \mapsto (x, f(x))$.

1.50

Supponiamo esista una funzione iniettiva da RHS in LHS: fissato un indice $i \in \mathcal{I}$, considero la controimmagine di X_i : l'insieme delle componenti lungo Y_i di tali controimmagini non può essere tutto Y_i (perchè $\text{card}(X_i) < \text{card}(Y_i)$); quindi esiste $\tilde{y}_i \in Y_i$ che non è la i -esima componente di nessun elemento della controimmagine di X_i . Dove viene mandato $\prod_{i \in \mathcal{I}} \{\tilde{y}_i\}$?

2 Numeri Reali e Disuguaglianze

2.5

Pigeonhole sull'insieme delle parti frazionarie di $a, 2a, \dots$

2.13

AM-GM. Induzione. Il passo base per $n = 2$ si verifica facilmente. Assumiamo ora che la disuguaglianza sia vera per n termini e mostriamola per $n + 1$.

$$\left(\prod_{i=0}^{n+1} a_i\right)^{1/n+1} = \left(\prod_{i=0}^n a_i\right)^{1/n+1} \cdot a_{n+1}^{1/n+1} = \left(\prod_{i=0}^n a_i^{1/n}\right)^{n/n+1} \cdot a_{n+1}^{1/n+1}$$

. Si noti ora che gli esponenti dei due fattori sommano ad 1. Applichiamo dunque Young.

$$\left(\prod_{i=0}^n a_i^{1/n}\right)^{n/n+1} \cdot a_{n+1}^{1/n+1} \leq \frac{n}{n+1} \prod_{i=0}^n a_i^{1/n} + \frac{1}{n+1} a_{n+1} \leq \left(\sum_{i=0}^n a_i + a_{n+1}\right) \cdot \frac{1}{n+1} = AM$$

dove nell'ultima disuguaglianza si è fatto uso dell'ipotesi induttiva di AM-GM su n termini

HM-GM. Anche qui si procede come prima cercando un modo furbo di

applicare Young

QM-AM Il passo base per $n = 2$ è verificato. La tesi equivale a mostrare

$$\sum_{i=0}^{n+1} a_i^2 \geq \frac{1}{n+1} \left(\left(\sum_{i=0}^n a_i \right) + a_{n+1} \right)^2 = \frac{1}{n+1} \left(\left(\sum_{i=0}^n a_i \right)^2 + a_{n+1}^2 + 2a_{n+1} \left(\sum_{i=0}^n a_i \right) \right)$$

Moltiplicando ambo i membri della disuguaglianza e spezzando alcuni addendi abbiamo

$$n \sum_{i=0}^{n+1} a_i^2 + \sum_{i=0}^n a_i^2 + na_{n+1}^2 \geq \left(\sum_{i=0}^n a_i^2 \right)^2 + 2a_n \sum_{i=0}^n a_i^2$$

Si noti ora che

$$\sum_{i=0}^n a_i^2 + na_{n+1}^2 \geq 2a_{n+1} \sum_{i=0}^n a_i$$

in quanto portando a sinistra la sommatoria otteniamo la somma di n quadrati Ma

$$n \sum_{i=0}^n a_i^2 \geq \left(\sum_{i=0}^n a_i \right)^2$$

per ipotesi induttiva. Dunque tutti gli addendi a LHS maggiorano quelli a RHS e dunque la tesi è verificata.

2.15

La disuguaglianza a sinistra è ovvia. Per mostrare la disuguaglianza a destra si riscrive come $\frac{x+n-1}{n} > x^{1/n}$ che è AM-GM sulla n -upla costituita da x e $n - 1$ volte 1.

2.22

Riscriviamo come

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i \right)^2 \leq \sum_{i=0}^n a_i^2 \Leftrightarrow 2 \sum_{i \neq j}^n a_i a_j \leq (n-1) \left(\sum_{i=0}^n a_i^2 \right)$$

che può essere riscritto portando RHS a sinistra come

$$\sum_{i=0, j \neq i}^n (a_i - a_j)^2$$

ossia come somma dei quadrati delle $n(n-1)$ differenze. Pertanto la tesi è verificata.

2.24

La tesi equivale a $(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n a_i)^p \leq \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n a_i^p$. Dato che la disuguaglianza è omogenea prendiamo come ipotesi di comodo

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n a_i\right)^p = 1 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n a_i = 1$$

Effettuiamo il seguente cambio di variabile: $a_i \rightarrow 1 + b_i$, con $\sum_{i=0}^n b_i = 0$, $b_i \geq 0$. Otteniamo

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n (1 + b_i)^p \geq 1$$

che è vera applicando ad ogni addendo di LHS la disuguaglianza di Bernoulli con le ipotesi sulla somma descritte in precedenza.

2.29

Disuguaglianza a sinistra: usare come ipotesi di comodo $abcd = 1$. Effettuare il cambio di variabili $a \rightarrow \frac{1}{a}$ e cicliche. Si conclude dopo un passaggio per per la disuguaglianza fra medie $M_{1/3} \geq M_0 = GM$.

Disuguaglianza centrale: effettuare il seguente cambio di variabile: $a \rightarrow a^6$ e cicliche. Otteniamo

$$3(a^2b^2c^2 + a^2b^2d^2 + a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2) \leq 2(a^3b^3 + a^3c^3 + a^3d^3 + b^3c^3 + b^3d^3 + c^3d^3)$$

Si noti ora che

$$3a^2b^2c^2 \leq a^3b^3 + a^3c^3 + b^3c^3$$

per AM-GM. Ripetendo il procedimento per ogni addendo a LHS e sommando le disuguaglianze otteniamo proprio la tesi.

Disuguaglianza a destra: effettuare il cambio di variabile $a \rightarrow a^2$ e cicliche. Otteniamo

$$3(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) \geq ab + ac + ad + bc + bd + cd$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 + (a-c)^2 + (a-d)^2 + (b-c)^2 + (b-d)^2 + (c-d)^2 \geq 0$$

che è vera.

2.30

Legare la lunghezza delle proiezioni a quella dei rispettivi lati in una formula che indichi l'area complessiva del triangolo. L'espressione ottenuta è prodotto scalare fra due vettori particolari. Finire con Cauchy-Schwarz.

3 Successioni

3.3

Per $|p| < 1$ è vera. Altrimenti ci sono controesempi.

3.4

Posto $\Delta_k := a_k - a_{k-1}$ l'ipotesi si riscrive come: $2\Delta_n + \Delta_{n-1} < 0$. Osservo che i due addendi non possono essere entrambi positivi. Osserviamo inoltre che preso un $\Delta_k < 0$ si ha che le somme $\Delta_k + \dots + \Delta_{k+N} < 0$ perchè posso accoppiare ogni termine positivo col precedente che deve essere negativo. Questo significa che ogni volta che la successione si abbassa sotto un certo livello (fa un salto negativo) vi rimane sotto definitivamente. Cioè che $\Delta_k < 0 \Rightarrow a_{k-1} > a_n$ con $n \geq k$. Posto $\ell := \liminf_n a_n$ (è un numero reale perchè la successione è limitata inferiormente) e fissato $\epsilon > 0$ definisco $I_\epsilon := [\ell - \epsilon, \ell + \epsilon]$. Per definizione posso mettermi nella zona in cui la successione sta definitivamente sopra $\ell - \epsilon$ e frequentemente sotto $\ell + \epsilon$, preso qui un certo a_k ci sono due casi, se $\Delta_k \geq 0$ so che $\Delta_{k+1} < 0$ dunque a_{k+1} sta in I_ϵ e tutta la successione ci sta. Se invece $\Delta_k < 0$ si ha che necessariamente $a_{k-1} \in I_{3\epsilon}$ (perchè sia a_{k-1} che a_{k-2} erano sopra $\ell - \epsilon$) dunque la successione sta definitivamente in $I_{3\epsilon}$. Per l'arbitrarietà di ϵ si conclude.

3.7

Stimare fattoriali (dopo essere passati al logaritmo) e serie con gli integrali o alla peggio usate brutalmente la formula di Stirling.
Oppure usate Stolz-Cesaro.

3.17

Mostrare che gli intervalli $I_n = [x_n, y_n]$ sono inscatolati i.e. $I_{n+1} \subseteq I_n$ e che l'ampiezza di tali intervalli tende a zero. (Si conclude per la NINI).

3.18

La successione è evidentemente positiva e strettamente crescente. Supponiamo sia finito $L := \limsup_n x_n$. Scelgo $\epsilon < 1/L$ e prendo (grazie alla definizione di \limsup) un $L - \epsilon < x_N < L$ e scrivo:

$$L > x_{N+1} = x_N + \frac{1}{x_N} > L - \epsilon + \frac{1}{L}$$

Guardando primo e ultimo membro si ha un assurdo. Per valutare l'ordine di crescita interpreto x come funzione di n variabile reale e osservo che

$\frac{dx}{dn} \sim x_{n+1} - x_n$ l'equazione ricorsiva diventa: $\frac{dx}{x} = dn$ integrando ottengo soluzioni del tipo $x_n = \sqrt{n}$. Il risultato è corretto a meno di costanti moltiplicative/additive come si può verificare per induzione.

4 Serie Numeriche

4.5

Usare la formula per $\tan(\alpha - \beta)$ e telescopizzare.

4.13

Moltiplicate per 3 ...

4.17

Usate la sommazione per parti di Abel, ovvero **1.25**. (Non è affatto inutile come sembra)

4.19

Usate nuovamente la sommazione per parti di Abel (**1.25**)

4.21

Ancora sommazione per parti (**1.25**)

4.22

Pongo $\frac{b_n}{a_n} = 1 + \epsilon_n$: serve che $\sum (-1)^n a_n$ converga e $\sum (-1)^n \epsilon_n a_n$ diverga. Trovare tali a_n e ϵ_n .

4.27

Osservare che $\frac{1}{n-1} = \sum_{j \geq 1} \frac{1}{n^j}$ e fattorizzare.

4.32

Dare la formula chiusa per $\sum_{k=1}^n \sin(k)$ scrivendola come geometrica di esponenziali complessi. Poi usare sommazione per parti di Abel (**1.25**).

5 Topologia di \mathbb{R}

5.12

Usando 5.16 si ha che $\text{card}(\text{aperti}) \leq \text{card}\left((\mathbb{R} \times \mathbb{R})^{\mathbb{N}}\right) = \text{card}(\mathbb{R})$.

5.15

Controesempio alla seconda domanda: $A = \{n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \mathbb{Z}$.

5.16

A aperto di \mathbb{R} . Definiamo $\forall a \in A \quad I_a := \bigcup \{(x, y) \mid a \in (x, y) \subseteq A\}$; gli I_a sono intervalli e partizionano A . Una famiglia di intervalli disgiunti di \mathbb{R} ha cardinalità al più numerabile; per provarlo intersecarli con \mathbb{Q} oppure osservare che per ogni lunghezza positiva fissata ℓ ve ne sono al più una quantità numerabile di lunghezza maggiore di ℓ . A questo punto si sceglie $\ell = \frac{1}{n}$ e si numerano.

5.17

Passare al complementare e usare 5.16

5.18

Usare la **NINI** per dire che esistono punti che non vengono coperti dai chiusi del ricoprimento. (passare al complementare ed usare la **NINI** sugli aperti)

5.19

Passare al complementare e usare 5.20

5.20

NINI

5.21

Contarli come in 5.16

5.22

Caratterizzare i chiusi come gli insiemi che contengono i loro punti di accumulazione.

5.23

Bisezionare ed ogni volta e scegliere negli intervalli creati un qualsiasi elemento (se c'è) di F . (si generalizza ad \mathbb{R}^n)

5.30

Seconda parte: supponiamo per assurdo $\text{card}(A) > \text{card}(\mathbb{N})$. Operiamo una bisezione su A per vedere dove ci sono una quantità più che numerabile di punti: ad ogni bisezione sono ad un bivio e la scelta può essere *libera* o *obbligata*. Può essere *libera* se da entrambi i lati ci sono una quantità più che numerabile di punti. Non si possono presentare definitivamente scelte *obbligate*: qualunque successione di scelte *libere* io faccia prima o poi mi si presenterà un'altra scelta *libera* (se no in quell'intervallo avrei solo una quantità numerabile di punti). Ma allora ho libertà $\text{card}(\mathbb{N})$ volte di scegliere tra due possibilità: almeno $\text{card}(2^{\mathbb{N}}) \sim \text{card}(\mathbb{R})$ punti di accumulazione.

Alternativa: considero i punti di A . Aut sono isolati (dunque hanno cardinalità al più numerabile) aut sono di accumulazione (dunque stanno in A' e hanno ancora cardinalità al più numerabile).

5.31

Prima parte: consideriamo $A_0 := \{1/n : n \in \mathbb{N}^*\}$ quest'insieme chiaramente si accumula in 0 ed è composto da soli punti isolati. Costruiamo A_1 traslando e omotetizzando copie di A_0 in modo che si accumulino sui punti del tipo $1/n$ e che si abbia quindi $A'_1 = A_0$. Ricorsivamente si riesce ad ottenere la tesi. Seconda parte: incollare nell'intervallo $[2n, 2n+1]$ la soluzione della prima parte con n .

5.32

Sia X il mio insieme. Considero un suo punto x_o : trovo una successione di punti di X che tende a x_o ; reitro il procedimento per ogni punto di tale successione e così via: ho trovato $\text{card}(\mathbb{N}^{\mathbb{N}})$ punti.

6 Spazi metrici, normati e topologici

6.1

Osservo che dato un $c \in C_1$ deve esistere $r > 0$ tale che $\overline{B_r}(c) \cap C_2 = \emptyset$. Se così non fosse c sarebbe di accumulazione per C_2 , dunque vi apparterebbe, assurdo per disgiunzione. Unendo tali B_r ottengo il mio aperto.

6.4

Scrivo il mio aperto come unione numerabile di palle aperte: $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_{r_n}(x_n)$. Ogni palla aperta si scrive come successione strettamente crescente di palle compatte: $B_{r_n}(x_n) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} Y_{n,k}$ dove abbiamo posto $Y_{n,k} := B_{\frac{k}{k+1}r_n}(x_n)$.

Pongo $K_n := \bigcup_{k=1}^n Y_{k,n-k}$ e funziona.

6.5

Controesempio: mettere quattro punti su una sfera con la metrica delle geodetiche.

6.7

Controesempio $X = \mathbb{R}$, $A = \{n + 1/n\}$, $B = \mathbb{N}$.

6.13

Se una sottosuccessione $(x_{k(n)})$ converge a x_∞ , allora per ogni n ed m vale:

$$d(x_\infty, x_n) \leq d(x_\infty, x_{k(m)}) + d(x_{k(m)}, x_n)$$

che è infinitesimo per la convergenza di $(x_{k(n)})$ e il fatto che la successione sia di Cauchy ($k(m)$ è un naturale $\geq n$).

6.27

Supponiamo che, nelle ipotesi date, K non sia connesso. Allora K si spezza nell'unione di due aperti disgiunti A_1 e A_2 . Osservo che definitivamente si deve avere $K_n \cap A_1 \neq \emptyset$ e $K_n \cap A_2 \neq \emptyset$ altrimenti frequentemente $\delta(K_n, K) > r$ dove r è il raggio (fissato) di una palla centrata in un certo $k \in K$ tale che $B_r(k) \subseteq A_1$ (usiamo il fatto che se esiste una palla di raggio r centrata in $k \in K$ che è sempre disgiunta da K_n allora $\delta(K, K_n) \geq r$). A questo punto esiste una successione di x_n tali che $x_n \in K_n \setminus (A_1 \cup A_2) \subseteq (A_1 \cup A_2)^c$. Questa successione per il 6.22 converge ad un elemento $x_\infty \in K$; ma $(A_1 \cup A_2)^c$ è chiuso e quindi contiene i limiti delle proprie successioni, assurdo.

6.37

Solo se. Supponiamo vera l'identità del parallelogramma. L'unica definizione sensata a posteriori è:

$$2\langle x|y \rangle := \|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x-y\|^2 = \frac{1}{2}\|x+y\|^2 - \frac{1}{2}\|x-y\|^2$$

Le proprietà immediate da verificare (usando l'equivalenza delle definizioni) sono:

$$\langle x|x \rangle = \|x\|^2, \quad \langle x|-y \rangle = -\langle x|y \rangle, \quad \langle x+y|y \rangle = \langle x|y \rangle + \|y\|^2, \quad \langle x|y \rangle = \langle y|x \rangle$$

Usando la subadditività della norma poi:

$$|\langle x|y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

Da questa disuguaglianza si ha che la funzione definita è continua su $V \times V$. Proviamo l'additività. Scriviamo la seguente espressione:

$$\|x + 2z\|^2 = \|(x + z) + z\|^2 = \|x\|^2 + 2\|z\|^2 + 2\langle x|z \rangle + 2\langle x+z|z \rangle = \|x\|^2 + 4\|z\|^2 + 4\langle x|z \rangle \quad (\star)$$

Scrivo ora la tesi:

$$4\langle x + y|z \rangle = 4\langle x|z \rangle + 4\langle y|z \rangle$$

Usando la terza uguaglianza della definizione e portando le cose dello stesso segno dalla stessa parte ottengo:

$$\|x + y + z\|^2 + \|x - z\|^2 + \|y - z\|^2 = \|x + y - z\|^2 + \|x + z\|^2 + \|y + z\|^2$$

Ora moltiplico per due e applico l'identità del parallelogramma ai primi due addendi di ogni membro, ottenendo:

$$\begin{aligned} \|2x + y\|^2 + \|y + 2z\|^2 + 2\|y - z\|^2 &= \|2x + y\|^2 + \|y - 2z\|^2 + 2\|y + z\|^2 \\ \Leftrightarrow \|y + 2z\|^2 + 2\|y - z\|^2 &= \|y - 2z\|^2 + 2\|y + z\|^2 \end{aligned}$$

da qui si conclude usando (\star) per aprire le norme. Manca adesso l'omogeneità. Si ha subito per omogeneità della norma che:

$$\langle \lambda x | \lambda y \rangle = \lambda^2 \langle x | y \rangle \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

usando induttivamente l'additività ottengo che:

$$\left\langle \frac{a}{b} x \mid \frac{c}{d} y \right\rangle = \frac{1}{b^2 d^2} \langle adx | cby \rangle = \frac{ac}{bd} \langle x | y \rangle \quad a, b, c, d \in \mathbb{N}$$

questo prova l'omogeneità sui razionali, per continuità ciò è vero su \mathbb{R} .

6.39

Essendo V a dimensione finita esiste, fissata una base, un isomorfismo ψ con un certo \mathbb{R}^d :

$$\psi : V \ni \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_d e_d \mapsto (\lambda_1, \dots, \lambda_d) \in \mathbb{R}^d$$

Pongo ora su V la norma euclidea:

$$\|v\|_{\mathcal{E}} := \max_i \{ |\lambda_i| \}$$

mostriamo che $B_{\mathcal{E}}$, la sfera unitaria, è compatta per successioni. Data una successione di vettori unitari in V le loro componenti sono d successioni di reali in $[-1, 1]$ dunque per Bolzano-Weierstrass hanno una sottosuccessione convergente. Considero ora un'altra generica norma su V e la penso come funzione dalla sfera unitaria in \mathbb{R} :

$$\|\cdot\| : B_{\mathcal{E}} \rightarrow \mathbb{R}$$

Questa funzione è continua rispetto alla metrica indotta da $\|\cdot\|_{\mathcal{E}}$, in effetti si ha che è lipschitziana:

$$\|u - v\| \leq \sum_{i=1}^d |u_i - v_i| \|\vec{e}_i\| \leq d \cdot \max_i \{|u_i - v_i|\} \cdot \max_i \{\|\vec{e}_i\|\} = K \|u - v\|_{\mathcal{E}}$$

Quindi per Weierstrass ammette $\max = M$ e $\min = m$, che devono essere positivi. Dunque si ha, per un generico $u \in B_{\mathcal{E}}$:

$$m \|u\|_{\mathcal{E}} \leq \|u\|_2 \leq M \|u\|_{\mathcal{E}}$$

Abbiamo mostrato che ogni norma è equivalente a $\|\cdot\|_{\mathcal{E}}$; e poichè relazione di bi-lipschitz equivalenza gode della proprietà transitiva abbiamo finito. Per la seconda domanda si prenda V come l'insieme delle successioni a valori reali assolutamente sommabili, le seguenti norme non sono equivalenti:

$$\|x_n\|_1 = \sup_k |x_k| \quad \text{e} \quad \|x_n\|_2 = \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{-k} |x_k|$$

in effetti non inducono neppure la stessa topologia poichè esistono successioni di vettori di V che rispetto alla prima non convergono mentre rispetto alla seconda sì. (ad esempio $(x_n)_k = \delta_{n,k}$).

6.40

Controesempio: nello spazio V delle successioni la cui somma dei valori assoluti converge considero il sottospazio W delle successioni definitivamente nulle. Se prendo le successioni del tipo $x_n = 2^{-n} \chi_{[0,k]}$ queste vivono in W ma il loro limite (rispetto a k si intende, cioè la successione $y_n = 2^{-n}$) chiaramente no.

6.41

Completezza \Rightarrow Convergenza assoluta. Poichè la serie converge il termine generale è infinitesimo, per completezza di \mathbb{R} questo vuol dire che, posto $S_k = \sum_{i=0}^k x_i$, si ha:

$$\epsilon > \sum_{i=M}^N \|x_i\| \geq \left\| \sum_{i=M}^N x_i \right\| = \|S_N - S_M\| \quad N, M \geq n_{\epsilon}$$

Dunque la successione $S_N \in V$ è di Cauchy e per completezza converge.
Convergenza assoluta \Rightarrow Completezza. Supponiamo V incompleto. Esiste dunque (x_n) che ha la proprietà di Cauchy ma non converge in V . Usando nella definizione di Cauchy $\epsilon = 2^{-j}$ estraggo una sottosuccessione $(x_{n(j)})$ tale che la successione di partenza stia definitivamente in $B_{2^{-j}}(x_{n(j)})$ e scelgo sempre $x_{n(j+1)} \in B_{2^{-j}}(x_{n(j)})$. Osservo che anche $(x_{n(j)})$ ha la proprietà di Cauchy e per 6.13 neanche lei converge. Posto $y_j := x_{n(j+1)} - x_{n(j)}$ ho che:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|y_j\| \leq \sum_{j \in \mathbb{N}} 2^{-j} = 1 \quad \Rightarrow \quad x_{n(k)} - x_{n(0)} = \sum_{i=1}^k y_i \rightarrow \ell \quad \Rightarrow \quad x_{n(k)} \text{ converge}$$

ma questo è assurdo.

6.50

Sia dato un ricoprimento aperto $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. Supponiamo che l'inf dei raggi sia 0. Questo significa che per ogni $\epsilon > 0$ esiste una palla $B_\epsilon(x_\epsilon)$ che non è contenuta interamente in nessun aperto del ricoprimento. Per ogni n , mi gioco questa proprietà con $\epsilon = 1/n$ e definisco come x_n il centro della palla $B_\epsilon(x_\epsilon)$. Questa successione ammette una sottosuccessione convergente (x_{n_k}) ad un certo elemento $x_\infty \in X$, ma questo punto limite deve stare in un certo A_λ (perchè sono un ricoprimento); dunque esiste $r > 0$ tale che $B_r(x_\infty) \subseteq A_\lambda$. In particolare ci saranno infiniti punti della mia sottosuccessione nell'intorno $B_{r/2}(x_\infty)$. Ma allora scelgo un elemento della sottosuccessione abbastanza avanti in modo che $n_k > 2/r$, ottengo quindi che

$$B_{1/n_k}(x_{n_k}) \subseteq B_r(x_\infty) \subseteq A_\lambda$$

ma questo è assurdo perchè viola la proprietà caratteristica di x_{n_k} (ha la palla di raggio dato interamente contenuta in un aperto del ricoprimento).

6.51

(NINI in spazi metrici) Scelgo una successione tale che $x_n \in F_n$. Tale successione vive in F_1 che è compatto dunque qui ammette una sottosuccessione convergente a x_∞ . Per ogni naturale N osservo che la sottosuccessione vive definitivamente in F_N e per compattezza qui vive il suo limite x_∞ , ciò prova che $x_\infty \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$.

6.54

Compattezza per ricoprimenti \Rightarrow Compattezza sequenziale.

Supponiamo per assurdo che esista una successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ che non ammette sottosuccessioni convergenti. Questo significa che l'immagine di

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ non ha punti di accumulazione, cioè che:

$$\forall x \in X \exists \epsilon_x > 0 : (B_{\epsilon_x}(x) \setminus \{x\}) \cap (x_n)_{n \in \mathbb{N}} = \emptyset$$

Chiaramente $\bigcup_{x \in X} B_{\epsilon_x}(x) \supseteq X$ dunque $\{B_{\epsilon_x}(x)\}_{x \in X}$ è un ricoprimento aperto; ma per ipotesi deve ammettere un sottoricoprimento finito che avrà centri y_1, \dots, y_k . Per pigeonhole per almeno un $1 \leq i \leq k$ ho che $B_{\epsilon_{y_i}}(y_i)$ contiene infiniti termini della successione, ma per costruzione ne può contenere al più uno. Assurdo.

Compattezza sequenziale \Rightarrow Totale limitatezza.

Fissato un $\epsilon > 0$ e scelto un $x_0 \in X$ definisco ricorsivamente una sequenza (x_n) scegliendo ogni termine in modo che:

$$x_n \in X \setminus \bigcup_{i=0}^{n-1} B_{\epsilon}(x_i)$$

Opero una dicotomia (*cit.*):

- Se esiste N tale che $X \setminus \bigcup_{i=0}^N B_{\epsilon}(x_i) = \emptyset$ ho trovato un ricoprimento finito;
- Se un tale N non esiste allora ho ottenuto una successione (x_n) . Per compattezza deve avere una sottosuccessione convergente (dunque di Cauchy): ma questo è assurdo perché comunque presi $m > n$ ho che:

$$x_m \notin B_{\epsilon}(x_n) \Rightarrow d(x_m, x_n) > \epsilon$$

Compattezza sequenziale \Rightarrow Completezza.

Sia (x_n) una successione di Cauchy; per compattezza ammette una sottosuccessione convergente ma, essendo di Cauchy (x_n) converge per 6.13.

Completezza \wedge Totale limitatezza \Rightarrow Compattezza sequenziale.

Prendo una qualsiasi successione $(x_n) \subseteq X$; voglio definire ricorsivamente una sua sottosuccessione convergente; per completezza mi basta farla di Cauchy. Per totale limitatezza posso ricoprire tutto X con numero finito di palle di raggio arbitrariamente fissato (diciamo $r_0 = 1$). La mia successione dovrà cadere infinite volte in almeno una di queste palle (per pigeonhole); ne prendo una e la chiamo B_0 e, poichè un sottoinsieme di un totalmente limitato è totalmente limitato, anche B_0 è totalmente limitato. Ma B_0 contiene infiniti termini della successione quindi, dato un qualunque suo ricoprimento finito posso trovare una $B_1 \subset B_0$ di raggio arbitrario ($r_1 = 1/2$) che contiene ancora infiniti elementi della successione. Definisco così induttivamente i B_k e li scelgo ogni volta di raggio 2^{-k} . Definisco ora la mia sottosuccessione $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ così:

$$n_k := \min \{j \in \mathbb{N} \mid j > n_{k-1} \wedge x_j \in B_k\}$$

perchè l'insieme di cui prendo il minimo non è mai vuoto. Ma la sottosuccessione così definita è chiaramente di Cauchy.

Totale limitatezza \wedge Compattezza sequenziale \Rightarrow Compattezza per ricoprimenti.

Sia dato un ricoprimento aperto $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$. Per compattezza sequenziale esiste un numero di Lebesgue ρ positivo (6.50). Per totale limitatezza esiste un ricoprimento finito con palle di raggio ρ ; sia $\{B_\rho(x_1), \dots, B_\rho(x_n)\}$ tale ricoprimento finito. Per definizione di numero di Lebesgue ho che ognuna di queste palle $B_\rho(x_i)$ è contenuta in almeno un aperto A_{λ_i} del mio ricoprimento; si ha dunque che $\{A_{\lambda_1}, \dots, A_{\lambda_n}\}$ è ancora un ricoprimento del mio insieme ed è chiaramente finito.

Totale limitatezza \Rightarrow Separabilità.

Voglio costruire un sottoinsieme denso e numerabile. Per ogni $\epsilon_k = 2^{-k}$ ho un ricoprimento finito di ϵ_k -palle. Sia $C_k = \{c_1, \dots, c_{n(k)}\}$ l'insieme dei centri di queste palle. L'insieme $C = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} C_k$ è numerabile (in quanto unione numerabile di insiemi finiti) e denso, infatti dato un qualsiasi $x \in X$ ed $\epsilon > 0$ so che x è contenuto in una palla del mio ϵ -ricoprimento finito, cioè dista meno di ϵ da un centro di queste palle, che è un elemento di C . Per l'arbitrarietà di ϵ ogni palla centrata in x interseca C .

6.55

Separabilità \Rightarrow Topologia a base numerabile.

Per ipotesi esiste D un sottoinsieme denso e numerabile. Voglio mostrare che

$$\mathcal{B} = \{B_q(d) \mid q \in \mathbb{Q}^+ \wedge d \in D\}$$

è una base per la mia topologia, essendo chiaramente $|\mathcal{B}| = |D \times \mathbb{Q}| = \aleph_0$. Prendo un generico $A \subseteq X$ aperto e un generico $a \in A$. So che esiste $r > 0$ tale che $B_{2r}(a) \subseteq A$. Ma per densità posso scegliere un b in $B_r(a) \cap D$; a questo punto scelgo un razionale q tale che $d(a, b) < q < r$ ed ho che:

$$\{a\} \subseteq B_q(b) \subseteq B_{2r}(a) \subseteq A$$

prendendo a primo e ultimo membro l'unione per ogni $a \in A$ ottengo che A si scriveva come unione di palle di raggio razionale e centro in D cioè come unione di elementi di \mathcal{B} . Osserviamo che in realtà l'unione che abbiamo fatto è *sovrabbondante*, in effetti si può fare numerabile perchè stiamo unendo elementi di una famiglia numerabile (\mathcal{B}).

Topologia a base numerabile \Rightarrow Separabilità.

Scegliamo un rappresentante per ogni insieme in \mathcal{B} . Mostriamo che quest'insieme è denso (è ovviamente numerabile essendolo \mathcal{B}), per farlo basta osservare che ogni palla aperta centrata in ogni punto è un aperto, dunque si scrive come unione di elementi di \mathcal{B} , dunque contiene un elemento che avevo scelto in partenza.

6.57

Supponiamo sia separabile, esiste dunque un insieme D denso e numerabile, sia poi $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ la nostra famiglia di aperti disgiunti. Per densità si ha che per ogni λ esiste $d_\lambda \in D$ tale che $d_\lambda \in D \cap A_\lambda$. Ho dunque una mappa da Λ a D , si vede che è iniettiva per disgiunzione, da cui l'assurdo per cardinalità.

6.59

Posso fare delle funzioni continue che sugli interi valgono solo $\{0, 1\}$. Per ogni numero reale $\xi \in [0, 1)$ considero la sua rappresentazione binaria, e gli associo la funzione φ_ξ che nell' n -esimo intero vale l' n -esima cifra binaria di ξ . Ma le palle aperte di raggio $1/2$ centrate in tali funzioni sono disgiunte (infatti la distanza tra due di queste diverse è sempre 1), si conclude per 6.57.

6.60

(Teorema di Lindelof). Sia $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ il mio ricoprimento aperto e D il mio denso e numerabile, per 6.55 ho \mathcal{B} una base numerabile per la topologia. Prendo ora un generico $x \in X$ e osservo che appartiene ad un A_{λ_x} , ma quest'ultimo si scrive come unione numerabile di elementi di \mathcal{B} ; dunque esiste $B_x \in \mathcal{B}$ tale che $x \in B_x \subseteq A_{\lambda_x}$. Resta dunque definita una funzione:

$$\varphi : X \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow \Lambda$$

$$\varphi : x \mapsto B_x \mapsto \lambda_x$$

Essendo i B_x numerabili ho che $\varphi(X)$ è numerabile, ma praticamente per definizione $\bigcup_{\lambda \in \varphi(X)} A_\lambda \supseteq X$.

6.62

(Teorema di Baire) Passando al complementare, voglio mostrare che non è possibile ottenere l'insieme vuoto come intersezione numerabile di aperti densi (qualsiasi palla B non è tutta contenuta in X , quindi esiste almeno un $y \in X^c \cap B$). Supponiamo per assurdo esista $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ collezione di aperti densi a intersezione vuota; costruiamo una successione (x_n) t.c. $x_1 \in A_1 \wedge \exists \delta_1 > 0 \quad B_{\delta_1}(x_1) \subseteq A_1, x_2 \in A_2 \cap B_{\delta_1}(x_1) \wedge \exists \delta_2 > 0$ t.c. $B_{\delta_2}(x_2) \subset B_{\delta_1}(x_1), \dots$. La successione (x_n) così costruita è di Cauchy (È dentro una palla di raggio $\delta_k \forall n \geq k$ e posso scegliere la successione del δ_k in modo che sia infinitesima). Quindi $x_n \rightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$, assurdo.

7 Continuità

7.6

Osserviamo che una formulazione equivalente è:

$$f \text{ surgettiva} \wedge (f(x_n) \text{ converge} \Rightarrow (x_n) \text{ converge}) \Rightarrow f \text{ continua}$$

Intanto mostriamo che f è iniettiva. Se non lo fosse avrei $f(x) = f(x') := f$ con $x \neq x'$, prendo la successione:

$$x_{2n} = x \text{ e } x_{2n+1} = x' \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f \wedge (x_n) \text{ non converge}$$

Assurdo, dunque f è bigettiva, considero ora la sua inversa g e riscrivo il problema come:

$$g \text{ bigettiva} \wedge ((y_n) \text{ converge} \Rightarrow g(y_n) \text{ converge}) \Rightarrow f \text{ continua}$$

Posto ora che $y_n \rightarrow y_\infty$ e che $g(y_n) \rightarrow g_\infty$ considero la successione:

$$z_{2n} = y_\infty \text{ e } z_{2n+1} = y_n \Rightarrow g(z_{2n+1}) \rightarrow g_\infty \text{ e } g(z_{2n}) = g(y_\infty)$$

Per ipotesi di convergenza e per unicità del limite ho: $g_\infty = g(y_\infty)$. Ma questa è la continuità di g . Essendo g continua e bigettiva è monotona e dunque la sua inversa, cioè f , è continua.

7.40

Controesempio cannonoso: Fissiamo una base di Hamel di \mathbb{R} come spazio vettoriale su \mathbb{Q} . Ora ogni reale x si scrive come combinazione lineare *finita*: $x = \sum_{i=0}^{n_x} \frac{p_i}{q_i} b_i$. Definisco:

$$f : x \mapsto \frac{1}{\gcd(p_1, \dots, p_{n_x})}$$

questa f è effettivamente un controesempio.

Controesempio alternativo: sia $A = \{\pi, \pi^2, \dots\}$ definisco f costantemente 1 su A e nulla altrove. Fissato \tilde{x} la sua progressione aritmetica casca al più una volta in A (che si riesca anche a fare continua sulla base di questa?)...

Se f è uniformemente continua invece il limite di f è nullo. Prendo $L = \limsup f$ e so che frequentemente c'è qualcuno (sia x_k) sopra $L - \epsilon$. Prendo il δ dell' uniforme continuità e ho che $f([x_k - \delta, x_k + \delta]) \geq L - 2\epsilon$. Scelgo ora $\tilde{x} < 2\delta$ e applico la prima ipotesi ottenendo un assurdo perchè capito negli intorno di tutti gli x_k ed ho $\limsup_n n\tilde{x} \geq L - 2\epsilon > 0$ per l' arbitrarietà di ϵ .