

INSERTO PARA EL PACIENTE

B. Braun Medical SA, 1023 Crissier, Suiza

**Nutriflex® Peri**

Lea todo el inserto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este inserto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este inserto. Ver sección 4.

Contenido del inserto

1. ¿Qué es Nutriflex Peri y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Nutriflex Peri?
3. ¿Cómo usar Nutriflex Peri?
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Nutriflex Peri
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Nutriflex Peri y para qué se utiliza?

Los nutrientes que este medicamento contiene son los llamados aminoácidos, sales (electrolitos) e hidratos de carbono (glucosa), que son imprescindibles para el crecimiento y la curación del cuerpo, además de calorías en forma de hidratos de carbono.

Se le suministrará este medicamento a través de una perfusión intravenosa (goteo en una vena) porque no puede ingerir suficientes alimentos o no puede recibir alimentación a través de una sonda.

Nutriflex Peri está especialmente desarrollado para adultos y niños entre 2 y 17 años que muestren un catabolismo de intensidad ligera o moderada. En esta situación, los pacientes consumen sus reservas de energía, proteínas, etc. más rápido de lo que las pueden reponer.

2. ¿Qué necesita saber antes de empezar a usar Nutriflex Peri?**No use Nutriflex Peri:**

- si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si presenta un defecto congénito en el metabolismo de los aminoácidos para el que requiera una alimentación hiperproteínica especial.
- si tiene un nivel de glucosa en sangre anormalmente alto que únicamente pueda controlarse con más de 6 unidades de insulina por hora.
- si presenta hiperacidemia en sangre (acidosis).
- si padece una hemorragia craneal o medular.
- si sufre una disfunción hepática grave (insuficiencia hepática grave).
- si padece una disfunción renal grave (insuficiencia renal grave) y no tiene acceso a un tratamiento con un riñón artificial (hemofiltración o diálisis).

Al igual que otros medicamentos de este tipo, no se le debe administrar Nutriflex Peri si padece alguna de las siguientes afecciones:

- fase aguda de un ataque al corazón (infarto de miocardio) u otro accidente cerebrovascular
- cualquier tipo de trastorno metabólico mal controlado, por ejemplo, inconsciencia (coma), cuyas causas no se hayan esclarecido;

Nutriflex Peri puede interaccionar con otros medicamentos. Informe a su médico si está tomando o le han recetado alguno de los siguientes medicamentos:

- medicamentos para el tratamiento de la inflamación (corticoesteroides)
- preparados hormonales que afectan al equilibrio hídrico (hormona adrenocorticotropa [ACTH])
- medicamentos para la estimulación de la secreción urinaria (diuréticos), como, por ejemplo, espironolactona, triamtereno o amilorida
- medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial (inhibidores de la ECA), como, por ejemplo, captopril y enalapril
- medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial u otros problemas cardíacos (antagonistas de los receptores de la angiotensina II), como, por ejemplo, losartán y valsartán
- medicamentos empleados en la medicina de trasplantes, como, por ejemplo, ciclosporina y tacrolimus

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia o si cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Embarazo

Si está embarazada, solamente se le recetará este medicamento si su médico considera que es indispensable para su recuperación.

Lactancia

No se recomienda que las mujeres den el pecho si están recibiendo alimentación por vía intravenosa.

Fertilidad

No se dispone de datos.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento suele administrarse a pacientes ingresados, por ejemplo, en un hospital o una clínica, por lo que se descarta la conducción o el uso de máquinas. Sin embargo, el medicamento en sí no tiene ningún efecto sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

3. ¿Cómo usar Nutriflex Peri?

Este medicamento se le administrará por perfusión intravenosa (goteo), es decir, a través de un tubo delgado conectado directamente a una vena. La perfusión puede llevarse a cabo en venas pequeñas (periféricas) o grandes (centrales).

Antes de la perfusión, la solución debe encontrarse siempre a temperatura ambiente.

Su médico decidirá qué cantidad de medicamento necesita y durante cuánto tiempo se prolongará su tratamiento con este medicamento.



oxigenación insuficiente de los tejidos o diabetes mellitus descompensada

- problemas cardiovasculares potencialmente mortales como los que pueden manifestarse, por ejemplo, en caso de síncope o en estado de shock, acumulación de agua en los pulmones (edema pulmonar) o alteración del equilibrio hídrico

Nutriflex Peri no se debe administrar a recién nacidos, lactantes o niños menores de 2 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su enfermero antes de empezar a usar Nutriflex Peri:

- si padece una reducción de su función cardíaca o renal.
- si presenta alteraciones en el equilibrio hídrico, electrolítico o acidobásico, por ejemplo, deficiencia de líquidos o de sal (deshidratación hipotónica) o una concentración reducida de sodio o de potasio en sangre.
- si presenta un nivel de glucosa en sangre anormalmente alto.

Su dosis diaria se ajustará y supervisará con especial cuidado si padece insuficiencia renal, hepática, suprarrenal, cardíaca o pulmonar.

Asimismo, su médico procederá con especial cuidado si su barrera hematoencefálica está dañada, puesto que, en algunos casos, este medicamento puede provocar un aumento de la presión craneal o medular.

Si padece un estado de desnutrición avanzada, su alimentación intravenosa se llevará a cabo con sumo cuidado de manera progresiva. En este caso, se supervisarán minuciosamente los electrolitos, en particular, el potasio, magnesio y fosfato y se suministrarán en las cantidades necesarias.

Este medicamento contiene glucosa (un azúcar), que puede afectar a su nivel de glucosa en sangre. Con el objetivo de controlarlo, puede ser necesario tomar muestras de sangre.

Si su perfusión se interrumpe de repente por error, su nivel de glucosa en sangre puede caer bruscamente. Su médico lo tendrá en cuenta, en particular si su capacidad para metabolizar la glucosa es limitada (por ejemplo, si padece diabetes) o en el caso de que se administre esta solución a niños menores de 3 años. Por este motivo, se vigilará su nivel de glucosa en sangre, especialmente tras la interrupción de la perfusión.

Además, es necesario un control del equilibrio electrolítico en sangre, del equilibrio hídrico y acidobásico, del hemograma, de la coagulación sanguínea y de la función hepática y renal.

Asimismo, su médico se asegurará de que queden cubiertas las necesidades de líquidos y electrolitos de su organismo. Con el objetivo de satisfacer plenamente sus necesidades, recibirá otros nutrientes junto con Nutriflex Peri.

La perfusión en venas periféricas puede producir flebitis y, como resultado, causar un coágulo sanguíneo. Por ello, su médico vigilará a diario el lugar de la perfusión.

Como sucede con todas las soluciones intravenosas, durante la perfusión de Nutriflex Peri son necesarias unas estrictas medidas de asepsia.

Niños y adolescentes

En lo referente a una caída repentina del nivel de glucosa en sangre de su hijo tras una interrupción por error de la perfusión, consulte además la sección anterior "Advertencias y precauciones".

Su médico no recetará Nutriflex Peri a niños menores de 2 años.

Uso de Nutriflex Peri con otros medicamentos

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

La dosis diaria recomendada para adultos es de 40 mL de solución para perfusión por cada kilogramo de peso corporal. Su médico determinará la dosis exacta.

Uso en niños y adolescentes

Existen directrices de dosificación especiales para niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y los 17 años. Su médico conoce esas directrices y determinará la dosis correspondiente.

Si recibe más Nutriflex Peri del que debe

Si se administra correctamente, es poco probable que se produzca una sobredosis de este medicamento. No obstante, si tiene lugar una sobredosis, puede experimentar los siguientes síntomas:

- contenido de agua anormalmente alto en el organismo (hiperhidratación),
- micción anormalmente alta (poliuria),
- alteración del equilibrio salino del organismo (metabolismo electrolítico alterado),
- agua alojada en los pulmones (edema pulmonar),
- pérdida de aminoácidos a través de la orina y equilibrio de aminoácidos alterado,
- hiperacidemia en sangre (acidosis metabólica),
- náuseas, vómitos, escalofríos, dolores de cabeza,
- alta concentración de nitrógeno en sangre (hiperamoniemia),
- nivel de glucosa en sangre anormalmente alto (hiperglucemia),
- glucosa en la orina (glucosuria),
- deficiencia de líquidos (deshidratación),
- sangre demasiado concentrada (hiperosmolaridad),
- inconsciencia provocada por un nivel de glucosa en sangre excesivamente elevado (coma hiperglucémico hiperosmolar).

Si experimenta alguno de estos síntomas, se interrumpirá la perfusión de inmediato. Su médico decidirá sobre el tratamiento ulterior. No se reanudará la perfusión hasta que no hayan remitido los síntomas.

Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos se originan principalmente a causa de sobredosis o de una velocidad de perfusión excesiva. Al finalizar la perfusión, suelen desaparecer los efectos adversos.

Frecuentes (puede afectar a 1 de 10 pacientes)

- Irritación venosa, inflamación de la pared venosa en el lugar de la perfusión (flebitis, tromboflebitis)

Raros (pueden afectar a 1 de 1000 pacientes)

- náuseas, vómitos y disminución del apetito

Si se producen náuseas, vómitos o disminución del apetito, debe interrumpirse el tratamiento o proseguirse a discreción del médico a una dosis inferior.

Si aparecen signos de irritación venosa o inflamación de la pared venosa, es posible que su médico cambie el lugar de la perfusión.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este inserto. También puede comunicarlos directamente. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Nutriflex Peri

El producto debe ser almacenado fuera del alcance y vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Almacenar en su envase exterior para protegerlo de la luz.

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Nutriflex Peri

PRESENTACIÓN: 1000 mL

1000 mL de solución para perfusión contiene:

Compartimiento de aminoácidos (400 mL)

Isoleucina	2.34 g
Leucina	3.13 g
Clorhidrato de lisina	2.84 g
<i>(equivalente a Lisina 2.27 g)</i>	
Metionina	1.96 g
Fenilalanina	3.51 g
Treonina	1.82 g
Triptófano	0.57 g
Valina	2.60 g
Monoglutamato de arginina	4.98 g
<i>(equivalente a Arginina 2.70 g y</i>	
<i>equivalente a Ácido glutámico 2.28 g)</i>	
Clorhidrato de histidina monohidrato	1.69 g
<i>(equivalente a Histidina 1.25 g)</i>	
Alanina	4.85 g
Ácido aspártico	1.50 g
Ácido glutámico	1.22 g
Glicina	1.65 g
Prolina	3.40 g
Serina	3.00 g
Acetato de magnesio tetrahidrato	0.86 g
Acetato de sodio trihidrato	1.56 g
Fosfato de potasio dihidrogeno	0.78 g
Hidróxido de potasio	0.52 g
Hidróxido de sodio	0.50 g

Compartimiento de glucosa (600 mL)

Glucosa monohidrato	88.0 g
<i>(equivalente a 80.0 g de Glucosa)</i>	
Cloruro de sodio	0.17 g
Cloruro de calcio dihidrato	0.37 g

Después de la mezcla de ambos compartimientos 1000 mL contiene:

Electrolitos:

Sodio	27.0 mmol
Potasio	15.0 mmol
Calcio	2.5 mmol
Magnesio	4.0 mmol
Cloruro	31.6 mmol
Fosfato	5.7 mmol
Acetato	19.5 mmol

Contenido de aminoácidos	40 g
Contenido de nitrógeno	5.7 g
Contenido de carbohidrato	80 g
Energía no proteica	1340 kJ (320 kcal)
Total de energía	2010 kJ (480 kcal)
Osmolaridad teórica	900 mOsm/L

Compartimiento de aminoácidos (800 mL)

Isoleucina	4.68 g
Leucina	6.26 g
Clorhidrato de lisina	5.68 g
<i>(equivalente a Lisina 4.54 g)</i>	
Metionina	3.92 g
Fenilalanina	7.02 g
Treonina	3.64 g
Triptófano	1.14 g
Valina	5.20 g
Monoglutamato de arginina	9.96 g
<i>(equivalente a Arginina 5.40 g y</i>	
<i>equivalente a Ácido glutámico 4.56 g)</i>	
Clorhidrato de histidina monohidrato	3.38 g
<i>(equivalente a Histidina 2.50 g)</i>	
Alanina	9.70 g
Ácido aspártico	3.00 g
Ácido glutámico	2.44 g
Glicina	3.30 g
Prolina	6.80 g
Serina	6.00 g
Acetato de magnesio tetrahidrato	1.72 g
Acetato de sodio trihidrato	3.12 g
Fosfato de potasio dihidrogeno	1.56 g
Hidróxido de potasio	1.04 g
Hidróxido de sodio	1.00 g

Compartimiento de glucosa (1200 mL)

Glucosa monohidrato	176.0 g
<i>(equivalente a 160.0 g de Glucosa)</i>	
Cloruro de sodio	0.34 g
Cloruro de calcio dihidrato	0.74 g

Después de la mezcla de ambos compartimientos 2000 mL contiene:

Electrolitos:

Sodio	54.0 mmol
Potasio	30.0 mmol
Calcio	5.0 mmol
Magnesio	8.0 mmol
Cloruro	63.2 mmol
Fosfato	11.4 mmol
Acetato	39.0 mmol

Contenido de aminoácidos	80 g
Contenido de nitrógeno	11.4 g
Contenido de carbohidrato	160 g
Energía no proteica	2680 kJ (640 kcal)
Total de energía	4020 kJ (960 kcal)
Osmolaridad teórica	900 mOsm/L
pH	4.8 – 6.0

Excipientes:

Ácido cítrico monohidrato
(equivalente a Ácido cítrico)
 Agua para inyectables

Aspecto del producto

Este medicamento es una solución para perfusión, es decir, se administra a través de un tubo delgado conectado a una vena.

Esta información está destinada únicamente a profesionales del sector sanitario:

Utilice las soluciones únicamente si son totalmente transparentes e incoloras, o ligeramente amarillentas, y sus envases no presentan ningún daño. Después de un uso, deben desecharse los envases y la solución para perfusión no utilizada.

PRESENTACIÓN: 2000 mL


2000 mL de la solución para perfusión contiene:

Preparación de la solución mezclada

Inmediatamente antes del uso, debe abrirse el precinto desprendible entre ambas cámaras para que los contenidos correspondientes se puedan mezclar de forma aséptica.

Extraiga la bolsa de la funda protectora y proceda como se indica a continuación:

- Coloque la bolsa desplegada sobre una superficie sólida y lisa.
- Haciendo presión con ambas manos sobre una cámara, abra el precinto desprendible.
- Mezcle los contenidos de la bolsa brevemente.



Para añadir sustancias suplementarias a Nutriflex Peri, existe una conexión específica.

Al añadir otras soluciones o emulsiones grasas a Nutriflex Peri, es necesario proceder de manera estrictamente aséptica. Las emulsiones grasas pueden mezclarse fácilmente mediante un equipo de transferencia especial.

Velocidad máxima de perfusión

La velocidad máxima de perfusión tanto para adultos como para niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y los 17 años es de 2,5 mL por kilogramo de peso corporal por hora.

Después de la primera apertura del envase

Advertencia: Utilizar solo después de abrir la separación de las cámaras y mezclar las dos soluciones.

Solo utilizar si el envase, la separación de las cámaras y los conectores no presentan daños y están intactos, y si la solución es transparente e incolora y está exenta de partículas visibles. Quite la sobreenvoltura exterior solo inmediatamente antes del uso.

Fabricado por:

B. Braun Medical AG

Seesatz

6204 Sempach, Suiza

Importado por:

B. Braun Medical Perú S.A.

Av. Separadora Industrial 887-Ate, Lima – Perú

RUC: 20377339461

Revisión: Agosto 2018 – Versión 02