

<b>G</b> EOCENTRIC	<b>C</b> ARTESIAN	<b>C</b> OORDINATES/System	<b>(G</b> CC/S)
	<b>G</b> EODETIC		<b>(G</b> GC/S)
	<b>S</b> pherical		<b>(G</b> SC/S)
<b>T</b> OPOCENTRIC	<b>C</b> ARTESIAN		<b>(T</b> CC/S)

GGC  $\rightarrow$  GCC

$$\begin{aligned} X &= (N+h) \cos \varphi \cos \varphi \\ Y &= (N+h) \cos \varphi \sin \varphi \\ Z &= [N(1-e^2) + h] \sin \varphi \end{aligned}$$

PRIME VERTICAL RADIUS OF CURVATURE

$$N = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$$

$$e^2 = (a^2 - b^2) / b^2$$

$a$ : major SEMIAXIS

$b$ : minor SEMIAXIS

GCC  $\rightarrow$  GGC

HILVONEN-MORITZ algorithm

input:  $X, Y, Z, a, b, it_{max}$


$k=0$

- $p = \sqrt{X^2 + Y^2}$
- $\varphi_0 = \tan^{-1} \left( \frac{Z}{p(1-e^2)} \right)$
- $N_0 = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}$
- $h_0 = \frac{p}{\cos \varphi_0} - N_0$

for  $k = 1: it_{max}$

- $\varphi = \tan^{-1} \left[ \frac{Z}{p} \left( 1 - e^2 \frac{N_0}{N_0 + h_0} \right)^{-1} \right]$
- $N = a / \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$
- $h = \frac{p}{\cos \varphi} - N$
- $\varphi_0 \leftarrow \varphi$
- $N_0 \leftarrow N$
- $h_0 \leftarrow h$

## Unit vectors relating GGC and GGC



$$\hat{h}(h, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda \\ \cos \phi \sin \lambda \\ \sin \phi \end{bmatrix}$$

- direction of increasing  $h$
- outward normal of ellipsoid

$$\hat{\phi}(h, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \lambda \\ -\sin \phi \sin \lambda \\ \cos \phi \end{bmatrix}$$

- direction of increasing  $\phi$
- tangent to meridian plane
- " " ellipsoid

$$\hat{\lambda}(h, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \\ 0 \end{bmatrix}$$

- direction of increasing  $\lambda$
- tangent to ellipsoid

### GSC $\rightarrow$ GCC


$$\begin{aligned} X &= r \cos \phi \cos \lambda \\ Y &= r \cos \phi \sin \lambda \\ Z &= r \sin \phi \end{aligned}$$

### GCC $\rightarrow$ GSC


$$r = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

$$\phi = \sin^{-1} \left( \frac{Z}{r} \right)$$

$$\lambda = \tan^{-1} (Y/X)$$



Unit vectors  
relating GSC  
and GCC



$$\tan \phi = \frac{a^2}{b^2} \tan \phi$$


$$\hat{r}(r, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} \cos \phi \cos \lambda \\ \cos \phi \sin \lambda \\ \sin \phi \end{bmatrix} \quad \hat{\phi}(r, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} -\sin \phi \cos \lambda \\ -\sin \phi \sin \lambda \\ \cos \phi \end{bmatrix} \quad \hat{\lambda}(r, \phi, \lambda) = \begin{bmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \\ 0 \end{bmatrix}$$

# TCC


- Origin at a point Q
- Q may be defined with GCC, GGC or GSC

Consider two points defined with GCC

$$Q = (X_0, Y_0, Z_0) \quad P = (X, Y, Z)$$




$$\hat{l} = \begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} \hat{u} &= \hat{v} \text{ OR } \hat{w} \\ \hat{v} &= \hat{u} \text{ OR } \hat{w} \\ \hat{w} &= \hat{u} \text{ OR } \hat{v} \end{aligned}$$

$$\|\hat{u}^T \hat{l}\|$$



$$\begin{aligned} x &= \hat{u}^T \hat{l} \\ y &= \hat{v}^T \hat{l} \\ z &= \hat{w}^T \hat{l} \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R^T \begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix}$$

$$R^T = R^{-1} \text{ OK?}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} + R \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$