

# Дифференциальные уравнения листок 10 (КАВО)

Биршерт Лешка

Апрель 2019



## Задача 1

Тупа отсылка к листку 6 (только надо привести к такому виду):

$$y' = a(x)y + b(x)$$

Приведу алгоритм решения таких тасок:

- а) Решить соответствующее однородное линейное уравнение  $y' = a(x)y$ :

$$y = C \cdot G(x)$$

- б) Решить исходное уравнение, полагая его решение в виде  $y(x) = C(x) \cdot G(x)$ ,  $G(x)$  из пункта а.

$$C(x) = \int \frac{b(x)}{G(x)} dx$$

(а)  $y = x(y' - x \cos(x))$

$$y' = \frac{y + x^2 \cos(x)}{x} \rightarrow y = x \sin(x) + Cx$$

(b)  $xy' + (x+1)y = 3x^2 e^{-x}$

$$y' = 3xe^{-x} - y \frac{x+1}{x} \rightarrow y = \frac{e^{-x}(x^3 + C)}{x}$$

(c)  $2x(x^2 + y)dx = dy$

$$y' = 2x^3 + 2xy \rightarrow y = Ce^{x^2} - x^2 - 1$$

(d)  $(x + y^2)dy = ydx$

Замена  $y = x, x = y$



$$y' = \frac{y}{x} + x \rightarrow x = y^2 + Cy$$

(e)  $(2e^y - x)y' = 1$

Замена  $y = x, x = y$



$$y' = 2e^x - y \rightarrow y = \ln \left( \frac{1}{2} (x \pm \sqrt{C + x^2}) \right)$$

(f)  $y' = \frac{y}{3x - y^2}$

Замена  $y = x, x = y$



$$y' = \frac{3y}{x} - x \rightarrow x = y^2 + Cy^3$$

## Задача 2

**Step 1** Если  $x_1(t)$  и  $x_2(t)$  - решения  $\dot{x} = a(t)x + b(t)$ , то  $x_2(t) - x_1(t)$  решение  $\dot{x} = a(t)x$

**Step 2** Все решение  $\dot{x} = a(t)x$  имеют вид  $x(t) = C(x_2(t) - x_1(t))$

**Step 3** Все решения  $\dot{x} = a(t)x + b(t)$  имеют вид  $x(t) = x_1(t) + C(x_2(t) - x_1(t))$

**Step 4** По заданным  $x_0, t_0$  найти  $C$  из пункта 3

## Задача 3

$$x(t) = Ce^{\lambda t} \quad \dot{x} = C\lambda e^{\lambda t} \quad \ddot{x} = C\lambda^2 e^{\lambda t}$$

(a)  $\dot{x} - 4x = 0$

$$C\lambda^2 e^{\lambda t} - 4Ce^{\lambda t} = 0 \rightarrow Ce^{\lambda t}(\lambda^2 - 4) = 0 \rightarrow \lambda = \pm 2 \rightarrow x(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}$$

(b)  $\dot{x} - 5\dot{x} + 6x = 0$

$$C\lambda^2 e^{\lambda t} - 5C\lambda e^{\lambda t} + 6Ce^{\lambda t} = 0 \rightarrow Ce^{\lambda t}(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0 \rightarrow \lambda = 2, \lambda = 3 \rightarrow x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$$

(c)  $\dot{x} + 4x = 0$

$$C\lambda^2 e^{\lambda t} + 4Ce^{\lambda t} = 0 \rightarrow Ce^{\lambda t}(\lambda^2 + 4) = 0 \rightarrow x(t) = C_1 e^{2it} + C_2 e^{-2it}$$

$$C_1 = C_2 = k/2 \rightarrow x(t) = k \cos(2t)$$

$$C_1 = k/2i, C_2 = -k/2i \rightarrow x(t) = k \sin(2t)$$