

理论计算机科学导引

电子化讲义

Huijiao

2026 年 8 月 4 日

目录

第 1 讲 引子	1
1.1 二进制串与编码	1
1.2 可数集合	3
1.3 问题比程序多	4

第 1 讲 引子

理论计算机科学经常把两个层面分开讨论：函数（function）描述要计算什么，是问题的规格；程序（program）描述如何计算，是规格的一种实现。从函数到程序，就是把抽象的东西具体化。本讲先用二进制串形式化“描述”，再比较函数与程序在数量上的差异。

全文约定

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}.$$

1.1 二进制串与编码

定义 1.1 (二进制串). 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 定义

$$\Sigma^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in \Sigma\}.$$

特别地, $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$, 其中 ε 表示空串。记

$$\Sigma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Sigma^n, \quad \Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}.$$

对 $x \in \Sigma^n$, 记其长度为 $|x| = n$ 。

串联记为 xy 。对 $x, y \in \Sigma^*$, 定义

$$x \preceq y \iff \exists z \in \Sigma^*, y = xz, \quad x \prec y \iff x \preceq y \text{ 且 } x \neq y.$$

分别称 x 是 y 的前缀和真前缀。

定义 1.2 (编码). 集合 A 上的一个（二进制）编码是单射

$$E : A \longrightarrow \Sigma^*.$$

这里，单射是指：对任意 $x, y \in A$, 若 $E(x) = E(y)$, 则 $x = y$ 。

例 1.1. 令 $b(n)$ 为自然数 n 的标准二进制表示，并尝试用

$$P(a, b) = b(a)b(b)$$

编码 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 。这个映射不是单射。例如

$$P(1, 6) = 1\ 110 = 1110 = 11\ 10 = P(3, 2).$$

问题在于直接串联后无法确定两个分量的分界位置。因此我们要考虑一种更优秀的编码，来避免这个问题。

定义 1.3 (无前缀编码). 编码 $E : A \rightarrow \Sigma^+$ 称为无前缀的 (prefix-free), 如果

$$\forall x, y \in A, \quad x \neq y \implies E(x) \not\leq E(y).$$

记 A^* 为由 A 中元素组成的所有有限序列的集合, 其空序列仍记为 ε 。对映射 $E : A \rightarrow \Sigma^*$, 定义其逐项串联扩张

$$\overline{E}(a_1, \dots, a_n) = \begin{cases} E(a_1) \cdots E(a_n), & n > 0, \\ \varepsilon, & n = 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

这个定义很自然, 我们要说明这个自然定义确实是个单射。

引理 1.1. 若 $E : A \rightarrow \Sigma^+$ 是无前缀编码, 则由 式 (1.1) 定义的 $\overline{E} : A^* \rightarrow \Sigma^*$ 是单射。

证明. 假设两组序列的编码相同:

$$\overline{E}(a_1, \dots, a_p) = \overline{E}(b_1, \dots, b_q).$$

码字非空, 所以 $p = 0 \iff q = 0$ 。若 $p, q > 0$, 则

$$E(a_1) \preceq E(b_1) \quad \text{或} \quad E(b_1) \preceq E(a_1).$$

因此

$$E(a_1) = E(b_1) \implies a_1 = b_1.$$

两边消去首个码字并归纳, 得到

$$p = q, \quad a_i = b_i \quad (1 \leq i \leq p).$$

故 $\overline{E}$ 是单射。 □

定理 1.1 (编码的无前缀化). 若存在编码 $E : A \rightarrow \Sigma^*$, 则存在无前缀编码 $E_{\text{pf}} : A \rightarrow \Sigma^+$, 并且对每个 $a \in A$ 都有

$$|E_{\text{pf}}(a)| = 2|E(a)| + 2.$$

证明. 定义 $h(0) = 00$ 、 $h(1) = 11$ ，并令 h 逐位作用于二进制串。取

$$E_{\text{pf}}(a) = h(E(a))01, \quad |E_{\text{pf}}(a)| = 2|E(a)| + 2.$$

按两个比特分组时，正文块属于 $\{00, 11\}$ ，终止块为 01 。若 $E_{\text{pf}}(a) \preceq E_{\text{pf}}(b)$ ，则短串的终止块必须与长串的某一块对齐。正文中没有 01 ，故它只能与长串的终止块对齐。于是

$$E_{\text{pf}}(a) = E_{\text{pf}}(b) \implies E(a) = E(b) \implies a = b.$$

因此 E_{pf} 无前缀。 □

思考题. 能否把长度开销改进到 $|E(a)| + O(\log|E(a)|)$?

解答. 可以。令

$$n = |E(a)|, \quad \ell = |\text{bin}(n+1)|,$$

并定义

$$L(n) = 1^\ell 0 \text{ bin}(n+1), \quad E'(a) = L(n)E(a).$$

解码过程为

$$1^\ell 0 \longrightarrow \ell \longrightarrow \text{bin}(n+1) \longrightarrow n \longrightarrow E(a).$$

其中最后一步恰好读取 n 位。并且

$$|E'(a)| = n + 2\lfloor \log_2(n+1) \rfloor + 3 = n + O(\log(n+1)).$$

$L(n)$ 自定界；当 n 相同时， $E'(a)$ 等长。因此该构造无前缀。 □

推论 1.1. 若存在编码 $E: A \rightarrow \Sigma^*$ ，则存在编码 $F: A^* \rightarrow \Sigma^*$ 。

证明. 先用定理 1.1 把 E 无前缀化，再用引理 1.1 逐项串联即可。 □

1.2 可数集合

定义 1.4 (至多可数). 集合 A 至多可数，是指

$$\exists \text{ 单射 } f: A \hookrightarrow \mathbb{N}.$$

等价地， A 有限或 $A \cong \mathbb{N}$ 。当 $A \neq \emptyset$ 时，还等价于

$$\exists \text{ 满射 } g: \mathbb{N} \twoheadrightarrow A.$$

注. 非空条件只用于满射表述，因为不存在 $\mathbb{N} \rightarrow \emptyset$ 。有些文献把本文的“至多可数”简称为“可数”。

引理 1.2. Σ^* 是可数无限集。

证明. 对 $x \in \Sigma^n$, 令 $\text{val}_2(x)$ 为其二进制数值 (允许前导零), 并定义

$$\nu(x) = 2^n - 1 + \text{val}_2(x).$$

于是

$$\nu(\Sigma^n) = \{2^n - 1, \dots, 2^{n+1} - 2\}, \quad \mathbb{N} = \bigsqcup_{n \geq 0} \nu(\Sigma^n).$$

故 $\nu: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 是双射。 □

定理 1.2 (可编码性与可数性). 集合 A 至多可数, 当且仅当存在编码 $E: A \rightarrow \Sigma^*$ 。

证明. 由引理 1.2, 存在双射 $\nu: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 。

若 $E: A \hookrightarrow \Sigma^*$, 则

$$\nu \circ E: A \hookrightarrow \mathbb{N}.$$

反之, 若 $f: A \hookrightarrow \mathbb{N}$, 令 $c(n) = 1^n 0$, 则

$$c \circ f: A \hookrightarrow \Sigma^*.$$

□

1.3 问题比程序多

因为我们已经有编码了, 所以我们可以把问题公理化了。

定义 1.5 (问题). 在本讲义中, 一个 (计算) 问题是函数

$$f: \Sigma^* \longrightarrow \Sigma^*.$$

所有问题构成的集合记为

$$\mathcal{P} = (\Sigma^*)^{\Sigma^*}.$$

定理 1.3. 问题集合 $\mathcal{P}$ 不可数。

证明 (Cantor 对角化). 由引理 1.2, 可写

$$\Sigma^* = \{s_0, s_1, s_2, \dots\}.$$

反设 $\mathcal{P} = \{f_0, f_1, f_2, \dots\}$ 。定义

$$g(s_i) = \begin{cases} 0, & f_i(s_i) \neq 0, \\ 1, & f_i(s_i) = 0. \end{cases}$$

因而

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad g(s_i) \neq f_i(s_i) \implies g \neq f_i.$$

于是 $g \in \mathcal{P}$ 却不在上述枚举中, 矛盾。 □