

# Series de Números Reales.

- Series de términos cualesquiera. Convergencia absoluta y condicional  
pág 126 sección 4.7

## Vimos:

### 1º Clase de Series

- Definición de Convergencia:  
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \leftrightarrow \sum_{i=1}^{\infty} a_i$  converge
- Propiedades de las series.
- Criterio de la Divergencia:  
 $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i \neq 0 \rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} a_i$  diverge

Aquí los  $a_i$  pueden tomar cualquier valor (cualquier *signo*).

### 2º Clase de Series

- Criterio de la Integral.
- Criterio de Comparación directa.
- Criterio de Comparación en el límite.
- Criterio de la raíz.
- Criterio del cociente.
- Criterio de Leibniz.

Aquí los  $a_i$  deben ser *positivos*.  
(Series de términos positivos)

← Aplicable sólo a series *alternadas*.

### 3º Clase de Series

- ¿Qué sucede con los Criterios de la 2º Clase cuando en las Series aparecen términos *negativos*?
- ¿Se pueden distinguir distintos *tipos* de convergencia en una Serie?

- ¿Qué sucede con los Criterios de la 2ª Clase cuando en las Series aparecen términos *negativos*?:

a) Algunos términos negativos:

Si una Serie tiene un número finito de términos negativos, podemos *sustraerlos* y analizar la convergencia de la Serie que queda (serie de términos positivos) ya que, por propiedad de las Series, la convergencia no se altera si se suprimen o agregan un número finito de términos a una Serie:

Si  $\sum_{i=N}^{\infty} a_i$  converge (diverge), entonces:  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$  converge (diverge).

b) Todos los términos negativos:

Si una Serie tiene todos los términos negativos,  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ ,  $a_i < 0$ , podemos definir  $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ ,  $b_i = -a_i$  y analizar su convergencia.

Por propiedad de las Series, la convergencia de  $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$  dictará la convergencia de  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ :

Si  $\sum_{i=1}^{\infty} (-a_i)$  converge (diverge), entonces:  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$  converge (diverge).

c) Infinitos términos negativos mezclados con infinitos términos positivos (se dice *Serie de términos cualesquiera*):

Ejemplos:

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n) \quad , \quad 2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n^2}$$

Tienen *grupos* de términos con igual signo..

$$3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^5} \quad , \quad 4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

Cambian signo en forma *alternada*..

$$1) \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n)$$

Usaremos el Criterio de la Divergencia:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  diverge.

Aquí  $a_n = \cos(n)$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n) \nexists (\neq 0) \rightarrow \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n) \text{ diverge}}$

... en los ejemplos **2)**, **3)**, y **4)** el Criterio de la Divergencia no es aplicable..

### Teorema de Convergencia absoluta

Dada  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  Serie de términos cualesquiera.

Si  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  converge  $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge en *forma absoluta*.

\* Si  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  diverge pero  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge  $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge en *forma condicional*.

Analicemos, con éste Teorema, los ejemplos **2)**, **3)**, y **4)**:

Ejemplo 2): Analizar la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n)}{n^2}$

$$\text{Aquí } a_n = \frac{\text{sen}(n)}{n^2} \quad \therefore \quad |a_n| = \left| \frac{\text{sen}(n)}{n^2} \right| = \frac{|\text{sen}(n)|}{|n^2|} = \frac{|\text{sen}(n)|}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\text{sen}(n)|}{n^2}$$

Criterio de Comparación Directa: Sean  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  donde  $0 \leq a_n \leq b_n$

- Si  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  converge  $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge.
- Si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  diverge  $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  diverge.

$$-1 \leq \text{sen}(n) \leq 1$$

$$0 \leq |\text{sen}(n)| \leq 1$$

$$0 \leq \frac{|\text{sen}(n)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \longleftarrow \quad \text{Si } b_n = \frac{1}{n^2}, \text{ sabemos que } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ converge pues es Serie p, con } p > 1.$$

Como  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  converge, por el Criterio de Comparación Directa:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\text{sen}(n)|}{n^2}$  converge.

Como  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\text{sen}(n)|}{n^2}$  converge, por Teorema de Convergencia absoluta:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{sen}(n)}{n^2}$  converge en forma absoluta.

Ejemplo 3): Analizar la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^5}$

Es una Serie alternada, pero antes de aplicar el Cr. de Leibniz, aplicaremos el Teorema de Convergencia absoluta:

$$\text{Aquí } a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^5} \therefore |a_n| = \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^5} \right| = \frac{|(-1)^{n-1}|}{|n^5|} = \frac{1}{n^5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5} \quad \leftarrow \text{Esta es una Serie convergente pues es Serie p, con } p = 5 > 1.$$

Como  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}$  converge, por Teorema de Convergencia absoluta:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^5} \text{ converge en forma absoluta.}}$$

( Observar que ya no hace falta analizar con el Criterio de Leibniz.. )

Ejemplo 4): Analizar la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  ← Otra vez una Serie alternada. **Antes** de aplicar el Cr. de Leibniz, aplicaremos el Teorema de Convergencia absoluta:

Aquí  $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \therefore |a_n| = \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \frac{|(-1)^{n-1}|}{|n|} = \frac{1}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  ← Esta es una Serie divergente pues es Serie p, con  $p = 1$ .

Como  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  diverge, el Teorema de Convergencia absoluta no es aplicable.

( Sin embargo, el análisis de arriba sirve ya que si  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  llega a ser convergente, el estudio de arriba me dice qué tipo de convergencia tiene la Serie: convergencia *condicional*).

Ahora sí, analizamos la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  con el Criterio de Leibniz:

Sea: 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

Aquí  $b_n = \frac{1}{n}$

•  $n + 1 \geq n, \quad \forall n \geq 1.$

$\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1} \quad \therefore \quad b_n = \frac{1}{n} \geq b_{n+1} = \frac{1}{n+1}, \quad \text{la sucesión } \left\{b_n = \frac{1}{n}\right\} \text{ es decreciente.}$

•  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$

Por el Criterio de Leibniz,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  converge.

Como  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$  converge pero  $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right|$  diverge:

Criterio de Leibniz: Sea la serie alternada  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n, b_n > 0.$

- Si  $\{b_n\}$  es decreciente:  $b_n \geq b_{n+1}$
- Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

Entonces:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$  converge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ converge en forma condicional.}$$



### Resumiendo:

Dada una Serie de términos cualesquiera (Serie donde aparecen infinitos términos negativos mezclados con infinitos términos positivos), para analizar la convergencia conviene:

1. Intentar aplicar el Criterio de la Divergencia a la Serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ :
  - a) Si el Criterio es aplicable: La Serie  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  *diverge*.
  - b) Si el Criterio no es aplicable: ir al paso 2.
2. Estudiar la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  :
  - a) Si  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  converge: la Serie original  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  *converge en forma absoluta*.
  - b) Si  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  diverge: estudiar la convergencia de  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  (Cr. de Leibniz si es alternada)
    - \*) Si  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge:  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  *converge en forma condicional*.

Nota: Para el caso 2.b) sólo consideraremos Series Alternadas.

## En el Módulo:

En una Serie de términos cualesquiera (series donde los términos tienen cualquier signo), si la serie es convergente, la convergencia puede darse de 2 formas distintas:

**Convergencia absoluta:** converge  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  y también  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

**Convergencia Condicional:** converge  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  pero diverge  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$

En la pág 126 se dan tanto las definiciones de ambos tipos de convergencia como el Teorema de Convergencia Absoluta (con 1 ejemplo).

La ejercitación de éste tema está en el ejercicio 10 de la sección **4.8**.

Como material adicional, adjuntamos 3 ejercicios resueltos (uno por cada caso: divergencia, convergencia absoluta y convergencia condicional): 10ii), 10iii) y 10iv) de la sección **4.8**.

## Fin del capítulo 4.

→ Próxima Clase: secciones **5.1** y **5.2**.