LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELĘGNIARSTWO Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichon

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

DEZYNFEKCJA MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH POWIERZCHNI

Nr procedury:	01/2026
Wersja:	1.0
Data:	07.06.2026
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ujednolicenie zasad i określenie sposobu postępowania w zakresie dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych w placówce, w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura dotyczy zasad dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych, takich jak: fotele zabiegowe, fotele stomatologiczne, sprzęt medyczny, pulpity, parapety, blaty, klamki, szczeliny i inne miejsca trudno dostępne w placówce.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wdrożenie, nadzór oraz prawidłowe stosowanie procedury odpowiada **lekarz (w praktykach stomatologicznych), kierownik zakładu** lub wyznaczony i przeszkolony pracownik.
2. Za bezwzględne przestrzeganie i stosowanie procedury w ramach bieżących obowiązków odpowiada **każdy wyznaczony pracownik**.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków i sprzętu:

- Gotowe do użycia preparaty dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania (w płynie lub spreju).

- Gotowe chusteczki nasączone preparatem dezynfekcyjnym.
- Czyste gaziki oraz suche ściereczki.
- Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki ochronne).

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

Należy stosować preparaty gotowe do użycia o szerokim spektrum działania. Szczegółowe informacje nt. produktów znajdują się w ich ulotkach informacyjnych.

1. **Założenie rękawiczek ochronnych:** Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy założyć odpowiednie rękawiczki ochronne.
2. **Zastosowanie preparatu w spreju/płynie:**
    - Nanieść preparat na gazik i przetrzeć powierzchnię, *LUB*
    - Nanieść bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię i przetrzeć suchą ściereczką, *LUB*
    - W przypadku miejsc trudno dostępnych - spryskać dezynfekowaną powierzchnię z odległości ok. 30 cm.
3. **Zastosowanie chusteczek do dezynfekcji:**
    - Wyjąć z pojemnika dozującego chusteczkę.
    - Przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię.
4. **Pozostawienie do wyschnięcia:** Niezależnie od wybranej metody (sprej, przecieranie czy chusteczki) - pozostawić zdezynfekowaną powierzchnię do całkowitego wyschnięcia, zgodnie z czasem działania przewidzianym przez producenta preparatu.

Uwaga:

Zawsze należy zapoznać się z informacją producenta o stosowanym preparacie do dezynfekcji oraz stosować go zgodnie z przeznaczeniem.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja stanowiskowa: Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni
2. Ulotki informacyjne i karty charakterystyki stosowanych preparatów dezynfekcyjnych