LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichoń

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

PROCEDURA HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK

Nr procedury:	02/2026
Wersja:	1.0
Data:	07.06.2026
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ujednolicenie zasad postępowania podczas kolejnych etapów higienicznej dezynfekcji rąk w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom placówki.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje każdego pracownika placówki. Higieniczną dezynfekcję rąk należy bezwzględnie stosować w następujących sytuacjach:

1. przed przystąpieniem do pracy,
2. w każdym przypadku kontaminacji,
3. po zmianie rękawiczek,
4. przed i po każdym zabiegu,
5. po zakończeniu pracy.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wdrożenie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem odpowiada **lekarz (praktyki indywidualne), kierownik zakładu lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu pracownik**.

2. Za prawidłowe stosowanie procedury w codziennej pracy odpowiada **każdy pracownik** placówki.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków i wymogów:

- Gotowe do użycia preparaty antyseptyczne do dezynfekcji rąk, pobierane z dozownika łokciowego (informacja o preparatach stosowanych w placówce dołączona do procedury).
- Rękawice ochronne (niezbędne podczas procedur o zwiększonym ryzyku, np. zabiegi medyczne, mycie narzędzi).

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Zasady ogólne i przygotowanie:** W miejscu pracy nie należy nosić biżuterii, szczególnie zegarków, pierścionków i obrączek. Paznokcie powinny być czyste i krótko obcięte.
2. **Mycie wstępne (opcjonalne):** W razie potrzeby (np. przy widocznych zabrudzeniach, z potrzeb estetycznych) najpierw umyj ręce i osusz je.
3. **Pobranie preparatu:** Na suche dłonie pobierz preparat antyseptyczny z dozownika łokciowego w ilości nie mniejszej niż 3 ml (wystarczającej, aby wypełnić zagłębienie dłoni).
4. **Wcieranie:** Wcieraj preparat dokładnie w całe dłonie przez czas nie krótszy niż 30 sekund. Upewnij się, że przez cały czas wcierania ręce są wilgotne.
5. **Ochrona dodatkowa:** W czasie wykonywania procedur związanych ze zwiększonym ryzykiem (np. procedury medyczne w gabinecie stomatologicznym, zabiegowym, przy myciu narzędzi) zastosuj rękawice ochronne tuż po wykonaniu dezynfekcji dłoni.

Uwaga:

Szczegółowe informacje na temat stosowanych produktów znajdują się w ulotkach informacyjnych danych preparatów dostępnych w placówce.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja stanowiskowa higienicznej dezynfekcji rąk
2. Ulotki informacyjne stosowanych preparatów dezynfekcyjnych