

Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Output Program (Python)	Output Program (RStudio)	Status	Catatan
(Normal: $\alpha = 10\%$)	p_hat = 0.4 n = 100 alpha = 0.10	Interval Kepercayaan 90% $0.3194 < p < 0.4806$	Interval Kepercayaan 90% $0.3194 < p < 0.4807$	Interval Kepercayaan 90% $0.3194 < p < 0.4808$	Sukses	Menguji perhitungan interval dengan $z = 1,645$ ($\alpha = 10\%$) dan format 4 desimal.
(Normal: $\alpha = 5\%$)	p_hat = 0.6 n = 150 alpha = 0.05	Interval Kepercayaan 95% $0.5216 < p < 0.6784$	Interval Kepercayaan 95% $0.5216 < p < 0.6785$	Interval Kepercayaan 95% $0.5216 < p < 0.6786$	Sukses	Menguji perhitungan interval dengan $z = 1,96$ ($\alpha = 5\%$) untuk proporsi sampel berbeda.
(Tidak Valid: p_hat > 1)	p_hat = 1.2 n = 100 alpha = 0.10	Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.	Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.	Error: Proporsi harus berada antara 0 dan 1.	Sukses	Menguji validasi batas proporsi agar program tidak menghitung interval untuk nilai p_hat di luar rentang 0–1.