

Identification du prescripteur

Professeur Yoram BOUHNİK
Service de Gastroentérologie, MICI &
Assistance Nutritive
Hôpital Beaujon
(n° de F.I.N.E.S.S : 920100039)
100 bld Général Leclerc 92110 Clichy
Tél : 01 40 87 56 30 Fax : 01 40 87 45 74

Identification du malade

Mr PINHEIRO DE ANDRADE
Evaristo

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

MOVIPREP pdre pour solution buvable en sachet
2 sachets

La veille au soir de l'examen : une diète hydrique liquide et sans résidu peut être conseillée*. Aucune nourriture solide ne doit être ingérée à compter du début de la préparation jusqu'à la fin de l'examen.

- 18 H – 19 H : Boire **1 L** de **MOVIPREP®**
- 19 H – 20 H : Boire au **minimum 0,5 L de liquide clair*** (et plus si souhaité)

Ne pas manger à partir de minuit

- 4h-5h du matin : Boire **1 L** de **MOVIPREP®**
- 5h jusqu'à 5h 30 : Boire **au minimum 0,5 L de liquide clair** (et plus si souhaité)

A jeun ensuite

* Liquide clair : eau, bouillon clair, jus de fruit sans pulpe, soda, thé/café sans lait, tisane...
Le dernier verre de liquide clair doit être bu au moins 2 heures avant l'examen.

Clichy,
le 22 décembre 2023

Professeur Yoram BOUHNİK

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

Identification du prescripteur

Professeur Yoram BOUHNİK
Service de Gastroentérologie, MICI &
Assistance Nutritive
Hôpital Beaujon
(n° de F.I.N.E.S.S : 920100039)
100 bld Général Leclerc 92110 Clichy
Tél : 01 40 87 56 30 Fax : 01 40 87 45 74

Identification du malade

Mr PINHEIRO DE ANDRADE
Evaristo

DUPLICATA

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

MOVIPREP pdre pour solution buvable en sachet
2 sachets

La veille au soir de l'examen : une diète hydrique liquide et sans résidu peut être conseillée*. Aucune nourriture solide ne doit être ingérée à compter du début de la préparation jusqu'à la fin de l'examen.

- 18 H – 19 H : Boire **1 L** de **MOVIPREP®**
- 19 H – 20 H : Boire au **minimum 0,5 L de liquide clair*** (et plus si souhaité)

Ne pas manger à partir de minuit

- 4h-5h du matin : Boire **1 L** de **MOVIPREP®**
- 5h jusqu'à 5h 30 : Boire **au minimum 0,5 L de liquide clair** (et plus si souhaité)

A jeun ensuite

* Liquide clair : eau, bouillon clair, jus de fruit sans pulpe, soda, thé/café sans lait, tisane...
Le dernier verre de liquide clair doit être bu au moins 2 heures avant l'examen.

Clichy,
le 22 décembre 2023

Professeur Yoram BOUHNİK

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)