

Kristali

$$\alpha_{M,i} = \sum_{j \neq i} \frac{Z_j}{r_{ij}/a} \quad (\text{Madelungova konstanta})$$

$$V_{C,i} = \frac{e_0 \alpha_{M,i}}{4\pi \varepsilon_0 a}$$

$$W_{C,i} = Z_i e_0 V_{C,i}$$

$$V = \frac{N}{2} V_{C,i} + V_{\text{odbb,k}} + \frac{N}{2} W_i - \frac{N}{2} W_a$$

Blochov teorem

$\psi = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u(\mathbf{r})$, kjer ima $u(\mathbf{r})$ enako periodo kot $V(\mathbf{r})$, torej $u(\mathbf{r} + \mathbf{r}_0) = u(\mathbf{r}) \implies \psi(\mathbf{r} + \mathbf{r}_0) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_0} \psi(\mathbf{r})$.

Kronig-Penny-ev model kovinske vezi

$$V(x) = \begin{cases} 0; & 0 \leq x < a \\ V_0; & -b \leq x < 0 \end{cases} \quad \text{in } V(x+a+b) = V(x)$$

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}; & 0 \leq x < a \\ Ce^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}; & -b \leq x < 0 \end{cases} \quad \text{in } \psi(x+a+b) = \psi(x)$$

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad \kappa = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$$

S približkom $b \rightarrow 0, V_0 \rightarrow \infty, P = \frac{\kappa^2 ab}{2} = \textit{konst.}$ dobimo:

$$P \frac{\sin(ka)}{ka} + \cos(ka) = \cos(kla)$$

$$k_l = \frac{2\pi l}{Na}, \quad l = 1, 2, \dots$$

Valenčni pas je najvišji energijski pas v katerem so pri $T \rightarrow 0$ energijski nivoji še zasedeni z elektroni.

Prevodni pas je najnižji energijski pas v katerem so pri $T \rightarrow 0$ vsi energijski nivoji nezasedeni.

$$P(\text{preskok med pasoma}) = \exp \left\{ -\frac{E_g}{k_B T} \right\}$$

Izolator: valenčni pas popolnoma zapolnjen, prevodni pas prazen. $E_g \approx 10$ eV.

Prevodnik: valenčni in prevodni pas sta enaka.

Polprevodnik: tudi pri nizkih T lahko elektroni preskočijo v prevodni pas. $E_g \approx 1$ eV.

Fermijeva energija

$$F_{Fe}(E) = \left(\exp \left\{ \frac{E-\mu}{k_B T} \right\} + 1 \right)^{-1}$$

$$\rho_E = \frac{dg}{dE} = 4\pi(2m)^{\frac{3}{2}} \frac{V}{h^3} \sqrt{E}$$

$$N_{Fe} = \int_0^\infty \rho_E F_{Fe} dE \approx \int_0^{E_F} \rho_E dE$$

$$E_F = \mu(T \rightarrow 0) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3N}{8\pi V} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{mv_F^2}{2}$$

Drudejev model prevodnosti

$$p(t) = (p_0 - qE\tau)e^{-t/\tau} + eE\tau$$

$$j = \frac{d\hat{e}}{Sdt} = ne_0 \langle v \rangle$$

$$\langle v \rangle = \frac{p(t \rightarrow \infty)}{m} = \frac{eE\tau}{m} = \beta E$$

$$\sigma_0 = \frac{j}{E} = \frac{ne_0^2 \tau}{m}$$

$$\tau = \frac{a}{\langle v \rangle} \approx a \sqrt{\frac{m}{3k_B T}}$$

$$\text{Izmenični tok: } \sigma = \frac{\sigma_0}{\sqrt{1+\omega^2 \tau^2}} e^{i \arctan(\omega \tau)}$$

Efektivna masa

$$m^* = \hbar^2 / \frac{d^2 E}{dk^2}$$

$$E = \frac{p^2}{2m^*} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

Polprevodniki

Definiramo $E = 0$ na vrhu valenčnega pasu.

Elektroni v prevodnem pasu ($E - E_f \gg k_B T$):

$$\rho_e \propto \sqrt{E - E_g}$$

$$F_e = e^{-(E-E_F)/k_B T}$$

$$n_e = \frac{N_e}{V} = 2 \left(\frac{2\pi m^* k_B T}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-(E_g - E_F)/k_B T}$$

$$v_e = \beta_e E$$

Vrzeli v valenčnem pasu ($E - E_f \gg k_B T$):

$$\rho_v \propto \sqrt{-E}$$

$$F_v = 1 - F_e = e^{-(E_F - E)/k_B T}$$

$$n_v = \frac{N_v}{V} = 2 \left(\frac{2\pi m^* k_B T}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-E_F/k_B T}$$

$$v_v = \beta_v E$$

$$n_e n_v \propto e^{-E_g/k_B T} \neq f(E_F)$$

$$\text{Čisti polprevodnik: } n_e = n_v \implies E_F = \frac{1}{2} E_g - \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_e^*}{m_v^*}$$

$$j = ne_0 v = j_e + j_v = \sigma E$$

$$\sigma = 2 \left(\frac{2\pi m^* k_B T}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} e_0 (\beta_e + \beta_v) e^{-E_g/2k_B T}$$

Dopirani polprevodniki

Akceptorji imajo en elektron manj kot čisti polprevodnik.

Donorji imajo en elektron več kot čisti polprevodnik.

$$n_{e_i} = n_{v_i} \implies n_e - n_D = n_v - n_A$$

$$\text{n-tip: } n_e \approx n_D$$

$$\text{p-tip: } n_v \approx n_A$$

p-n stik

$$U(x) = \begin{cases} -\frac{e_0 n_D}{2\varepsilon\varepsilon_0} (x - x_n)^2 + U_0; & 0 \leq x \leq x_n \\ \frac{e_0 n_A}{2\varepsilon\varepsilon_0} (x + x_p)^2; & -x_p \leq x \leq 0 \end{cases}$$

$$U_0 = \frac{e_0}{2\varepsilon\varepsilon_0} (n_D x_n^2 + n_A x_p^2)$$

$$x_n = \left[\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_0}{e_0 n_D \left(1 + \frac{n_D}{n_A}\right)} \right]^{1/2}, \quad x_p = \left[\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_0}{e_0 n_A \left(1 + \frac{n_A}{n_D}\right)} \right]^{1/2}$$

$$d = x_n + x_p = \left[\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_0}{e_0} \frac{n_A + n_D}{n_A n_D} \right]^{1/2} \quad (\text{depletirana plast})$$

$$U_0 = \frac{k_B T}{e_0} \ln \frac{n_e n_v}{n_{e_i} n_{v_i}} \quad (\text{kontaktna napetost})$$

$$d \propto \sqrt{U_b + U_0} \approx \sqrt{U_b}$$

$$I = I_0 (e^{e_0 U/k_B T} - 1)$$

$$C = \frac{de}{dU} = S \sqrt{\frac{\varepsilon\varepsilon_0 n_D e_0}{2(U_0 + U_b)}} \quad (n_a \gg n_d \implies d_n \gg d_p)$$

Fotodioda

$$I = I_0 (e^{e_0 U/k_B T} - 1) - I_f$$

$$I_f = \eta 2 \frac{dn_f}{dt} e_0$$

Tranzistor

$$I_c = \alpha I_e$$

$$I_b = (1 - \alpha) I_e$$

$$I_b \approx I_0 e^{e_0 U_{be}/k_B T}$$

$$I_c = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_0 e^{e_0 U_{be}/k_B T}$$

Jedra

$$\text{Rutherfordov eksperiment: } \frac{dN}{d\Omega} \propto \sin^{-4} \frac{\vartheta}{2}$$

$$r_j \sin \beta = n \lambda_b$$

$$r_j = r_0 A^{1/3}$$

$$\rho_e(r) = \frac{\rho_0}{e^{(r-r_j)/s} + 1}$$

$$M = Zm_p + Nm_n + E_v/c^2$$

$$E_v = -w_0 A + w_1 A^{2/3} + w_2 \frac{Z^2}{A^{1/3}} + w_3 \frac{(A-2Z)^2}{A} + w_4 \frac{\delta_{ZN}}{A^{3/4}}$$

$$\delta_{ZN} = \begin{cases} -1; & Z \text{ sod, } N \text{ sod} \\ 0; & \text{en sod en lih} \\ 1; & Z \text{ lih, } N \text{ lih} \end{cases}$$

Lupinski model jedra

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) + V(r)$$

$$V(r) = -V_0 / \left[e^{(r-r_j)/s} + 1 \right] \quad (\text{Saxon-Woodssov potencial})$$

$$\hat{H}_{ls} = -\eta \hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$$

$$\text{Nukleona imata } s = \frac{1}{2}.$$

Lupine pri Saxon-Woodsu z dovolj veliko η (nl_j):

- 1s_{1/2} \implies magično število 2
- 1p_{3/2}, 1p_{1/2} \implies magično število 8
- 1d_{5/2}, 2s_{1/2}, 1d_{3/2} \implies magično število 20
- 1f_{7/2} \implies magično število 28
- 2p_{3/2}, 1f_{5/2}, 1p_{1/2}, 1g_{9/2} \implies magično število 50
- 1g_{7/2}, 2d_{5/2}, 1d_{3/2}, 3s_{1/2}, 1h_{11/2} \implies magično število 82
- 1h_{9/2}, 2f_{7/2}, 2f_{5/2}, 3p_{3/2}, 3p_{1/2}, 1i_{13/2} \implies mš 126

Spin sodo-lihega (oz. liho-sodega) jedra je enak celotni vrtilni količini zadnjega neparnega nukleona.

Spin sodo-sodega jedra je 0.

Spin liho-lihega jedra ne moremo natančno določiti, možne so vse kombinacije VK zadnjih dveh nukleonov.

Parnost sodo-lihega (oz. liho-sodega) jedra je $(-1)^l$, kjer l pripada zadnjemu neparnemu nukleonu.

Parnost sodo-sodega jedra je +.

Parnost liho-lihega jedra je $(-1)^{l_p} (-1)^{l_n}$, kjer l_p, l_n pripadata zadnjima nukleonoma.

Jedrski razpadi in prehodi s sevanjem

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt = -\frac{dt}{\tau} = -\ln 2 \frac{dt}{t_{1/2}}$$

$$A = \left| \frac{dN}{dt} \right| = \lambda N$$

$$\frac{dN}{dt} = \sum_i \pm i \lambda_i N_i$$

Sevanje γ

$$\frac{1}{\tau} = \frac{\omega_{12}^3 |\mathbf{p}_{12}|^2}{3\pi \varepsilon_0 c^3 \hbar}$$

$$\omega_{12} = \frac{E_{12}}{\hbar}$$

$$\mathbf{p}_{12} = \int R_1^*(\mathbf{r}) \mathbf{p} R_2(\mathbf{r}) d^3 \mathbf{r}$$

$$\delta E \tau \approx \hbar$$

$$\Delta J = 0, \pm 1, \quad \Delta M_J = 0, \pm 1, \quad \text{parnost se mora spremeniti}$$

Prehod iz $J = 0$ v $J' = 0$ ni mogoč.

Obstajajo tudi električni in magnetni multipolni prehodi.

$$E_\gamma^{\text{emis}} = E_{12} \left(1 - \frac{E_{12}}{2m_j c^2} \right), \quad E_\gamma^{\text{abs}} = E_{12} \left(1 + \frac{E_{12}}{2m_j c^2} \right)$$

Razpad *α*
^A_ZX_N → ^{A-4}_{Z-2}Y_{N-2} + ⁴He₂
Q = (*M_Y* + *M_α* − *M_X*)*c*² < 0
T_α = −Q⁡/⁡1+m_α/m_Y

Razpad *β[−]*
^A_ZX_N → ^A_{Z+1}Y_{N-1} + *e[−]* + *ν_e*
Q = (*M_Y* + *M_e* − *M_X*)*c*² < 0
T_e^{max} = −Q⁡/⁡1+m_e/m_Y ≈ −*Q*

Razpad *β⁺*
^A_ZX_N → ^A_{Z-1}Y_{N+1} + *e⁺* + *ν_e*

Jedrske reakcije

σ =

N

r
S

j
v
t

N

j

{\displaystyle {\frac {N_{r}S}{j_{vt}N_{j}}}}

 (sipalni presek)

σ_r = *Σ_ρ* *σ_{rρ}*

d
σ

d
Ω

=

1

j

v
t

N

j

d

N

r

(
ϑ
)

d
Ω

=

b

sin
⁡
ϑ

|

d
b

d
ϑ

|

{\displaystyle {\frac {d\sigma }{d\Omega }}={\frac {1}{j_{vt}N_{j}}}{\frac {dN_{r}(\vartheta)}{d\Omega }}={\frac {b}{\sin \vartheta }}\left|{\frac {db}{d\vartheta }}\right|}

 (diferencialni sipalni presek)

P_r =

N

r

N

v

{\displaystyle {\frac {N_{r}}{N_{v}}}}

 = *n_j**σ**l*

Coulombsko sipanje:

d
σ

d
cos
⁡
ϑ

=
2
π

⎡

Z

1

Z

2

e

0

2

16
π

ε

0

T

⎤

2

1

sin

4

(
ϑ
/
2
)

{\displaystyle {\frac {d\sigma }{d\cos \vartheta }}=2\pi \left({\frac {Z_{1}Z_{2}e_{0}^{2}}{16\pi \varepsilon _{0}T}}\right)^{2}{\frac {1}{\sin ^{4}(\vartheta /2)}}}

Delci

Vsi delci imajo svoje antidelce z enako maso in spinom ter nasprotnimi ostalimi kvantnimi števili.

Leptoni

delec	masa	naboj [<i>e</i> ₀]	spin	generacija
elektron <i>e</i>	0,511 MeV/ <i>c</i> ²	−1	1⁄2	1.
mion <i>μ</i>	105 MeV/ <i>c</i> ²	−1	1⁄2	2.
tao <i>τ</i>	1,78 GeV/ <i>c</i> ²	−1	1⁄2	3.
<i>ν_e</i>	~ 0	0	1⁄2	1.
<i>ν_μ</i>	~ 0	0	1⁄2	2.
<i>ν_τ</i>	~ 0	0	1⁄2	3.

Kvarki

okus	masa	naboj [<i>e</i> ₀]	spin	generacija
up	2.2 MeV/ <i>c</i> ²	2⁄3	1⁄2	1., zgornji
down	4.7 MeV/ <i>c</i> ²	−<!-- − -->1⁄3	1⁄2	1., spodnji
charm	1.3 GeV/ <i>c</i> ²	2⁄3	1⁄2	2., zgornji
strange	96 MeV/ <i>c</i> ²	−<!-- − -->1⁄3	1⁄2	2., spodnji
top	170 GeV/ <i>c</i> ²	2⁄3	1⁄2	3., zgornji
bottom	4.2 GeV/ <i>c</i> ²	−<!-- − -->1⁄3	1⁄2	3., spodnji

Izospin: *i*(*u*,*d*) = 1⁄2, *i*₃(*u*) = 1⁄2, *i*₃(*d*) = −1⁄2, za ostale *i* = *i*₃ = 0.

Barionsko število: *B* = 1⁄3 za vse kvarke.

Čudnost: *S*(*s*) = −1, za ostale *S* = 0.

Čar: *C*(*c*) = 1, za ostale *C* = 0.

Dno: *B*(*b*) = −1, za ostale *B* = 0.

Vrh: *T*(*t*) = 1, za ostale *T* = 0.

Barva: R, G ali B, vsi kvarki lahko imajo poljubno.

Y = *S* + *C* + *B* + *T* + *B* (hipernaboj)

e

0

=

i

3

+

1
2

Y

{\displaystyle {\frac {e_{0}}{e_{0}}}=i_{3}+{\frac {1}{2}}Y}

Hadroni

Barioni so sestavljeni iz 3 kvarkov ali 3 antikvarkov, ki imajo različno barvo.

Mezoni so sestavljeni iz kvarka in antikvarka s konjugirano enako barvo.

Posredniki interakcij

delec	masa	naboj [<i>e</i> ₀]	spin
gluon	0	0	1
foton <i>γ</i>	0	0	1
<i>Z</i>	91.2 GeV/ <i>c</i> ²	0	1
<i>W</i>	80.4 GeV/ <i>c</i> ²	±1	1
<i>H</i>	125 GeV/ <i>c</i> ²	0	0

Gluonov je 8 vrst, vsi nosijo en barvni in en antibarvni naboj.

Interakcije

Posredujejo jih virtualni delci, ki lahko obstajajo le v skladu s Heisenebergovim načelom Δ*E*Δ*t* ≥ *h*.

Velikostni red dosega: λ*C* =

h
c

m

c

2

{\displaystyle \lambda C={\frac {hc}{mc^{2}}}}

M_{i→f} = ⟨*f*| *H*_{int}| *i*⟩ = ∏_{verteks} |*M*| (matrični element)
Fermijevo zlato pravilo: Γ_{*i*→*f*} =

2
π

h
¯

|

M

i
→
f

|

2

ρ
(
E
)
∝

|

M

i
→
f

|

2

{\displaystyle \Gamma _{i\rightarrow f}={\frac {2\pi }{\hbar }}|M_{i\rightarrow f}|^{2}\rho (E)\propto |M_{i\rightarrow f}|^{2}}

 (razpadna širina - verjetnost za razpad na časovno enoto)
τ_{i→f} =

1

Γ

i
→
f

{\displaystyle \tau _{i\rightarrow f}={\frac {1}{\Gamma _{i\rightarrow f}}}}

Γ_{*i*}^{tot} =

∑

f

Γ

i
→
f

{\displaystyle \Gamma _{i}^{\mathrm {tot} }=\sum _{f}\Gamma _{i\rightarrow f}}

Br(*i* → *f*) =

Γ

i
→
f

Γ

i
tot

{\displaystyle {\frac {\Gamma _{i\rightarrow f}}{\Gamma _{i}^{\mathrm {tot} }}}}}

 (razvejitevno razmerje)

d
σ

d
Ω

=

1

64

π

2

|

M

i
→
f

|

2

|

p

f

|

2

|

p

i

|

∝

|

M

i
→
f

|

2

{\displaystyle {\frac {d\sigma }{d\Omega }}={\frac {1}{64\pi ^{2}}}{\frac {|M_{i\rightarrow f}|^{2}}{E_{\mathrm {CM} }^{2}}}{\frac {|\mathbf {p} _{f}|^{2}}{|\mathbf {p} _{i}|}}}\propto |M_{i\rightarrow f}|^{2}}

Elektromagnetna interakcija

Deluje med nabitimi leptoni ali nabitimi kvarki.

Posrednik foton.

|*M*| ∝ *e* ∝ √*α_{EM}*

Močna interakcija

Deluje med kvarkom in antikvarkom ali med hadroni.

Posredniki gluoni (med kvarki) in mezoni (med npr. nukleoni).

|*M*| ∝ √*α_S*

Približek Yukawin potencial (med *q*, *q̄*): *V*(*r*) = −*V*₀

r

0

r

e

−
r

/

r

0

{\displaystyle V(r)=-V_{0}{\frac {r_{0}}{r}}e^{-r/r_{0}}}

Šibka interakcija

Nabita deluje med leptonom in pripadajočim nevtrinom ali med kvarkoma.

Nevtralna deluje med dvema fermionoma.

Posrednika *Z* in *W*[±].

|*M*| ∝ √*α_W*

|*M_{q1q2}*| ∝ √*α_W* *V_{q1q2}*

*V*_{CKM} =

[

V

u
d

V

u
s

V

u
b

V

c
d

V

c
s

V

c
b

V

t
d

V

t
s

V

t
b

]

=

{\displaystyle V_{\mathrm {CKM} }={\begin{bmatrix}V_{ud}&V_{us}&V_{ub}\\V_{cd}&V_{cs}&V_{cb}\\V_{td}&V_{ts}&V_{tb}\end{bmatrix}}=}

=

[

1
−

λ

2

/
2

−
λ

λ

A

λ

3

(
ρ
−
i
η
)

−
λ

1
−

λ

2

/
2

A

λ

2

A

λ

3

(
1
−
ρ
−
i
η
)

−
A

λ

2

1

]

{\displaystyle ={\begin{bmatrix}1-\lambda ^{2}/2&-\lambda &\lambda &A\lambda ^{3}(\rho -i\eta)\\-\lambda &1-\lambda ^{2}/2&A\lambda ^{2}&A\lambda ^{3}(1-\rho -i\eta)\\-\lambda &-A\lambda ^{2}&A\lambda ^{2}&1\end{bmatrix}}}

Ohranitveni zakoni

p^μ = (*E/c*,**p**) = *konst.* (invarianta *p^μp_μ*)

Naboj se ohranja pri vseh interakcijah.

Barionsko število se ohranja pri vseh interakcijah.

Leptonsko število se ohranja po generacijah pri vseh interakcijah.

Okus kvarka se ohranja pri vseh interakcijah, razen pri nabiti šibki interakciji.

Operator parnosti: *Ĥψ*(**r**) = *ψ*(−**r**), lastne vr. *P* = ±1.

Operator konjugacije naboja: *Ĉψ* = *ψ̄*, lastne vr. *C* = ±1.

Operator sučnosti: *Ŝ* = **Ŝ**

P
p

{\displaystyle {\hat {\mathbf {S} }}={\hat {\mathbf {S} }}{\frac {\mathbf {P} }{p}}}

, lastne vr. *Σ* = ±1⁄2.

Šibka interakcija krši ohranitev parnosti *Ĥ* in konjugirane parnosti *ĈĤ*.

Fizikalne konstante

R = 8 310

J

k
m
o
l
K

{\displaystyle {\frac {J}{\mathrm {mol} \cdot K}}}

N_A = 6,02 · 10²⁶

1

k
m
o
l

{\displaystyle {\frac {1}{\mathrm {mol} }}}

k_B =

R

N

A

=
1,38
⋅

10

−
23

J

K

{\displaystyle k_{B}={\frac {R}{N_{A}}}=1,38\cdot 10^{-23}{\frac {J}{K}}}

*e*₀ = 1,602 · 10^{−19} As

*ε*₀ = 8,85 · 10^{−12}

A
s

V
m

{\displaystyle {\frac {As}{Vm}}}

*μ*₀ = 4π · 10^{−7}

V
s

A
m

{\displaystyle {\frac {Vs}{Am}}}

*c*₀ = 3,0 · 10⁸

m

s

{\displaystyle {\frac {m}{s}}}

σ = 5,67 · 10^{−8}

W

m

2

K

4

{\displaystyle {\frac {W}{m^{2}K^{4}}}}

k_W = 2,90 · 10^{−3} m · K

u = 1,66 · 10^{−27} kg = 931,5

M
e
V

c

2

{\displaystyle {\frac {MeV}{c^{2}}}}

m_e = 9,1 · 10^{−31} kg = 0,511

M
e
V

c

2

{\displaystyle {\frac {MeV}{c^{2}}}}

m_p = 1,673 · 10^{−27} kg = 938,3

M
e
V

c

2

{\displaystyle {\frac {MeV}{c^{2}}}}

 = 1,00728*u*

m_n = 1,675 · 10^{−27} kg = 939,6

M
e
V

c

2

{\displaystyle {\frac {MeV}{c^{2}}}}

 = 1,00866*u*

h = 6,626 · 10^{−34} Js

hc = 1240 eV nm

r_B = 5,291 · 10^{−2} nm

*E*₀ = 13,6 eV

α_{EM} =

e

0

2

4
π

ε

0

h
c

=

1

137

{\displaystyle \alpha _{EM}={\frac {e_{0}^{2}}{4\pi \varepsilon _{0}hc}}={\frac {1}{137}}}

b = 100 fm²

*r*₀ ≈ 1,1 fm

*w*₀ = 15,6 MeV

*w*₁ = 17,3 MeV

*w*₂ = 0,7 MeV

*w*₃ = 23,3 MeV

*w*₄ = 33,5 MeV

|

V

C
K
M

|

=

⎡
0,97428

0,2253

0,00347

0,2252

0,97345

0,0410

0,00862

0,0403

0,999152

⎤

{\displaystyle |V_{\mathrm {CKM} }|= {\begin{bmatrix}0,97428&0,2253&0,00347\\0,2252&0,97345&0,0410\\0,00862&0,0403&0,999152\end{bmatrix}}}