

מבחן לדוגמה 4

24 שאלות




שאלה 1

על קוביית משחק בעלת שש פאות מסומנים המספרים השלמים מ-1 עד 6. איתי הטיל את קוביית המשחק 6 פעמים והכפיל את ששת המספרים שיצאו לו זה בזה. התוצאה הייתה 120. מה ניתן לדעת בוודאות על התוצאות של הטלות הקוביה?

- אם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעם אחת, גם התוצאה 5 יצאה בדיוק פעם אחת
- אם התוצאה 6 יצאה בדיוק פעם אחת, גם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעם אחת
- אם התוצאה 3 יצאה בדיוק פעם אחת, גם 2 יצאה בדיוק פעם אחת
- אם התוצאה 4 יצאה בדיוק פעם אחת, אז גם התוצאה 1 יצאה בדיוק פעם אחת

שאלה 2


רועי החליט להקים ערוץ YouTube, אליו הוא מקפיד להעלות סרטונים בתחומי עניין שונים. הגרף שלפניכם מתאר את הזמן שהשקיע רועי בהכנת סרטונים בכל שבוע, וכן את מספר הצפיות החדשות שהתווספו לסרטונים שהעלה. זמן העבודה נמדד בשעות ומוצג על הציר השמאלי ומספר הצפיות נמדד ביחידות ומוצג על הציר הימני. לדוגמא: בשבוע השלישי רועי עבד 18 שעות והתווספו לסרטוניו 195 צפיות חדשות. באיזה שבוע מספר השעות שהשקיע רועי היה גדול פי 1.5 ממספר השעות שהשקיע בשבוע שלפניו?



- שני
- שלישי
- רביעי
- חמישי

שאלה 3

כמה שעות בממוצע השקיע רועי בכל שבוע?



24

21

18

23

שאלה 4

על כל שעה שרועי עובד, הוא משלם 2 ש"ח על שימוש בתוכנת עריכה וצריכת חשמל. על כל צפייה חדשה, מרוויח רועי 0.2 ש"ח. באיזה שבוע הרוויח רועי הכי הרבה כסף?

שני

שלישי

חמישי

שישי

שאלה 5

רועי רשם לעצמו ארבע מסקנות בנוגע לצפיות החדשות שנוספו לסרטונים במהלך ששת השבועות, אך צדק רק באחת מהן. מבין המסקנות הבאות, מהי המסקנה הנכונה?

- א כמות הצפיות החדשות בשבוע השני והשלישי יחד קטנה מכמות הצפיות החדשות בשבוע החמישי
- ב כמות הצפיות החדשות בשבוע השני שווה לכמות הצפיות החדשות בשבוע הראשון והשלישי יחד
- ג כמות הצפיות החדשות בשבוע הראשון והשלישי יחד קטנה מכמות הצפיות החדשות בשבוע הרביעי
- ד כמות הצפיות החדשות בשבוע השני והשלישי יחד שווה לכמות הצפיות החדשות בשבוע החמישי

שאלה 6

תלמידי שכבה ו' הקימו דוכן עוגות על מנת לגייס כסף למסיבת הסיום. בארבעת הימים הראשונים הם מכרו בממוצע 14 עוגות ליום. בשלושת הימים הבאים נמכרו בממוצע 7 עוגות ביום. כמה עוגות נמכרו בממוצע ביום במהלך שבועת הימים?

- א 10
- ב 10.5
- ג 11
- ד 12

שאלה 7


a, b, c הם שלושה מספרים שלמים עוקבים. ידוע כי: c גדול ב-1 מ- b – b גדול ב-1 מ- a

באיזו מספר מתחלקת בוודאות המכפלה של שלושת המספרים? $a \times b \times c$

- א 4
- ב 6
- ג 8
- ד לא ניתן לקבוע בוודאות

שאלה 8

בילבי בנתה מגדל מקוביות זהות, כפי שמתואר בשרטוט. כל קוביה שאינה בקומה הראשונה של המגדל מונחת על קוביה אחרת. מהו הנפח של מגדל הקוביות, אם אורך הצלע של כל קוביה הוא 2 ס"מ? (נפח קוביה = אורך x רוחב x גובה)



- 72 א
- 88 ב
- 96 ג
- 112 ד

שאלה 9

בינואר 2025 מחירו של מגש פיצה אישי היה 32 ש"ח. לאור ירידה במכירות, החליטו בפברואר 2025 להוזיל את המחיר ב-25%. באוגוסט 2025, החליטו להעלות את המחיר ב-25%. בהנחה שלא חלו שינויים נוספים במחיר הפיצה, כמה עולה כעת מגש פיצה אישי?

- 30 א
- 32 ב
- 34 ג
- 28 ד

שאלה 10

במחשבון התקלקלו כל המקשים חוץ מהמקשים של פעולת הכפל, הספרות 4 ו-5 ומקש השוויון. איזה מן המספרים הבאים אי אפשר לקבל בעקבות סדרת פעולות במחשבון זה?

- א 64
- ב 80
- ג 85
- ד 100

שאלה 11

במרפסת של אילן ישנם 12 עציצים. בכל שבוע צומחים 2 או 3 עלים חדשים בכל עציץ. בשבוע מסוים צמחו 28 עלים חדשים בכל העציצים יחד. מהו מספר העציצים שגדלו בהם בדיוק 3 עלים חדשים?

- א 6
- ב 4
- ג 5
- ד 3

שאלה 12

במתמטיקה ניתן להמציא פעולות חדשות בין שני מספרים ולסמן אותן בסימונים שונים. לדוגמה, נסמן פעולה חדשה בסימון $\#$, ונגדיר אותה כך: $a\# = a \times a + 1$. כדי לחשב את $5\#$, נציב את 5 במקום a ונקבל: $5\# = 5 \times 5 + 1 = 26$. לכל מספר a הוגדרה הפעולה $\sim$ כך: $a \sim = \frac{a}{2} + 3$. סמנו את תוצאת הביטוי הבא: $6 \sim + 8 \sim - 2 \sim = ?$

- א 13
- ב 17
- ג 9
- ד 12

שאלה 13

בקונדיטוריית "עוגייה בריבוע" אופים 400 עוגיות ביום, בשלושה מילויים שונים (מילוי אחד בכל עוגייה): שוקולד, וניל או תות. 60% מהעוגיות הן במילוי שוקולד. 60% מהעוגיות שאינן במילוי שוקולד, הן במילוי תות והיתר במילוי וניל. כמה עוגיות במילוי וניל אופים בכל יום?

64

144

96

160

שאלה 14

ברציפי הרכבת בחיפה ממתנים הנוסעים להגעת הרכבת. $\frac{1}{3}$ מהאנשים ממתנים ברציף הצפוני והיתר ממתנים ברציף הדרומי. לאחר זמן מה, $\frac{1}{8}$ מהעומדים ברציף הדרומי, שהם 12 אנשים בדיוק, עלו על הרכבת. כמה אנשים בסך הכל המתו בשני רציפי הרכבת? (לפני עליית הנוסעים ברציף הדרומי).

72

96

136

144

שאלה 15

גילי שירטטה מעגל בחצר האחורית של בית הספר לטובת משחק. כאשר ילדים נוספים רצו להצטרף, נדרשה גילי לצייר מעגל חדש, כך ששטחו יגדל פי 25 ביחס לשטח המעגל הראשון. פי כמה צריכה גילי להגדיל את קוטר המעגל? תזכורת לשטח מעגל: $\pi \times R^2$

10

5

25

לא ניתן לדעת

שאלה 16

הארי, רון והרמיוני ישבו במסעדה בהוגסמיד. כל אחד מהם הזמין בתורו מנה אחרת: פאי, בירצפת וצ'יפס (לא בהכרח בסדר זה). ידוע כי: רון היה האחרון שהזמין מנה הרמיוני ורון לא הזמינו בירצפת המנה הראשונה שהוזמנה היא צ'יפס. מי מהחברים הזמין צ'יפס במסעדה?

- א הארי
- ב רון
- ג הרמיוני
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 17

חשבו את תוצאת התרגיל הבא: $(7\frac{2}{3} - 3\frac{1}{6}) \div (3\frac{1}{2} + \frac{1}{10}) =$

- א $\frac{1}{2}$
- ב $1\frac{1}{4}$
- ג $\frac{4}{5}$
- ד $1\frac{1}{3}$

שאלה 18

ירדן קנתה 12 חבילות של נחשי גומי. היא חילקה נחש גומי לכל תלמיד בכיתה והשתמשה ב- $7\frac{1}{2}$ חבילות, כך שנותרו 36 נחשי גומי. כמה נחשי גומי היו בכל אחת מהחבילות?

- א 16
- ב 6
- ג 12
- ד 8


שאלה 19

ליאת נסעה במשך 3 שעות במהירות משתנה, כך שעברה בסך הכל 210 ק"מ. המרחק שעברה בשעה השנייה גדול פי 2 מהמרחק בשעה הראשונה. המרחק שעברה בשעה השלישית גדול פי 2 מהמרחק שעברה בשעה השנייה. כמה ק"מ נסעה דנה במהלך השעה השלישית?

- א 60
- ב 80
- ג 100
- ד 120

שאלה 20

לפניכם סדרת צורות, בעלות חוקיות מסויימת. אלו מבין הצורות יכולה להחליף את סימן השאלה?



- א
- ב
- ג
- ד

שאלה 21

מהי תוצאת התרגיל הבא: $(7.75 - 2.15) \div (40 \times 0.02) =$

- א 0.7
- ב 4.48
- ג 7
- ד 6

שאלה 22

מיכל, גיא ואורי נכנסו לחנות ספרים, והניחו את האופניים שלהם מחוץ לחנות במהלך שהותם. כשיצאו מהחנות, נדהמו לגלות שלא כל האופניים במקומם. גיא אמר: "מישהו הזיז את האופניים שלי!". מיכל אמרה: "את האופניים שלי לא הזיזו". אורי אמר: "מישהו הזיז את האופניים של כולנו!". ידוע כי אחד מהשלושה טעה והשאר צדקו. את האופניים של מי הזיזו בוודאות?

- א מיכל
- ב גיא
- ג אורי
- ד את כל האופניים


שאלה 23

נגה וארז הגיעו לבלות במתחם קארטינג, המציע שני דגמים של מכוניות. כל אחד מהדגמים יכול לנסוע במהירות אחת בלבד. בדגם החדש, הקפה אחת של המסלול אורכת דקה אחת. בדגם הישן, 3 הקפות של המסלול אורכות 5 דקות. נגה נסעה במשך רבע שעה במכונית מדגם חדש, ובמקביל ארז נסע במשך רבע שעה במכונית מדגם ישן. כמה הקפות של המסלול השלימו נגה וארז יחדיו?

- א 18
- ב 21
- ג 24
- ד 27

שאלה 24

נתון מעגל שאורך הרדיוס שלו הוא 3 ס"מ. מרכז המעגל הוא נקודת המפגש של שלושה משולשים שווים שוקיים השווים בשטחם, כמתואר בשרטוט. השטח הכולל של החלקים הצבועים באפור שווה ל-20.46 סמ"ר. מהו השטח של משולש אחד? תזכורת, הנוסחה לחישוב שטח מעגל שרדיוסו R היא: $\pi \times R^2$. הניחו בחישובכם כי: $\pi = 3.14$



- א 10.23
- ב 7.8
- ג 2.6
- ד 3.41

מפתח תשובות

שאלה 1 · א · אם התוצאה 2 יצאה בדיוק פעם אחת, גם התוצאה 5 יצאה בדיוק פעם אחת

הגורמים הראשוניים של 120 הם $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$. הדרך היחידה לקבל גורם 5 בקוביה היא להטיל את המספר 5. מכיוון שיש רק גורם 5 אחד ב-120, המספר 5 חייב לצאת בדיוק פעם אחת. לכן טענה א' נכונה (התוצאה תמיד נכונה בלי קשר לכמות הפעמים שיצא המספר 2).

שאלה 2 · ג · רביעי

נסתכל בגרף על העמודות המייצגות את זמן העבודה. בשבוע השני עבד רועי 24 שעות, זה לא פי 1.5 מהשבוע הראשון בו עבד 15 שעות. בשבוע השלישי רועי עבד 18 שעות. בשבוע הרביעי העבודה מגיעה בדיוק שתי שנתות מעל הקו של ה-25, כלומר 27 שעות שזה פי 1.5 מהשבוע הקודם.

שאלה 3 · ב · 21

כדי למצוא את הממוצע, נסכום את שעות העבודה מכל השבועות: $15 + 24 + 18 + 27 + 31 + 11 = 126$ שעות בסך הכל. מכיוון שמדובר ב-6 שבועות המופיעים בגרף, נחלק את הסכום הכולל ב-6: $126 \div 6 = 21$.

שאלה 4 · ג · חמישי

נחשב את הרווח לכל שבוע. בשבוע החמישי: ההכנסה היא $520 \times 0.2 = 104$ ש, וההוצאה היא $31 \times 2 = 62$ ש. הרווח הוא $104 - 62 = 42$ ש. בשבוע השני הרווח הוא 24 ש, בשבוע השלישי 4 ש, ובשבוע השישי 10 ש. לכן בשבוע החמישי הרווח הוא הגבוה ביותר מבין האפשרויות המוצעות.

שאלה 5 · ד · כמות הצפיות החדשות בשבוע השני והשישי יחד שווה לכמות הצפיות החדשות בשבוע החמישי

נבדוק את מסקנה ד': בשבוע השני היו 360 צפיות ובשבוע השישי היו 160 צפיות. יחד: $360 + 160 = 520$. בשבוע החמישי היו בדיוק 520 צפיות. המסקנה נכונה שכן הסכומים שווים בדיוק. שאר המסקנות אינן מדויקות: למשל ב-א' הסכום הוא 560, שזה גדול מ-520 ולא קטן ממנו.

שאלה 6 · ג · 11

נמצא את סך העוגות: ב-4 ימים נמכרו $56 = 14 \times 4$ עוגות. ב-3 ימים נמכרו $21 = 7 \times 3$ עוגות. סה"כ נמכרו 77 עוגות ב-7 ימים. הממוצע הוא $77/7 = 11$.

שאלה 7 · ב · 6

ברצף של שלושה מספרים עוקבים, לפחות אחד חייב להיות זוגי (מתחלק ב-2) ובדיוק אחד חייב להתחלק ב-3. מכיוון שהמכפלה מכילה גם גורם 2 וגם גורם 3, היא חייבת להתחלק ב- $6 = 2 \times 3$. דרך נוספת היא לקחת כמה דוגמאות של רצפים העונים לשאלה כמו למשל 1-2-3, 4-5-6, 5-6-7 ולראות שכולם מתחלקים ב-6.

שאלה 8 · ד · 112

נתחיל בחישוב נפח של קובייה אחת: אורך הצלע הוא 2 ס"מ, לכן הנפח הוא $2 \times 2 \times 2 = 8$ סמ"ק. כעת נספור את מספר הקוביות במגדל לפי העמודות המופיעות בשרטוט משמאל לימין: עמודה אחת של 1, אחת של 2, אחת של 3, אחת של 4, אחת של 3, אחת של 1. סך הכל יש במגדל: $1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 1 = 14$ קוביות. כדי למצוא את הנפח הכולל, נכפיל את מספר הקוביות בנפח של קובייה אחת: $14 \times 8 = 112$ סמ"ק.

שאלה 9 · א · 30

בפברואר המחיר ירד ב-25% (רבע מהמחיר) ביחס למחיר המקורי שהיה 32 ש"ח. רבע מ-32 הוא 8, לכן המחיר החדש הוא $32 - 8 = 24$ ש"ח. באוגוסט המחיר עלה ב-25% ביחס למחיר החדש. רבע מ-24 הוא 6, לכן נוסף זאת למחיר: $24 + 6 = 30$ ש"ח. חשוב לשים לב שההעלאה נעשית על המחיר המוזל ולא על המחיר המקורי, ולכן המחיר הסופי שונה מהמחיר ההתחלתי.

שאלה 10 · ג · 85

המחשבון יכול לייצר רק מספרים שהם מכפלות של 4 ו-5. נבדוק את האפשרויות: $4 \times 4 \times 4 = 64$, $4 \times 4 \times 5 = 80$, $4 \times 5 \times 5 = 100$, $5 \times 5 \times 5 = 125$. לא ניתן להגיע אליו באמצעות המספרים 4 ו-5 בלבד.

שאלה 11 · ב · 4

נניח שבכל העציצים צמחו 2 עלים: $2 \times 12 = 24$. אך צמחו 28 עלים, כלומר ישנם 4 עלים "נוספים". כל עלה עודף כזה שייך לעציץ שבו צמחו 3 עלים במקום 2. לכן, היו 4 עציצים כאלו, שהצמיחו 12 עלים ויותר 8 העציצים הצמיחו 2 עלים כל אחד כלומר 16 עלים. סך הכל 28 עלים חדשים.

שאלה 12 · ג · 9

נחשב לפי הנוסחה: $6 = \frac{6}{2} + 3 = 7$, $6 \sim \frac{8}{2} + 3 = 7$, $8 \sim \frac{2}{2} + 3 = 4$, $2 \sim 2$ נציב בביטוי: $6 + 7 - 4 = 9$.

שאלה 13 · א · 64

נמצא כמה עוגיות אינן שוקולד: אם 60% הן שוקולד, אז 40% הן וניל או תות. 40% מתוך 400 עוגיות הן 160 עוגיות. כעת נתון ש-60% מתוך העוגיות הנותרות (ה-160) הן במלוי תות. אבל אנחנו מחפשים את הוניל, לכן הן 40% מתוך העוגיות הנותרות. 40% מתוך 160: 10% הם 16 עוגיות לכן 40% הם 64 עוגיות.

שאלה 14 · ד · 144

נמצא את כמות האנשים ברציף הדרומי: אם שמינית הם 12 איש, אז הרציף כולו מונה $12 \times 8 = 96$ אנשים. מכיוון ש- $\frac{1}{3}$ מהאנשים היו בצפוני, הרי שהיתר ($\frac{2}{3}$) היו בדרומי. אם 96 הם שני שלישים מהסך הכל, נחלק ב- $\frac{2}{3}$ כדי למצוא כמה הם שליש אחד: $96 \div 2 = 48$. כעת נחבר את שני החלקים ($96 + 48$) ונגלה שבתחילה המתינו 144 אנשים.

שאלה 15 · ב · 5

נבדוק את השאלה עם מספרים קלים לחישוב: נניח שהרדיוס של המעגל הראשון הוא 1. לפי הנוסחה, השטח שלו יהיה $1 \times 1 \times \pi$, שזה פשוט π . כעת, אנחנו רוצים ליצור מעגל חדש שהשטח שלו גדול פי 25, כלומר שהשטח שלו יהיה $25 \times \pi$. אם נסתכל על נוסחת השטח (רדיוס $\times$ רדיוס $\times \pi$), הרדיוס החדש שנצטרך לבחור כדי שפעולת הכפל "רדיוס כפול רדיוס" תיתן לנו תוצאה של בדיוק 25 הוא 5, ולכן זה רדיוס המעגל החדש, שהוא פי 5 מהרדיוס של המעגל הראשון.

שאלה 16 · ג · הרמיני

אם רון והרמיני לא הזמינו בירצפת לפי המשפט השני, הארי הוא זה שהזמין אותה. העבור לצ'יפס: הארי לא הזמין אותו (כי הוא הזמין בירצפת) ורון לא הזמין אותו כי נתון שהצ'יפס הוזמן ראשון, ורון היה אחרון. לכן נותרה רק הרמיני שהזמינה צ'יפס.

שאלה 17 · ב · $\frac{1}{4}$

נפתור את הסוגריים השמאליים: נהפוך את שני השברים למכנה 6 ונקבל $4\frac{1}{2} = 4\frac{3}{6} = 4\frac{3}{6} - 3\frac{1}{6} = 7\frac{4}{6}$. נפתור את הסוגריים הימניים: נהפוך למכנה משותף 10 ונקבל $3\frac{6}{10} = 3\frac{6}{10} + \frac{1}{10} = 3\frac{7}{10}$. כעת נחלק 4.5 ב-3.6. נזיז את הנקודה (במונה ובמכנה ולכן השבר אינו משתנה) ונקבל $\frac{45}{36} = \frac{5}{4}$.

שאלה 18 · ד · 8

נחשב כמה חבילות נותרו: $7.5 - 12 = 4.5$. אם ב-4.5 חבילות יש 36 נחשי גומי, נחלק את מספר הנחשים במספר החבילות: $36/4.5 = 8$.

שאלה 19 · ד · 120

נשתמש בשיטת הניחוש המושכל: ננחש שהיא נסעה 10 ק"מ בשעה הראשונה. לפי הכללים, בשעה השנייה היא נסעה 20 ק"מ ובשעה השלישית 40 ק"מ. סך הכל המרחק יהיה: $70 = 10 + 20 + 40$ ק"מ. זה קטן מדי, אך נשים לב שהמרחק האמיתי (210) גדול פי 3 מהניחוש שלנו. לכן, נכפיל את הניחוש המקורי ב-3 ונקבל: שעה ראשונה 30 ק"מ, שעה שנייה 60 ק"מ ושעה שלישית 120 ק"מ. נבדוק את הסכום: $210 = 30 + 60 + 120$ ק"מ. זהו בדיוק המרחק הכולל, ולכן בשעה השלישית היא נסעה 120 ק"מ.

שאלה 20 · —

נזהה שתי חוקיות המתרחשות במקביל: 1. החלק החסר ("הפרוסה החסרה"): בכל התקדמות של הסדרה חסרה פרוסה נוספת, אז נחפש רק תשובות עם 3 פרוסות חסרות. א או ב.2. החץ: מיקומו זז נגד כיוון השעון בין הפרוסות, כל פעם בקפיצה של 3 פרוסות. עדיין תשובות א וב מתאימות.3. כיוון החץ: בכל קפיצה הוא מסתובב רבע סיבוב ימינה. מהציור השלישי עוד רבע סיבוב ימינה יכוון את החץ לכיוון שמאל. לכן תשובה א' היא הנכונה.

שאלה 21 · ג · 7

נפתור את הסוגריים השמאליים: $5.6 = 7.75 - 2.15$. נפתור את הסוגריים הימניים: $40 \times 0.02 = 40 \times \frac{2}{100} = 0.8$. כעת נותר לבצע את פעולת החילוק: כדי להקל על החישוב, נזיז את הנקודה העשרונית מקום אחד ימינה בשני המספרים (במחלק ובמחולק לכן התרגיל נשאר ללא שינוי ונקבל $5.6 \div 0.8 = 7$).

שאלה 22 · ב · גיא

ישנן 3 אפשרויות למי הוא הטועה היחיד (מיכל, גיא או אורי). נניח שגיא טעה: אם גיא טועה כשהוא אומר "הזיזו את שלי", המשמעות היא שאת שלו לא הזיזו. זה יוצר סתירה עם אורי, שטוען ש"הזיזו לכולם" ואמור להיות צודק. לכן המקרה הזה אינו אפשרי. נניח שמיכל טעתה: המשמעות היא שאת האופניים שלה כן הזיזו. זה מסתדר מצוין עם גיא (שלו הוזז) ועם אורי (לכולם הזיזו). במקרה זה כל האופניים הוזזו, לכן כל התשובות רלוונטיות. נניח שאורי טעה: המשמעות היא שלא לכולם הזיזו. גיא צודק ("שלי הוזז") ומיכל צודקת ("שלי לא"). זה מסתדר עם הטעות של אורי. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים במקרה הזה מה קרה לאופניים של אורי, אבל האופניים של גיא הוזזו בוודאות. מסקנה: בשני המקרים האפשריים (2 ו-3), האופניים של גיא הוזזו בוודאות.

שאלה 23 · ג · 24

נחשב את מספר ההקפות של כל אחד בנפרד במהלך רבע שעה (15 דקות). נגה נוסעת בדגם החדש שבו הקפה אורכת דקה אחת, לכן ב-15 דקות היא תשלים 15 הקפות. ארז נוסע בדגם הישן שבו 3 הקפות אורכות 5 דקות. מכיוון ש-15 דקות הן פי 3 מ-5 דקות, ארז ישלים פי 3 הקפות: $3 \times 3 = 9$ הקפות. נחבר את ההקפות של שניהם: $15 + 9 = 24$.

שאלה 24 · ג · 2.6

נחשב קודם את שטח המעגל כולו: הרדיוס הוא 3 ס"מ, לכן השטח שלו הוא 9π . סך כל השטח הלבן הוא שטח המעגל פחות השטח האפור, כלומר $9\pi - 20.46$. מכיוון שהשטח הלבן מורכב משלושה משולשים שווים, נחלק את התוצאה ב-3: נחשב $3 * 3.14 - 6.82 = 9.42 - 6.82 = 2.6$

$$\frac{9\pi - 20.46}{3} = 3\pi - \frac{20.46}{3} = 3\pi - \frac{2046}{3 \cdot 100} = 3\pi - \frac{682}{100} = 3\pi - 6.82 = 3 * 3.14 - 6.82 = 9.42 - 6.82 = 2.6$$