

# DATOS MASIVOS II

REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD: VECTORES Y VALORES  
PROPIOS DE MATRICES SIMÉTRICAS

---


Blanca Vázquez Gómez

Agosto 2020

# INTRODUCCIÓN

Paciente	Edad	Peso	Temp	Colesterol	Sodio	Glucosa	Ritmo cardiaco	...
1	88.78	74.00	34.40	96.00	132.33	137.35	73.77	93.19
2	72.33	134.00	37.90	168.35	132.50	124.00	85.25	81.18
3	88.27	90.00	36.71	188.00	134.00	137.35	75.85	81.18
4	66.68	93.19	36.71	116.00	139.50	137.35	58.82	103.00
5	71.70	81.18	33.77	168.35	139.67	137.35	69.30	97.00
6	85.92	81.18	36.71	128.90	138.00	134.00	61.48	132.50
7	83.09	103.00	28.03	153.25	137.00	85.00	57.28	80.20
8	39.91	97.00	36.40	112.00	138.60	137.35	78.08	93.19
9	60.15	132.50	37.20	196.00	134.33	309.00	98.81	81.18
10	77.69	80.20	36.71	269.00	138.71	137.35	83.79	81.18
11	87.45	96.20	39.60	160.00	136.50	137.35	84.91	103.00
12	51.26	63.10	36.30	138.60	132.67	137.35	104.43	97.00
13	62.16	78.90	38.38	109.00	144.00	137.35	85.08	132.50




# INTRODUCCIÓN



Paciente	Edad	Peso
1	88.78	74.00
2	72.33	134.00
3	88.27	90.00
4	66.68	93.19
5	71.70	81.18
6	85.92	81.18
7	83.09	103.00
8	39.91	97.00
9	60.15	132.50
10	77.69	80.20
11	87.45	96.20
12	51.26	63.10
13	62.16	78.90


Una base de datos, con  $k$  número de atributos, es posible visualizar los datos como una nube de puntos en un espacio de  $k$ -dimensiones.

# INTRODUCCIÓN



Paciente	Edad	Peso	Temp
1	88.78	74.00	34.40
2	72.33	134.00	37.90
3	88.27	90.00	36.71
4	66.68	93.19	36.71
5	71.70	81.18	33.77
6	85.92	81.18	36.71
7	83.09	103.00	28.03
8	39.91	97.00	36.40
9	60.15	132.50	37.20
10	77.69	80.20	36.71
11	87.45	96.20	39.60
12	51.26	63.10	36.30
13	62.16	78.90	38.38


# INTRODUCCIÓN




Paciente	Edad	Peso	Temp
1	88.78	74.00	34.40
2	72.33	134.00	37.90
3	88.27	90.00	36.71
4	66.68	93.19	36.71
5	71.70	81.18	33.77
6	85.92	81.18	36.71
7	83.09	103.00	28.03
8	39.91	97.00	36.40
9	60.15	132.50	37.20
10	77.69	80.20	36.71
11	87.45	96.20	39.60
12	51.26	63.10	36.30
13	62.16	78.90	38.38

# INTRODUCCIÓN

¿Qué pasa con 4, 5 o más variables?



Paciente	Edad	Peso	Temp	Colesterol	Sodio	Glucosa	Ritmo cardiaco	...
1	88.78	74.00	34.40	96.00	132.33	137.35	73.77	93.19
2	72.33	134.00	37.90	168.35	132.50	124.00	85.25	81.18
3	88.27	90.00	36.71	188.00	134.00	137.35	75.85	81.18
4	66.68	93.19	36.71	116.00	139.50	137.35	58.82	103.00
5	71.70	81.18	33.77	168.35	139.67	137.35	69.30	97.00
6	85.92	81.18	36.71	128.90	138.00	134.00	61.48	132.50
7	83.09	103.00	28.03	153.25	137.00	85.00	57.28	80.20
8	39.91	97.00	36.40	112.00	138.60	137.35	78.08	93.19
9	60.15	132.50	37.20	196.00	134.33	309.00	98.81	81.18
10	77.69	80.20	36.71	269.00	138.71	137.35	83.79	81.18
11	87.45	96.20	39.60	160.00	136.50	137.35	84.91	103.00
12	51.26	63.10	36.30	138.60	132.67	137.35	104.43	97.00
13	62.16	78.90	38.38	109.00	144.00	137.35	85.08	132.50



Tener un largo número de dimensiones puede ocasionar que tengamos datos no representativos.

La reducción de la dimensionalidad consiste en disminuir el número de dimensiones en un espacio de características.

- Remover las características redundantes
- Menos poder de cómputo durante el entrenamiento
- Es posible reducir el sobreajuste
- Mejora el rendimiento
- Nos ayuda a reducir el espacio de almacenamiento

Las técnicas de reducción de dimensionalidad buscan proyectar los datos a un sub-espacio de menor dimensión que captura la esencia original de los datos.

- Métodos de proyección (álgebra lineal)
  - Análisis de componentes principales (PCA)
  - Análisis discriminante lineal (LDA)
  - Análisis discriminante generalizado (GDA)



- Es una de las técnicas más comunes de reducción de dimensionalidad.
- Es un método de proyección dónde las  $m$  columnas de una base de datos se proyectan a un sub-espacio con  $m$  o menor número de características, conservando la esencia de los datos originales.
- Se calcula usando una matriz de descomposición, como la de descomposición propia.

Es la descomposición de una matriz cuadrada en un conjunto de vectores propios (eigenvectores) y valores propios (eigenvalores).

Dada una matriz cuadrada  $M$ ,  $\lambda$  una constante y  $v$  un vector columna distinto de cero con el mismo número de filas que  $M$ . Por lo tanto,  $\lambda$  es un valor propio de  $M$  y  $v$  su correspondiente vector propio de  $M$ , si  $Mv = \lambda v$

$$Mv = \lambda v$$

Matriz cuadrada

Vector propio

Valor propio

- Dada la matriz cuadrada  $M$ , calcular los valores propios y los vectores propios

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

## DEMOSTRAR QUE $Mv = \lambda v$

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Uno de los vectores propios de  $M$  es:

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

y su correspondiente valor propio es 7.

## DEMOSTRAR QUE $Mv = \lambda v$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

## DEMOSTRAR QUE $Mv = \lambda v$

Demostrar que  $Mv = \lambda v$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Del lado izquierdo, multiplicamos  $M$  por  $v$  y del lado derecho se multiplica  $\lambda$  por  $v$

$$\begin{bmatrix} 3/\sqrt{5} + 4/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} + 12/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 14/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Finalmente, sumamos

$$\begin{bmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 14/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 14/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$



¿Cómo se calculan los valores propios y vectores propios?

$$Mv = \lambda v$$

Recordemos la ecuación:

$$Mv = \lambda v$$

Empezamos con el lado derecho de la ecuación:

$$\lambda v$$

Buscamos tener una matriz que tenga en la diagonal  $\lambda$  y ceros en el resto de posiciones.

## AÑADIR UNA MATRIZ IDENTIDAD

*Una matriz identidad es una matriz de  $n \times n$  que tiene 1s en la diagonal y 0s en el resto de posiciones*

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Deseamos obtener esto:

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, obtenemos:  $(\lambda I)v$

$$Mv = \lambda v$$

$$Mv = (\lambda I)v$$

$$Mv - (\lambda I)v = 0$$

$$(M - \lambda I)v = 0$$

Importante, busquemos que el vector propio  $v$  sea distinto de 0

Sea  $v$  un vector propio que no es 0, entonces para resolver  $\lambda$  se debe calcular el determinante de:

$$|M - (\lambda I)| = 0$$

## ¿DETERMINANTE?

- El determinante de A  $|A|$ : es el número obtenido al sumar todos los diferentes productos de  $n$  elementos que se pueden formar con los elementos de A.
- El determinante ayuda a encontrar la inversa de una matriz

## ¿CÓMO SE CALCULA EL DETERMINANTE?

Para calcular el determinante, se debe tener una matriz cuadrada  $n \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad |A| = ad - bc$$

Ejemplo:

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \quad |B| = 4 * 8 - 6 * 3 = 14$$

$$|B| = 14$$

Calcular el determinante de:

$$|M - (\lambda I)| = 0$$

Se instancian todas las variables:

$$\left| \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = 0$$



## INSTANCIAR LAS VARIABLES PARA CALCULAR EL DETERMINANTE

Se instancian todas las variables:

$$\left| \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right| = 0$$

Se obtiene:

$$\left| \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$A - B = a_{i,j} - b_{i,j}$$

$$\left| \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 6 - \lambda \end{bmatrix} \right| = 0$$

Calcular el determinante de:

$$\left| \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 2 & 6 - \lambda \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$|M - (\lambda I)| = (3 - \lambda)(6 - \lambda) - 4 = 0$$

$$|M - (\lambda I)| = 18 - 3\lambda - 6\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$|M - (\lambda I)| = \lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0 \text{ ecuación cuadrática}$$

Para resolver una ecuación cuadrática, usamos la función cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## INSTANCIAR LA FUNCIÓN CUADRÁTICA

Para resolver una ecuación cuadrática, usamos la función cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Instanciamos la ecuación cuadrática:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0$$

$$\lambda = \frac{-(-9) \pm \sqrt{9^2 - 4(1 \cdot 14)}}{2 \cdot 1}$$

## CALCULAR EL VALOR PROPIO USANDO LA FUNCIÓN CUADRÁTICA

Instanciamos la ecuación cuadrática:

$$\lambda = \frac{-(-9) \pm \sqrt{9^2 - 4(1 \cdot 14)}}{2 \cdot 1}$$

$$\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 56}}{2}$$

$$\lambda = \frac{9 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$\lambda = \frac{9 \pm 5}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{9+5}{2} = 7$$

$$\lambda_2 = \frac{9-5}{2} = 2$$

Los valores propios de la matriz M son: 7 y 2

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Calcular el vector propio para el valor propio de  $\lambda = 7$

Recordamos la ecuación a demostrar:

$$Mv = \lambda v$$

Sustituimos los valores que ya conocemos:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Sustituimos los valores que ya conocemos:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Del lado izquierdo, se multiplica la matriz con el vector y del lado derecho se multiplica el escalar con el vector.

$$3x + 2y = 7x$$

$$2x + 6y = 7y$$



## CALCULAR LOS VECTORES PROPIOS

$$3x + 2y = 7x$$

$$2x + 6y = 7y$$

Pasamos todo al lado izquierdo:

$$3x + 2y - 7x = 0$$

$$2x + 6y - 7y = 0$$

$$-4x + 2y = 0$$

$$2x - y = 0$$

$$y = 2x$$

Un posible vector propio es:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

## VECTOR UNITARIO

Dado que el posible vector, no es un vector unitario, debido a que la suma de los cuadrados de sus componentes es 5, en lugar de 1.

$$1^2 + 2^2 = 5$$

Por lo tanto:

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Un vector unitario es aquel donde la suma de cuadrados de sus componentes es 1.

$$(1/\sqrt{5})^2 + (2/\sqrt{5})^2 = 1$$

Por lo tanto, el vector propio es

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Y el valor propio para este vector es: 7

## DEMOSTRAR QUE $Mv = \lambda v$

Usando los resultado obtenidos, demostrar que  $Mv = \lambda v$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} = 7 \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Del lado izquierdo, multiplicamos  $M$  por  $v$  y del lado derecho se multiplica  $\lambda$  por  $v$

$$\begin{bmatrix} 3/\sqrt{5} + 4/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} + 12/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 14/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Finalmente, sumamos

$$\begin{bmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 14/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 14/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

¿Cuál es el vector propio de la matriz  $M$ , cuando su valor propio es 2?

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$