Jack
Longe

1) $\Phi_1 = \frac{1}{2} k \phi_1^2$

$\Phi_0 = \frac{1}{2} k \phi_0^2$

$Q_{x_0} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{1}{2} k \frac{\phi_1^2 - \phi_0^2}{L}$

2) $\Omega = \frac{-1}{2} w_0 z + \frac{Q}{4\pi} \ln(z+d) - \frac{Q}{4\pi} \ln(z-d)$

$w = -\frac{\partial \Phi}{\partial z} = -\frac{d\Omega}{dz} = \frac{1}{2} w_0 - \frac{Q}{4\pi} \frac{1}{z+d} + \frac{Q}{4\pi} \frac{1}{z-d}$

Flownets:

a= 0.6



a= 1.0



a= 1.5


Equipotentials
Streamlines
200
100
0
-100
-200
-1000
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0

W:

a=0.6


50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-200
-180
-160
-140

a=1.0


50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-200
-180
-160
-140

a= 1.5


50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-200
-180
-160
-140