

1 Gramův–Schmidtův ortogonalizační proces

1.1 Připomenutí Gramova–Schmidtova ortogonalizačního procesu

Gramův–Schmidtův ortogonalizační proces je metoda, která z lineárně nezávislé posloupnosti vektorů a_1, \dots, a_m vytvoří posloupnost ortonormálních vektorů q_1, \dots, q_m tak, že platí

$$\text{span}\{a_1, \dots, a_k\} = \text{span}\{q_1, \dots, q_k\}$$

pro všechna $k = 1, \dots, m$.

Nechť již jsme získali q_1, \dots, q_{k-1} pro nějaké k . Popíšeme nyní, jak získáme vektor q_k .

Od vektoru a_k postupně odečítáme jeho projekce na podprostory generované jednotlivými vektory již spočtené ortonormální báze:

$$z = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} q_i q_i^* a_k = (I - \sum_{i=1}^{k-1} q_i q_i^*) a_k. \quad (1)$$

Výsledný vektor z pak normalizujeme a získáme tak q_k :

$$q_k = z / \|z\|. \quad (2)$$

Označíme-li $r_{i,k} = q_i^* a_k$ a $r_{k,k} = \|z\|$, dosazením do (1) za z vektor $r_{k,k} q_k$ (viz (2)), dostaneme

$$a_k = \sum_{i=1}^{k-1} r_{i,k} q_i + r_{k,k} q_k, \quad k = 1, \dots, m,$$

neboli $A = QR$.

1.2 Implementace Gramova–Schmidtova procesu

Gramův–Schmidtův proces lze přepsat dvěma matematicky ekvivalentními způsoby.

1) Klasický algoritmus (CGS):

$$z = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} q_i q_i^* a_k. \quad (\text{CGS})$$

2) Modifikovaný algoritmus (MGS) odpovídá postupné ortogonalizaci vektoru a_k :

$$z = (I - q_{k-1} q_{k-1}^*) \dots (I - q_2 q_2^*) (I - q_1 q_1^*) a_k \quad (\text{MGS})$$

2 QR rozklad

2.1 QR rozklad a ztráta ortogonality

Definice 1 (QR rozklad). *Nechť $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ je obecná obdélníková matice. Rozklad tvaru*

$$A = QR,$$

kde Q je matice s ortonormálními sloupci a R je horní trojúhelníková, nazýváme QR rozkladem matice A .

Úloha 1. Sledujte ztrátu ortogonality a přesnost QR rozkladu pro různé implementace rozkladu.

1. Úpravou skriptu `cgs.m` (klasická implementace GSO) vytvořte skript `mgs.m` pro modifikovanou GSO.
2. Na základě přednášky si rozmyslete, jaké lze očekávat normy $\|A - QR\|$ a $\|Q^*Q - I\|$ pro různé implementace QR rozkladu a doplňte je do skriptu `srovnej_QR.m` (na řádky 66–71). Hodnoty si poté můžete zkontrolovat v tabulce níže.
3. Než skript spustíte, projděte si ho a ujistěte se, že rozumíte jednotlivým příkazům. Pokud ne, zeptejte se cvičícího.
4. Skript spusťte a zamyslete se nad výsledky. Zejména odpovězte na otázky:
 - Je, dle vašich pozorování, norma rezidua $\|A - QR\|$ vypovídající o „kvalitě“ spočteného QR rozkladu?
 - Lze pomocí nějaké varianty QR rozkladu získat téměř ortogonální faktor Q i pro matici A s vysokým číslem podmíněnosti?
 - Jsou dosažené výsledky v souladu s teoretickými výsledky, viz tabulka?

Algoritmus	$\ Q^*Q - I\ $	$\ A - QR\ $
CGS	$\kappa^2(A)\varepsilon$	$\varepsilon\ A\ $
MGS	$\kappa(A)\varepsilon$	$\varepsilon\ A\ $
Householder QR rozklad	ε	$\varepsilon\ A\ $
Givens QR rozklad	ε	$\varepsilon\ A\ $

2.2 Řešení soustavy lineárních rovnic QR rozkladem

QR rozklad lze použít při řešení soustavy lineárních rovnic s (regulární) maticí A a vektorem pravé strany b :

$$Ax = b \iff QRx = b \iff Rx = Q^*b \quad (3)$$

Úloha 2. Matice R dědí mnohé vlastnosti původní matice A . Ukažte, že

$$\|R\|_2 = \|A\|_2, \quad \|R\|_F = \|A\|_F, \quad \kappa(R) = \kappa(A).$$

Praktická implementace řešení soustavy $Ax = b$ se typicky vyhýbá výpočtu Q a přenásobení pravé strany. Spíše se při řešení soustavy počítá QR rozklad rozšířené matice $[A|b]$.

$$[A|b] \xrightarrow{\text{QR rozklad}} \text{matice } \bar{Q} \text{ a } [\bar{R}|\bar{b}]; \quad [A|b] = \bar{Q}[\bar{R}|\bar{b}]. \quad (4)$$

Úloha 3. Uvažujte regulární reálnou matici A (pak $Q, \bar{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$) a rozmyslete si následující otázky

1. V přesné aritmetice je řešení soustav $\bar{R}x = \bar{b}$, $Rx = Q^*b$ a $Ax = b$ stejné.
2. Pro libovolnou danou implementaci QR rozkladu v přesné aritmetice platí

$$Q = \bar{Q}, \quad R = \bar{R}, \quad Q^*b = \bar{b}.$$

Poznámka. Může se zdát, že MGS je ve všech směrech lepší než CGS, v praxi se však CGS stále používá. CGS se výrazně lépe paralelizuje: každou ortogonalizaci ve směru q_i lze počítat nezávisle na jiném procesoru. Tuto část výpočtu je tedy možno značně urychlit. U MGS to není možné, protože začít ortogonalizovat oproti dalšímu vektoru je možné až potom, co jsme dokončili ortogonalizaci vůči vektoru předchozímu.

Úloha 4. Zkonstruuje matici $A = \text{gallery}(\text{'poisson'}, 100)$; a pomocí vestavěné funkce `qr` (nebo jakékoli z „vašich“ implementací) spočtete její QR rozklad v MATLABu. Následně srovnajte zaplnění (tj. počet nenulových prvků) faktorů Q , R a samotné matice A pomocí příkazu `spy`.

(Navíc) Srovnajte se zaplněním faktorů L a U z LU rozkladu této matice. Pokud byste měli řešit soustavu lineárních algebraických rovnic $Ax = b$, kde matice A je řídká, kterou metodu byste použili a proč?