Les nombes complexes

Error message

```
UndefVarError: `bibcite` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
md"""
* Introduction aux complexes $(cite("adams2018Calculus", "Appendix I"))
* Introduction aux polynômes $(cite("adams2018Calculus", "P.6"))
"""
```

Reading hidden

Error message

```
UndefVarError: `bibrefs` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
refs(["adams2018Calculus"])
```

Reading hidden

Cartésienne	Polaire	Exponentielle
$z = a + bi$	$z = r\mathrm{cis}(\theta)$	$z = r\exp(i\theta) = re^{i\theta}$
$a = r\cos(\theta)$	$r = \sqrt{a^2 + b^2}$	
$b = r\sin(\theta)$	$\theta = \tan^{-1}(b/a)$	



Cartésienne : facile pour addition, soustraction

$$(a_1 + b_1 i) \pm (a_2 + b_2 i) = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2) i$$

Polaire : facile pour multiplier, diviser. Géométriquement : **rotation** d'angle θ

$$\begin{aligned} r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)} \\ \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} &= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)} \\ (re^{i\theta})^{-1} &= r^{-1} e^{-i\theta} \end{aligned}$$



Définition : *Complexe conjugué*

$$z = a + bi \qquad \bar{z} = a - bi$$
$$z = re^{i\theta} \qquad \bar{z} = re^{-i\theta}$$



Quiz : Quel est la valeur $z\bar{z}$? (vous pouvez choisir entre cartésienne ou polaire)

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(
    html"Réponse",
    md"""```math
\begin{aligned}
    \text{(Cartésienne)} \quad & (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2\\
    \text{(Polaire)} \quad & re^{i\theta}re^{-i\theta} = r^2e^{i(\theta - \theta)} = r^2
\end{aligned}
```""",
)
```

*Reading hidden*
```

Le théorème fondamental de l'algèbre

Tout polynome $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ de degré n a n racines complexes (ce qui n'exclut pas que certaines d'entre elles aient une partie imaginaire nulle et donc soient réelles). Dans cette liste de n racines, certaines apparaissent plusieurs fois. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'une racine soit racine plusieurs fois ?

Multiplicité

Une valeur z est une racine du polynôme $P(x)$ si $P(z) = 0$. Si z est également une racine de la dérivée, c'est à dire $P'(z) = 0$ alors z est une racine double. En général, z est une racine de multiplicité m si $P(z) = P'(z) = \cdots = P^{(m)}(z) = 0$ où $P^{(k)}$ est la dérivée $m$ième de P.

De façon équivalente, ça revient à l'exposant du facteur $(x - z)$ dans la factorisation du polynôme. Par exemple, si :

$$P(x) = (x - z)^m \cdot Q(x),$$

où $Q(z) \neq 0$, alors z est une racine de multiplicité m.

Propriété des paires conjuguées

Si $z = a + ib$ est une racine de multiplicité m, alors la racine conjuguée $\overline{z} = a - ib$ possède également une multiplicité m.

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(
    html"Preuve",
    md"""
Comme les coefficients ``a_i`` sont réel, ils sont leur propre conjugués donc
``\overline{a_i} = a_i``.
Si ``P^{(k)}(z) = 0``, on a donc:
```

```math
\begin{align}
P^{(k)}(\bar{z})
& = a_0 + a_1\bar{z} + a_2\bar{z}^2 + \cdots + a_d\bar{z}^d\\
    & = a_0 + a_1\bar{z} + a_2\overline{z^2} + \cdots + a_d\overline{z^d}\\
& = \overline{\overline{a_0} + \overline{a_1}z + \overline{a_2}z^2 + \cdots + \overline{a_d}z^d}\\
& = \overline{a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_dz^d}\\
& = \overline{P(z)}
= \bar{0}
= 0.
\end{align}
```
""",

Reading hidden code

Le cas quadratique

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(
    html"Preuve",
    md"""
```math
\begin{align}
  4a^2x^2 + 4abx + 4ac & = 0\\
  4a^2x^2 + 4abx + b^2 & = b^2 - 4ac\\
  (2ax + b)^2 & = b^2 - 4ac
\end{align}
```
""",
)
```

Reading hidden code

Les racines de 1

Exemple introductif : les racines cubiques de 1

Quelles sont les solutions de $x^3 = 1$. En d'autre termes, quels sont les racines de $x^3 - 1$.

cube = $-1 + x^3$

```
cube = Polynomial([-1, 0, 0, 1])
```

On sait deviner une première racine : 1 car $1^3 = 1$.

première_racine = $-1 + x$

```
première_racine = Polynomial([-1, 1])
```

Grace à Horner, on sait factoriser cette racine, ce qui donne

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

q = $1.0 + 1.0 \cdot x + 1.0 \cdot x^2$

```
q = div(cube, première_racine)
```

$-1.0 + 1.0 \cdot x^3$

```
première_racine * q
```

On trouve alors les deux racines manquantes à l'aide des formules du cas quadratique

Δ = -3

```
Δ = 1 - 4
```

```
(-0.5+0.866025im, -0.5-0.866025im)
```

```
(-1 + √(abs(Δ)) * im) / 2, (-1 - √(abs(Δ)) * im) / 2
```

Le cas général

Pour calculer les valeurs propres d'un polynôme de haut degré, il n'y a plus de formule. Mais on sait les calculer en reformulant le problème en problème de calcul de valeurs propre de la matrice companion. Comme on sait calculer numériquement les valeurs propres d'une matrices, ça nous permet de de calculer numériquement les valeurs propres d'un polynôme.

Des valeurs propres aux racines d'un polynômes

Une matrice A a comme valeur propre λ avec vecteur propre associé x (non-nul) si

$$Ax = \lambda x$$

ou de façon équivalente

$$(A - \lambda I)x = 0$$

Si la matrice $A - \lambda I$ était régulière, il n'y aurait qu'une seule solution : $x = 0$. Seulement, le fait que λ soit une valeur propre est équivalente au fait qu'il existe une solution x non-nulle. Ceci équivaut à dire que le déterminant:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Ce déterminant est un polynôme en λ de degré n.

Des racines d'un polynômes aux valeurs propres

Comment trouver les `n` racines ? Commençons par un exemple:

```
(-1 + x, -2 + x, -3 + x)
```

```
p1, p2, p3 = Polynomial([-1, 1]), Polynomial([-2, 1]), Polynomial([-3, 1])
```

p = -6 + 11·x - 6·x² + x³

```
p = p1 * p2 * p3
```

```
[1.0, 2.0, 3.0]
```

```
roots(p)
```

Comment est-ce que `roots` a retrouvé les racines à partir des coefficients ?

Commençons par essayer de trouver une des racines. Comment trouver r ?

$$(x - r)q = \alpha p$$

Où α est une constante et le polynôme q est de la forme

$$q = b_2x^2 + b_1x + b_0$$

En comparant les termes en x^3, on trouve que $\alpha = b_2$. On a donc:

$$xq - b_2p = rq$$
$$b_1x^2 + b_0x - b_2(-6x^2 + 11x - 6) = r(b_2x^2 + b_1x + b_0)$$

En comparant les coefficients des monômes 1, x et x^2, on a 3 équations:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

4 inconnues pour seulement 3 équations, comment va-t-on trouver b_0, b_1, b_2 et r ?

Error message

```
UndefVarError: `qa` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
qa(
    html"Réponse",
    md"""
La racine ``r`` est une valeur propre de la matrice
```math
\begin{bmatrix}
    0 & 0 & 6\\
    1 & 0 & -11\\
    0 & 1 & 6
\end{bmatrix}
```
et le vecteur ``(b_0, b_1, b_2)`` est le vecteur propre correspondant!
Comme il y a moins d'équation que d'inconnues, il y a un degré de liberté:
Le vecteur propre peut être multiplié par n'importe quel constante et c'est toujours une solution.
On peut utiliser ``b_2 = 1`` pour trouver ``q = (x - 2)(x - 3)``.
""",
)
```

Reading hidden code

```
E = Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
    values:
    3-element Vector{Float64}:
     0.9999999999999978
     2.000000000000007
     2.9999999999999925
    vectors:
    3×3 Matrix{Float64}:
      0.762001  -0.588348   0.534522
     -0.635001   0.784465  -0.801784
      0.127     -0.196116   0.267261
```

```
E = eigen([
    0 0 6
    1 0 -11
    0 1 6
])
```

On trouve la première racine

```
(1.0, [0.762001, -0.635001, 0.127])
```

```
r, b = E.values[1], E.vectors[:, 1]
```

En normalisant, on trouve bien $(x-2)(x-3)$

```
[6.0, -5.0, 1.0]
```

```
b / b[3]
```

$6 - 5 \cdot x + x^2$

```
p2 * p3
```

Utilitaires

```
using Polynomials, LinearAlgebra, PlutoUI, Plots
```

```
import DocumenterCitations
```

Error message from Main

```
SystemError: opening file "/home/runner/work/LSINC1113/LSINC1113/Lectures/utils.jl":
No such file or directory
```

Show stack trace...

```
include("utils.jl")
```

Error message

```
UndefVarError: `load_biblio!` not defined in `Main.var"workspace#3"`
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.
```

Show stack trace...

```
biblio = load_biblio!()
```

cite (generic function with 1 method)

refs (generic function with 1 method)

```
refs(keys) = bibrefs(biblio, keys)
```

draw_angle (generic function with 1 method)

```
function draw_angle(r, from, to, label)
    θs = range(from, stop=to, length = 10)
    plot!(r * cos.(θs), r * sin.(θs), label = nothing, linestyle = :dash, color =
    :black, arrow = Plots.arrow(:both, :closed))
    _r = r + 0.02
    θ_mid = (from + to) / 2
    annotate!(_r * cos(θ_mid), _r * sin(θ_mid), text("\$" * label * "\$", :left))
end
```

```
draw_complex! (generic function with 1 method)
```

```julia
function draw_complex!(r, θ; cartesian = true, a_pos = :top, b_label = "b", θ_label = "\\theta", start_θ = 0, θ_r = 1/6)
    a = r * cos(θ)
    b = r * sin(θ)
    plot!([0, a], [0, b], arrow = true, label = nothing, linewidth=2, color = :black)
    if cartesian
        arrow = Plots.arrow(:both, :closed)
        plot!([a, a], [0, b], label = nothing, linestyle = :dash, color = :black, arrow = arrow)
        plot!([0, a], [b, b], label = nothing, linestyle = :dash, color = :black, arrow = arrow)
        annotate!(a/2, b, text("\$a\$", a_pos))
        annotate!(a - 0.02, b/2, text("\$" * b_label * "\$", :right))
        annotate!(a/2, b/2, text("\$r\$", :bottom, :right))
    end
    draw_angle(r * θ_r, 0, θ, θ_label)
end
```

```
draw_complex (generic function with 1 method)
```

```julia
function draw_complex(args...; kws...)
    scatter([0], [0], ratio = :equal, color = :black, label = nothing, framestyle = :origin, ticks = nothing)
    draw_complex!(args...; kws...)
end
```