Les nombes complexes

- Introduction aux complexes [AE18; Appendix I]
- Introduction aux polynômes [AE18; P.6]

[AE18] R. A. Adams and C. Essex. *Calculus : A Complete Course*. 9 Edition (Pearson, 2018).

Cartésienne	Polaire	Exponentielle
$z = a + bi$	$z = r\mathrm{cis}(\theta)$	$z = r\exp(i\theta) = re^{i\theta}$
$a = r\cos(\theta)$	$r = \sqrt{a^2 + b^2}$	
$b = r\sin(\theta)$	$\theta = \tan^{-1}(b/a)$	



Cartésienne : facile pour addition, soustraction

$$(a_1 + b_1 i) \pm (a_2 + b_2 i) = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2) i$$

Polaire : facile pour multiplier, diviser. Géométriquement : **rotation** d'angle θ

$$\begin{aligned} r_1 e^{i\theta_1} r_2 e^{i\theta_2} &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)} \\ \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} &= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)} \\ (re^{i\theta})^{-1} &= r^{-1} e^{-i\theta} \end{aligned}$$



Définition : *Complexe conjugué*

$$\begin{aligned} z &= a + bi & \bar{z} &= a - bi \\ z &= re^{i\theta} & \bar{z} &= re^{-i\theta} \end{aligned}$$



Quiz : Quel est la valeur $z\bar{z}$? (vous pouvez choisir entre cartésienne ou polaire)

▶ **Réponse**

Le théorème fondamental de l'algèbre

Tout polynome $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ de degré n a n racines complexes (ce qui n'exclut pas que certaines d'entre elles aient une partie imaginaire nulle et donc soient réelles). Dans cette liste de n racines, certaines apparaissent plusieurs fois. Mais qu'est-ce que ça signifie qu'une racine soit racine plusieurs fois ?

Multiplicité

Une valeur z est une racine du polynôme $P(x)$ si $P(z) = 0$. Si z est également une racine de la dérivée, c'est à dire $P'(z) = 0$ alors z est une racine double. En général, z est une racine de multiplicité m si $P(z) = P'(z) = \cdots = P^{(m)}(z) = 0$ où $P^{(k)}$ est la dérivée $m$ième de P.

De façon équivalente, ça revient à l'exposant du facteur $(x - z)$ dans la factorisation du polynôme. Par exemple, si :

$$P(x) = (x - z)^m \cdot Q(x),$$

où $Q(z) \neq 0$, alors z est une racine de multiplicité m.

Propriété des paires conjuguées

Si $z = a + ib$ est une racine de multiplicité m, alors la racine conjuguée $\overline{z} = a - ib$ possède également une multiplicité m.

▶ **Preuve**

Le cas quadratique

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

▶ **Preuve**

Les racines de 1

Exemple introductif : les racines cubiques de 1

Quelles sont les solutions de $x^3 = 1$. En d'autre termes, quels sont les racines de $x^3 - 1$.

cube = $-1 + x^3$

```
cube = Polynomial([-1, 0, 0, 1])
```

On sait deviner une première racine : 1 car $1^3 = 1$.

première_racine = $-1 + x$

```
première_racine = Polynomial([-1, 1])
```

Grace à Horner, on sait factoriser cette racine, ce qui donne

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

q = $1.0 + 1.0 \cdot x + 1.0 \cdot x^2$

```
q = div(cube, première_racine)
```

$-1.0 + 1.0 \cdot x^3$

```
première_racine * q
```

On trouve alors les deux racines manquantes à l'aide des formules du cas quadratique

$\Delta = -3$

```
Δ = 1 - 4
```

```
(-0.5+0.866025im, -0.5-0.866025im)
```

```
(-1 + √(abs(Δ)) * im) / 2, (-1 - √(abs(Δ)) * im) / 2
```

Le cas général

Pour calculer les valeurs propres d'un polynôme de haut degré, il n'y a plus de formule. Mais on sait les calculer en reformulant le problème en problème de calcul de valeurs propre de la matrice companion. Comme on sait calculer numériquement les valeurs propres d'une matrices, ça nous permet de de calculer numériquement les valeurs propres d'un polynôme.

Des valeurs propres aux racines d'un polynômes

Une matrice A a comme valeur propre λ avec vecteur propre associé x (non-nul) si

$$Ax = \lambda x$$

ou de façon équivalente

$$(A - \lambda I)x = 0$$

Si la matrice $A - \lambda I$ était régulière, il n'y aurait qu'une seule solution : $x = 0$. Seulement, le fait que λ soit une valeur propre est équivalente au fait qu'il existe une solution x non-nulle. Ceci équivaut à dire que le déterminant:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Ce déterminant est un polynôme en λ de degré n.

Des racines d'un polynômes aux valeurs propres

Comment trouver les `n` racines ? Commençons par un exemple:

```
(-1 + x, -2 + x, -3 + x)
```

```
p1, p2, p3 = Polynomial([-1, 1]), Polynomial([-2, 1]), Polynomial([-3, 1])
```

```
p = -6 + 11·x - 6·x² + x³
```

```
p = p1 * p2 * p3
```

```
[1.0, 2.0, 3.0]
```

```
roots(p)
```

Comment est-ce que `roots` a retrouvé les racines à partir des coefficients ?

Commençons par essayer de trouver une des racines. Comment trouver r ?

$$(x - r)q = \alpha p$$

Où α est une constante et le polynôme q est de la forme

$$q = b_2x^2 + b_1x + b_0$$

En comparant les termes en x^3, on trouve que $\alpha = b_2$. On a donc:

$$\begin{gathered} xq - b_2p = rq \\ b_1x^2 + b_0x - b_2(-6x^2 + 11x - 6) = r(b_2x^2 + b_1x + b_0) \end{gathered}$$

En comparant les coefficients des monômes 1, x et x^2, on a 3 équations:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

4 inconnues pour seulement 3 équations, comment va-t-on trouver b_0, b_1, b_2 et r ?

▶ **Réponse**

```
E = Eigen{Float64, Float64, Matrix{Float64}, Vector{Float64}}
    values:
    3-element Vector{Float64}:
     0.9999999999999978
     2.000000000000007
     2.9999999999999925
    vectors:
    3×3 Matrix{Float64}:
      0.762001  -0.588348   0.534522
     -0.635001   0.784465  -0.801784
      0.127     -0.196116   0.267261
```

```
E = eigen([
    0 0 6
    1 0 -11
    0 1 6
])
```

On trouve la première racine

```
(1.0, [0.762001, -0.635001, 0.127])
```

```
r, b = E.values[1], E.vectors[:, 1]
```

En normalisant, on trouve bien $(x-2)(x-3)$

```
[6.0, -5.0, 1.0]
```

```
b / b[3]
```

$6 - 5 \cdot x + x^2$

```
p2 * p3
```

Utilitaires

```julia
using Polynomials, LinearAlgebra, PlutoUI, Plots
```

```
Precompiling Polynomials...
   1449.7 ms  ✓ RecipesBase
  22233.4 ms  ✓ Polynomials
  2 dependencies successfully precompiled in 24 seconds. 19 already precompile
d.
Precompiling Plots...
    593.9 ms  ✓ JLLWrappers
    737.3 ms  ✓ Graphite2_jll
    972.8 ms  ✓ Libmount_jll
    992.2 ms  ✓ OpenSSL_jll
    679.6 ms  ✓ EpollShim_jll
    835.8 ms  ✓ LLVMOpenMP_jll
    982.2 ms  ✓ Bzip2_jll
    782.1 ms  ✓ Xorg_libICE_jll
    799.6 ms  ✓ Xorg_libXau_jll
    893.7 ms  ✓ libpng_jll
    762.5 ms  ✓ libfdk_aac_jll
    852.3 ms  ✓ LAME_jll
    914.7 ms  ✓ fzf_jll
   1155.5 ms  ✓ LERC_jll
    923.3 ms  ✓ JpegTurbo_jll
   5002.0 ms  ✓ ColorSchemes
    981.0 ms  ✓ XZ_jll
    975.0 ms  ✓ Ogg_jll
    754.6 ms  ✓ mtdev_jll
    842.1 ms  ✓ gperf_jll
    804.1 ms  ✓ Xorg_libXdmcp_jll
    959.2 ms  ✓ x265_jll
    810.8 ms  ✓ libaom_jll
```

```julia
import DocumenterCitations
```

```
Precompiling DocumenterCitations...
    734.0 ms  ✓ StringEncodings
    772.0 ms  ✓ Git_jll
    649.1 ms  ✓ Git
   1338.1 ms  ✓ YAML
  10477.3 ms  ✓ JSON3
    638.4 ms  ✓ JSONSchema
    820.2 ms  ✓ BibParser
   1347.4 ms  ✓ Bibliography
  28319.7 ms  ✓ Documenter
   3398.1 ms  ✓ DocumenterCitations
  10 dependencies successfully precompiled in 33 seconds. 58 already precompil
ed.
Precompiling FileIOExt...
   2649.5 ms  ✓ Plots → FileIOExt
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds. 184 already precompiled.
```

qa (generic function with 2 methods)

```
include("utils.jl")
```

biblio =

▸ CitationBibliography("/home/runner/work/LSINC1113/LSINC1113/Lectures/biblio.bib", AlphaSt

```
biblio = load_biblio!()
```

ⓘ Loading bibliography from `/home/runner/work/LSINC1113/LSINC1113/Lectures/biblio.bib`...

⊗ Entry west2022Introduction is missing the publisher field(s).

ⓘ Loading completed.

cite (generic function with 1 method)

refs (generic function with 1 method)

```
refs(keys) = bibrefs(biblio, keys)
```

draw_angle (generic function with 1 method)

```
function draw_angle(r, from, to, label)
    θs = range(from, stop=to, length = 10)
    plot!(r * cos.(θs), r * sin.(θs), label = nothing, linestyle = :dash, color = :black, arrow = Plots.arrow(:both, :closed))
    _r = r + 0.02
    θ_mid = (from + to) / 2
    annotate!(_r * cos(θ_mid), _r * sin(θ_mid), text("\$" * label * "\$", :left))
end
```

```
draw_complex! (generic function with 1 method)
```

```julia
function draw_complex!(r, θ; cartesian = true, a_pos = :top, b_label = "b", θ_label = "\\theta", start_θ = 0, θ_r = 1/6)
    a = r * cos(θ)
    b = r * sin(θ)
    plot!([0, a], [0, b], arrow = true, label = nothing, linewidth=2, color = :black)
    if cartesian
        arrow = Plots.arrow(:both, :closed)
        plot!([a, a], [0, b], label = nothing, linestyle = :dash, color = :black, arrow = arrow)
        plot!([0, a], [b, b], label = nothing, linestyle = :dash, color = :black, arrow = arrow)
        annotate!(a/2, b, text("\$a\$", a_pos))
        annotate!(a - 0.02, b/2, text("\$" * b_label * "\$", :right))
        annotate!(a/2, b/2, text("\$r\$", :bottom, :right))
    end
    draw_angle(r * θ_r, 0, θ, θ_label)
end
```

```
draw_complex (generic function with 1 method)
```

```julia
function draw_complex(args...; kws...)
    scatter([0], [0], ratio = :equal, color = :black, label = nothing, framestyle = :origin, ticks = nothing)
    draw_complex!(args...; kws...)
end
```