베트남어 • Tiếng Việt

외국인 근로자 원활한 소통을 위한

양돈 사양관리 매뉴얼

Kỹ năng giao tiếp tốt với người lao động nước ngoài

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn



농촌진흥청
국립축산과학원

발 간 사

최근 농업현장의 고령화와 부족한 고용인력 해소를 위하여 외국인 근로자를 고용하여 활용하는데 2011년 13,487명이던 외국인 근로자 고용 인력이 2016년에는 16,996명으로 26% 증가하였고, 이 같은 현상은 앞으로도 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

외국인 근로자가 증가함에 따라 축산 현장에서의 외국인 인력 의존도가 더욱 높아지고 있고 역할 또한 다양해지고 있지만, 외국인 근로자에게는 익숙하지 않은 축산 현장 및 언어소통의 어려움과 양축농가에게는 외국인 근로자와의 언어소통 및 문화적 차이 등 많은 어려움이 있을 것으로 생각됩니다.

또한 축산업에 종사하는 외국인 근로자에 대한 별도의 교육훈련 제도 및 정책 미흡으로 외국인 근로자의 적극적인 축산 현장 참여가 어려운 실정입니다.

이에 국립축산과학원에서는 그동안 수행한 연구결과 등을 반영하여 축산농가와 외국인 근로자가 함께 참고할 수 있도록 「외국인 근로자를 위한 양돈 사양관리 매뉴얼」을 재미있는 만화로 제작하여 발간하게 되었습니다.

이번 매뉴얼은 포유자돈 및 이유자돈 관리, 육성 · 비육돈 관리, 웅돈 관리, 후보돈 관리, 임신돈 관리, 포유모돈 관리, 이유모돈 관리 등 돼지의 출생부터 출하까지 대화 형태로 재미있게 정리하여 외국인 근로자들이 기초적인 정보들을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 하였습니다.

부디 본 책자가 외국인 근로자뿐만 아니라 양축농가들에게도 널리 활용되어 축산현장에서 원활한 소통을 통한 농장의 업무 효율화 및 생산성을 높이는데 유용한 길잡이가 되기를 바랍니다.

2017년 6월

국립축산과학원장 **오 성 종**

LỜI TỰA

Những năm gần đây, Hàn Quốc bắt đầu sử dụng lao động nước ngoài để giải quyết vấn đề già hóa dân số và thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp. Theo đó, số lượng lao động nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 26% từ 13.487 người năm 2011 lên 16.996 người năm 2016 và có xu hướng tiếp tục tăng.

Số lượng lao động nước ngoài tăng dẫn đến thực trạng ngành nông nghiệp Hàn Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhân lực này. Vai trò của lao động nước ngoài tại các trang trại chăn nuôi gia súc ngày càng trở nên đa dạng. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài cũng gặp không ít những khó khăn như khác biệt về môi trường làm việc, ngôn ngữ, văn hóa…

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ và hệ thống đào tạo dành riêng cho lao động nước ngoài trong ngành chăn nuôi vẫn tồn tại một số bất cập. Điều này gây khó khăn cho người lao động nước ngoài trong việc chủ động tham gia vào hoạt động sản xuất tại trang trại chăn nuôi gia súc.

Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, dựa trên kết quả nghiên cứu trong thời gian qua, Viện Khoa học Chăn nuôi Quốc gia phát hành tài liệu < Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn> dành cho người lao động nước ngoài và nông dân trong ngành chăn nuôi dưới dạng truyện tranh.

Tài liệu hướng dẫn này mô tả quy trình quản lý và chăm sóc từ khi lợn được sinh ra đến khi xuất chuồng (quản lý lợn con và lợn con cai sữa; quản lý lợn choai và lợn vỗ béo; quản lý lợn đực, lợn nái hậu bị, lợn mẹ, lợn nái cho bú và lợn nái cai sữa…) thông qua những đoạn hội thoại thú vị để người lao động nước ngoài nắm được các kiến thức cơ bản.

Tôi hy vọng rằng tài liệu hướng dẫn này sẽ được người lao động nước ngoài và nông dân trong ngành chăn nuôi sử dụng rộng rãi, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc thông qua giao tiếp linh hoạt tại các trang trại chăn nuôi.

Tháng 6 năm 2017

Oh Seongjong, Viện trưởng Viện Khoa học Chăn nuôi Quốc gia

목 차 • Mục lục

1. 웅돈 및 후보돈 관리
Quản lý lợn đực và lợn nái hậu bị 05

2. 이유모돈(종부대기돈) 관리
Quản lý lợn nái cai sữa (lợn dùng để phối giống) 09

3. 임신돈 관리
Quản lý lợn mang thai 11

4. 포유모돈 관리
Quản lý lợn nái đang cho bú 15

5. 포유자돈 관리
Quản lý lợn con bú mẹ 18

6. 이유자돈 관리
Quản lý lợn con cai sữa 21

7. 육성 및 비육돈 관리
Quản lý lợn choai và lợn vỗ béo 23

8. 출하관리 및 도축
Quản lý xuất chuồng và mổ thịt 29

9. 기타 관리사항
Nội dung quản lý khác 31

– 차단방역
Hướng dẫn phòng dịch tại trang trại 31

– 백신접종 매뉴얼
Hướng dẫn tiêm phòng vắc-xin 33

10. 부록 : 양돈 용어 해설
Phụ lục: Chú giải thuật ngữ chuyên ngành chăn nuôi lợn 41

외국인 근로자 원활한 소통을 위한

Kỹ năng giao tiếp tốt với người lao động nước ngoài

양돈 사양관리 매뉴얼

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn

1. 웅돈 및 후보돈 관리 Quản lý lợn đực và lợn nái hậu bị

후보돈들은 적응기간이 얼마나 필요해요?
Mất bao lâu để lợn nái hậu bị thích nghi hoàn toàn với trang trại a?
보통, 체중이 90~105kg 정도가 되는 150~180일이지.
Thường thì mất khoảng 150-180 ngày, khi lợn nặng 90-105 kg.
그 땐 어떻게 관리해요?
Sau đó, chúa sẽ chăm sóc chúng thế nào a?
① 우선, 사료는 후보돈 또는 육성돈 사료를 주고,
① Đầu tiên, cho chúng ăn thức ăn dành riêng cho lợn nái hậu bị hoặc lợn choai,
② 개체카드를 만들어 생일이나 전입일 백신예정일 등을 적어두고,
② Làm thẻ theo dõi cá nhân để ghi ngày sinh của chúng, ngày chuyển đến, ngày tiêm vắc-xin v.v...,
③ 이동한 날은 충분한 물과 사료를 줘야 해,
③ Cho chúng uống đủ nước và cho ăn đủ lượng thức ăn ngay từ ngày chuyển đến,
④ 최초 입식 시에는 광범위 항생제 주사를 2일간 주고,
④ Quản lý tiêm phòng giun sán diện rộng trong 02 ngày đầu kể từ khi chúng ăn bữa ăn đúng đầu tiên.
후보돈
water
또, 도입 후 1주내 스트레스 완화제(영양제, 전해질) 주사 및 구충을 꼭 하고,
도입 후 2~4주간 편하게 놀게 해서 농장에 적응시키지.
Tiêm cho chúng liều thuốc giảm căng thẳng (chất bổ sung dinh dưỡng, chất điện giải) và tẩy giun trong tuần đầu tiên khi vừa chuyển đến, thuần dưỡng trong thời gian từ 2-4 tuần để chúng thích nghi hoàn toàn với trang trại.
조명은 항상 켜두나요?
Lúc nào cũng bật đèn a?
오, 좋은 질문이야.
후보돈은 번식성적 향상을 위해 하루 12시간 점등이 필요해.
Đó là một câu hỏi hay.
Lợn nái hậu bị cần được chiếu sáng12 tiếng mỗi ngày để tăng khả năng sinh sản.

그렇구나
그럼 후보돈도 시기별로 관리방법이 달라지나요?
Cháu hiểu rồi Vậy, cách quản lý lợn nái hậu bị có khác nhau theo mùa không ạ?
그럼. 도입 후 2개월쯤 되면 체중은 대략 120kg쯤 되지. 이 때 임신돈 사료를 급여해야 하는데, 살찐 상태에 따라 2~3kg 내외로 제한급여하면서 체형을 살펴야 해.
Tất nhiên rồi. Hai tháng từ sau khi chuyển đến, chúng nặng khoảng 120 kg. Cho chúng ăn thức ăn dành cho lợn mang thai, kiểm tra hình dáng cơ thể và cho ăn trong giới hạn từ 2-3kg tùy theo cân nặng.
120KG
발정이 관찰되면 어떻게 하죠?
Cháu nên làm gì khi lợn động dục ạ?
초발정 유도를 위해 돈돈을 하루에 두 번 (정해진 때) 접촉하여 2~3번째 정도에 강발정이 되도록 유도해야 해.
Để kích thích chúng động dục lần đầu, cho lợn nái tiếp xúc với lợn đực 02 lần/ngày (vào thời điểm nhất định). Trong kỳ động dục mạnh, nên cho tiếp xúc 02 lần hoặc 03 lần.
그렇구나~
그럼 교배는 언제 결정해요?
Cháu hiểu rồi. Vậy khi nào cho chúng giao phối ạ?
등지방, 체형, 체중, 일령 등을 따져봤을 때, 225~250일령, 체중 135~145kg, 정도가 교배적기지.
Nếu căn cứ vào mỡ lưng, hình dáng cơ thể, cân nặng, tuổi tác thì thời kỳ giao phối tối ưu là khi chúng từ 225 -250 ngày tuổi và nặng 135-145 kg.
또, 다른 특이점이 있나요?
Có đặc điểm nào khác nữa không ạ?
응. 발정과 교배가 시작되는 3개월쯤 되면 체중이 145kg정도가 되는데, 이 땐 포유돈 사료를 줘야 해.
Có chứ. Thời kỳ động dục và giao phối sẽ bắt đầu vào tháng thứ 3 sau khi chúng chuyển đến, khi chúng nặng khoảng 145 kg. Lúc này, nên cho ăn thức ăn dành cho lợn nái cho bú.
다시 정리하면, ① 첫 교배 2주 전에 강정사양을 위해 개체관리가 가능한 임신스톨로 이동하고, ② 배란수 증대를 위해 교배 2주전 포유돈 사료 3kg 내외 급여하고, ③ 교배예정 2주전에 내·외부 구충을 실시하고, ④ 발정주기 3~4일전 돈돈 접촉 강화로 과배란을 유도하고, ⑤ 교배예정 일주일 전에는 백신 접종을 전부 마쳐야 하지. 휙휙...
① 2 tuần trước lần giao phối đầu tiên, chuyển chúng đến chuồng dành riêng cho lợn mang thai - nơi có hệ thống quản lý phun rửa cá nhân ② 2 tuần trước khi giao phối, cho chúng ăn khoảng 3 kg thức ăn để tăng số lượng trứng rụng. ③ 2 tuần trước ngày giao phối, kiểm tra giun sán trong và ngoài cơ thể, ④ Từ 3-4 ngày trước kỳ giao phối, tăng số lần cho gặp con đực để kích thích trứng rụng, và ⑤ 1 tuần trước ngày dự kiến giao phối, hoàn tất tiêm ngừa tất cả các loại vắc-xin.
아하! 이 때는 더 신경 쓸것이 많네요...
À! Có nhiều điểm cần lưu ý vào thời điểm này...
생각보다 복잡하지만 파이팅 해볼게요!
Việc này phức tạp hơn cháu nghĩ. Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức!

2. 이유모돈(종부 대기돈) 관리

Quản lý lợn nái cai sữa (lợn dùng để phối giống)


종부는 대부분 인공수정으로 돼지를 생산해.
Thường phối giống cho lợn bằng thụ tinh nhân tạo.
인공수정이요?
Thụ tinh nhân tạo ấy ạ!
응. 인공수정용 액상정액은 17~18℃에 보관하고, 3일 정도 이내에 수정시키지. 정액주입은 어렵진 않지만 절차를 잘 지켜야 해.
Đúng rồi. Tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo cần được bảo quản ở 17-18℃ và phải sử dụng để thụ tinh trong vòng 3 ngày. Không quá khó để đưa tinh dịch vào bên trong, nhưng cần thực hiện theo đúng quy trình.
인공수정 순서는, ① 종부직기 모든을 반성시키고, ② 외음부를 청결하게 하고, ③ 정액주입기에 윤활제를 묻혀 끝이 요도 입구로 들어가지 않도록 잘 삽입 해야 해.
Tiến hành thụ tinh nhân tạo theo quy trình như sau: ①Vào thời điểm thụ tinh tối ưu, giữ cho lợn nái ổn định, ②Rửa sạch âm hộ, ③Bôi trơn que phối tinh nhân tạo, đưa dần que phối tinh vào bên trong, chú ý không đưa phần cuối của que phối tinh vào trong niệu đạo đang mở.
휴~ 시간이 많이 걸리겠어요?
Ồ... Sẽ mất nhiều thời gian lắm nhỉ?
모든 일엔 정성이 필수야! 인공수정이 끝나면 돼지를 쉬게 하고, 수정일자, 시간, 정액량 등을 기록하고.
Cháu cần cố gắng hết sức trong mọi việc! Sau khi kết thúc thụ tinh nhân tạo, cháu cần để lợn nghỉ ngơi và ghi lại ngày giờ thụ tinh, tên tinh dịch, v.v....
수고 많이 하셨어요. 임신이 잘 돼야 할 텐데... 우리 돼지들도 고생 많았어!
Cảm ơn chú đã giải thích. Đàn lợn cũng vất vả nhiều rồi!

3. 임신돈 사양관리

Quản lý thông số kỹ thuật cho lợn mang thai



구분 Phân loại	오 전 Sáng	오 후 Chiều
월요일 Thứ Hai	발정체크 Kiểm tra thời kỳ động dục	분뇨처리 작업, 발정체크, 종부 Xử lý phân chuồng, kiểm tra thời kỳ động dục, Phối giống
화요일 Thứ Ba	종부 Phối giống	종부 Phối giống
수요일 Thứ Tư	종부 Phối giống	종부, 분변예찰돈 내외부 구충 Phối giống, kiểm tra giun bên trong và bên ngoài cho lợn mẹ sắp sinh
목요일 Thứ Năm	종부, 이유모돈 전입, 도태모돈 판단 Phối giống, chuyển lợn mẹ cai sữa đến nơi khác, lựa chọn lợn mẹ bị đào thải	종부, 후두부 백신접종 Phối giống, tiêm vắc-xin vào vùng gáy
금요일 Thứ Sáu	모돈 백신접종, 임신진단, 도태모돈 판단 Tiêm vắc-xin cho lợn mẹ, kiểm tra thai sản, lựa chọn lợn mẹ bị đào thải	모돈스톨 정리 Bố trí chuồng riêng cho lợn mẹ
토요일 Thứ Bảy	사료량 조절(체형점 체크), 분만예정돈 전출 Điều chỉnh lượng thức ăn (kiểm tra chấm điểm thể trạng), chuyển lợn sắp sinh đến nơi khác	임신사 수세, 웅돈포피 소독 Rửa sạch chuồng riêng dành cho lợn mang thai, diệt khuẩn lớp da ngoài của lợn đực
일요일 Chủ Nhật	기본 사양관리 Kiểm tra thông số kỹ thuật cơ bản	기본관리, 발정체크 Quản lý cơ bản, kiểm tra thời kỳ động dục







Điểm	Độ dày mỡ lưng (mm)	Tình trạng	Hình dạng cơ thể
1	<15	Hốc hác	Có thể nhìn thấy rõ xương chậu, xương sống
2	15 - 18	Gầy	Có thể dễ dàng sờ thấy xương chậu, xương sống mà không cần nhấn
3	18 - 20	Lý tưởng	Phải ấn mạnh mới sờ thấy xương chậu, xương sống
4	20 - 23	Béo	Không thể sờ thấy xương chậu, xương sống
5	>23	Quá béo	Có lớp mỡ dày bọc xương chậu, xương sống


아하! 그럼 임신하면 사료는 어떻게 줘요?
Cho lợn mang thai ăn thế nào ạ?
대개 오전 7시와 오후 4시에 사료통을 청소하고 주지.
Châu cho chúng ăn 02 lần/ngày, vào 7 giờ sáng và 4 giờ chiều sau khi rửa sạch máng ăn.
물은 많이 먹나요?
Chúng uống nhiều nước không ạ?
가루 사료는 물이 많이 먹히지. 임신돈은 하루 10~18ℓ의 물을 충분히 섭취할 수 있도록 니플을 설치하고, 유속(1.5ℓ/분)도 수시로 확인해야 해.
Uh, lợn uống khá nhiều nước vì chúng ăn thức ăn dạng bột. Lợn mang thai cần từ 10-18 lít nước mỗi ngày; vì vậy, cần lắp đặt một vòi nước nhỏ để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước và thường xuyên kiểm tra tốc độ dòng chảy (1.5l/min).
돼지는 살이 쪄서 더위를 많이 타겠어요.
Cháu đoán là lợn nhạy cảm với nhiệt độ vì chúng béo.
맞아, 더위에 약하기 때문에 온도관리가 굉장히 중요해.
Đúng rồi. Vì vậy, việc kiểm soát nhiệt độ rất quan trọng trong chăn nuôi lợn.
돈사온도는 13~27℃ 사이에 있어야 하고, 50~60%의 습도가 적당하지.
Nhiệt độ chuồng lợn nên được duy trì ở mức từ 13 đến 27 ℃. Độ ẩm nên được duy trì từ 50-60%.

또, 임신돈은 임신하기 전 체형점수를 2.5로 유지해주고, 새끼 낳을 곳을 미리 청소해야겠지?
Duy trì điểm thể trạng của lợn mang thai ở mức 2.5; chuẩn bị trước và vệ sinh sạch sẽ nơi lợn sinh.
하하하! 사람이 시집갈 때랑 비슷하네요? 그럴 줄 알고 벌써 분만사의 스톨을 깨끗하게 들청소해 놨지요.
Hahaha! Giống như cách mọi người chuẩn bị đám cưới vậy. Cháu đã rửa sạch chuồng nhốt riêng rồi.
파! 이젠 쌤님도 척척 알아서 잘하네. 다음 임신돈들을 위해 1주일 단위로 미리 준비하는 것도 잊지마!
Giỏi lắm. Tuy ta không giúp nhưng cháu vẫn đang làm rất tốt. Đừng quên chuẩn bị chuồng nhốt riêng cho lợn mang thai hàng tuần nhé.
계속 새끼를 낳을 수 있게 하는 거군요. 그럼 매일 수정한 암퇘지를 관찰해야겠군요?
Nghĩa là chúng có thể tiếp tục sinh lợn con. Vì vậy, hàng ngày, phải theo dõi lợn nái đã thụ tinh đúng không ạ?
맞아. 일반적으로 인공수정 후 사료양은 1.8~2.2kg (1회 900g : 정상 모돈, 1,000g : 마른 모돈)으로 제한하지. 초산일 경우는 0.1~0.2kg을 줄이고, 겨울에는 0.2~0.4kg 더 주고.
Đúng vậy. Thông thường, sau khi thụ tinh nhân tạo, cần giới hạn lượng thức ăn ở mức 1,8 – 2,2 kg (900g/bữa đối với lợn nái có cân nặng bình thường, 1.000g/bữa đối với lợn nái nhẹ cân). Nên giảm từ 0,1 – 0,2 kg trong lần sinh nở đầu tiên và tăng từ 0,2 – 0,4 kg vào mùa đông.
조금 까다롭지만 임신했으니까 특별대우를 해줘야죠.
Lợn mang thai cần được chăm sóc đặc biệt.
그렇지. 임신 초기에는 절대 안정 하고, 위생에 신경 써야 하지.
Tất nhiên rồi. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, chúng cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Cháu phải giữ vệ sinh máng ăn.


인공수정 후 30~45일 이후에도
재발정이 될 수 있으니 확인이 필요해.
체발정 3.0점도가 적당해.
Cần kiểm tra kỹ vì lợn nái có
thể tái động dục sau
30 – 45 ngày từ khi thụ tinh nhân tạo.
Điểm thể trạng phù hợp là 3.0.
마~ 네.
아직 임신이 안정적이지 못한 거군요...
Vâng ạ.
Việc mang thai có vẻ chưa ổn định lắm.
임신말기 임돼지는 영양분이 더 필요해서
사료를 매일 2.6~3.0kg 정도로 더 줘야 해.
Ở giai đoạn cuối thai kỳ, vì lợn nái cần thêm
dinh dưỡng nên tăng lượng thức ăn lên
mức từ 2,6 – 3,0 kg mỗi ngày.
맞아요.
새끼가 무럭무럭
자랄 시기죠?
Đây là lúc thai
phát triển nhanh
đúng không ạ?
응.
그리고 분만 2주 전에는 구충제도 주고.
Đúng vậy. Và ta cần tẩy giun cho
chúng 2 tuần trước khi sinh.
분만 준비를 하는 거네요?
몸이 깨끗해야 새끼한테도 좋겠네요?
Chuẩn bị để lợn sinh ạ?
Cháu nghĩ là cơ thể của lợn nái phải sạch sẽ
để không ảnh hưởng xấu đến lợn sơ sinh.
응. 좁은 세척과 소독을 하고,
분만 일주일 전에 분만사로 미듬하지,
분만 전에는 사료를 줄여야 난산을 예방할 수 있어.
Đúng rồi. 1 tuần trước ngày dự sinh, lợn mẹ
được chuyển đến chuồng sinh sau khi được khử trùng.
Nên giảm lượng thức ăn trước khi lợn sinh
để đề phòng trường hợp khó sinh.
마~ 그렇군요.
À, cháu hiểu rồi!

4. 포유모돈 관리 Quản lý lợn nái đang cho bú

새끼는 언제쯤 나와요?
Khi nào lợn nái sinh ạ?
양수가 터진 후,
1~2시간 후, 5~30분마다 1마리씩 낳아,
총 10~15마리 전부를 출산하는데,
2~3시간 정도 걸리지.
Chúng bắt đầu sinh từ 1 - 2 giờ sau khi vỡ ối. Mỗi con lợn con được sinh cách nhau từ 5 - 30 phút. Mất khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ để sinh 10 - 15 lợn con.
네? 그렇게 오랫동안 그렇게 많이요?
Sao cơ? Lâu và nhiều con đến thế ạ?
아기가 나오려고 해.
아이고, 배 아파~~끌~!
Hình như bọn trẻ sắp ra đời! Ôi đau quá~
와! 정말 귀엽고 신기하네요.
Ôi Thật đáng yêu và tuyệt vời.
어미돼지는 특별한 사양관리가 필요해.
분만을 하면 베타딘을 물에 타서 유방과 배에 골고루 발라주고.
Lợn mẹ cần có chế độ ăn uống và quản lý đặc biệt. Khi lợn sinh, hòa thuốc Betadine với nước và thoa đều lên toàn bộ vú và bụng.
많이 힘들었지? 내가 도와줄게.
Mệt lắm đúng không? Hãy để mình giúp nhé.
분만한 돼지는
분만 당일에는 사료를 주지 말고,
필요한 경우 사료 통에 물을 채워서
갈증을 해소해 주는 것이 좋아.
Sau khi lợn sinh, không nên cho ăn vào ngày chúng sinh con. Nếu cần, chỉ đổ đầy nước vào máng ăn để chúng uống cho đỡ khát.
그렇군요.
새끼 낳느라 고생했어, 돼지야~
Đúng rồi. Lợn à, làm tốt lắm~

난산이 되면 새끼돼지 생산에 큰 차질이 생기므로 항상 잘 관찰하고 처치해야 해.
Sinh khó có thể gây cản trở cho việc sản sinh lợn con. Vì vậy, phải luôn luôn quan sát kỹ và xử lý cẩn thận.
난산이요?
Sinh khó ấy ạ?
흥, ① 다음 새끼가 30분이상 경과해도 나오지 않은 경우, ② 분만 간격이 1시간 이상인 경우 등 다양하지.
Đúng vậy. Có thể nhận biết sinh khó bằng các dấu hiệu sau: ① Không sinh được lợn con tiếp theo sau 30 phút hoặc hơn, ② Khoảng cách giữa các đợt sinh kéo dài hơn 1 giờ...
아이쿠! 아무 일 없이 새끼가 잘 나와야 하는데.
Ôi không! Mong sao lợn con được an toàn...
흐, 난산 가능성이 높은 어미돼지는 주의해서 살펴야 해.
Cần chú ý theo dõi thật kỹ lợn mẹ có nhiều nguy cơ khó sinh.
난산이 되면 어떻게 해요?
Làm thế nào khi lợn mẹ sinh khó?
우선, 모든을 일으켜서 반대방향으로 눕히고, 산도를 재조정하는 거야.
Trước hết, nâng đỡ lợn mẹ theo hướng ngược lại để điều chỉnh lại ống dẫn sinh.
네, 잘 관찰할게요.
Vâng. Cháu sẽ chú ý quan sát.
새끼를 낳은 모든은 젖을 만들어야 하기 때문에 이유 시 체형상이 2.5 정도로 유지되도록 하는 게 매우 중요해!
Một điều rất quan trọng đối với lợn sau sinh là duy trì điểm thể trạng ở mức 2,5 để tạo sữa.
분만 다음날부터 1kg씩 늘려서 5~7일째에 7~8kg까지 먹을 수 있도록 해야 해.
Nên tăng thêm 1 kg thức ăn, tức là cho lợn ăn từ 7-8 kg thức ăn vào ngày thứ 5-7 sau khi sinh.
흐, 지방, 포도당을 첨가하기도 하는데, 사료섭취량이 많아질수록 여러 번 나눠서 주지.
Ngoài ra, còn cho thêm chất béo và đường vào thức ăn. Nếu lợn ăn nhiều thì chia thành nhiều đợt để thêm vào.
많이 먹고 힘내!
Lợn ăn nhiều và khỏe nhé!

5. 포유자돈 관리 Quản lý lợn con bú mẹ

분만사 주간관리 스케줄 표
Lịch làm việc tuần để giám sát chuồng sinh

분만 후 처음 나온 젖은 면역력을 높여주기 때문에
12시간 이내에 반드시 먹여야 해.
Sữa non của lợn mẹ giúp tăng cường sức đề kháng cho lợn con. Vì vậy, phải cho lợn con uống sữa non trong vòng 12 giờ sau khi sinh.
돼지는 뒷다리 쪽의 젖꼭지보다
가슴 쪽 젖꼭지에서 젖이 많이 나오기 때문에
체중이 작은 새끼돼지를
발목 젖꼭지에 포유할 수 있게 해주고.
Các núm vú ở phần ngực tiết sữa nhiều hơn các núm vú phía chân sau.
Vì vậy, đặt những con lợn con nhẹ cân tại các núm vú phía chân trước để cho bú.
오호~ 그렇군요.
Cháu hiểu rồi.
자, 이제 꼬리를 잘라 줄까?
Bây giờ, chúng ta cắt đuôi cho chúng nhé?
예에? 꼬리는 또 왜 잘라요?
Sao ạ?
Tại sao phải làm thế hả chú?
돼지는 꼬리를 무는 행동을 해.
그래서 애벌 차원에서 잘라주는 거야.
Lợn con thường cắn đuôi nhau.
Vì vậy, phải cắt đuôi nó để ngăn chặn tình trạng này xảy ra.
정말 독특하네요...
Loài lợn có thói quen thật là...
길이가 다르면 꼬리 물기를 유발할 수 있으니까,
모두 똑같은 길이로 잘라야 돼.
또, 태어난 지 3일 안에 철분주사를 놔주고.
Đuôi lợn con phải được cắt bằng nhau. Vì chúng sẽ cắn đuôi nhau nếu độ dài đuôi khác nhau.
Ngoài ra, cần phải tiêm sắt trong vòng 03 ngày sau khi sinh.
철분주사요?
Tiêm sắt ạ?
새끼돼지는 태어난 지 1주일 내 2배, 3주일에는 3배 가깝게
급격히 크기 때문에 필요한 철분요구량에 턱없이 부족해.
그래서 철분주사를 3일령에 2회씩 1회 근육주사를 하고,
생후 3일 이후 1주일 내에 거세도 하지.
Trong 1 tuần sau khi sinh, lợn con lớn gấp đôi so với kích cỡ ban đầu và lớn gấp ba lần sau 3 tuần.
Theo đó, chúng cần nhiều chất sắt để tăng trưởng.
Thế nên chúng ta sử dụng phương pháp tiêm bắp để tiêm sắt vào ngày thứ 3 sau khi sinh. Thêm nữa, phải thiến lợn trong vòng 1 tuần kể từ ngày thứ 3 sau sinh.
아~ 네. 젖떼기는 언제쯤 해요?
Cháu hiểu rồi. Khi nào bắt đầu cai sữa ạ?



포유자돈 온도관리

Kiểm soát nhiệt độ dành cho lợn con bú mẹ

구분 Phân loại	분만 당일 Ngày sinh	2~3일령 Ngày 2 - ngày 3 sau sinh	4~5일령 Ngày 4 - ngày 5 sau sinh	6~7일령 Ngày 6 - ngày 7 sau sinh	8~9일령 Ngày 8 - ngày 9 sau sinh	10~11일령 Ngày 10 - ngày 11 sau sinh	12~13일령 Ngày 12 - ngày 13 sau sinh	14일령 이상 Từ sau ngày 14 sau sinh
적온(℃) Nhiệt độ thích hợp (℃)	37~38	36	35	34	33	32	31	30

6. 이유자돈 관리 Quản lý lợn con cai sữa

온도 관리 Kiểm soát nhiệt độ

주령 Tuần tuổi	체중(kg) Cân nặng (kg)	체적온도 Nhiệt độ thể tích	적온범위 Nhiệt độ tối ưu	돈사온도 Nhiệt độ chuồng lợn	습도 % Độ ẩm %	비고 Ghi chú
젖떼기 ~ 7주령 Cai sữa tuần thứ 7	5,5~13,5	25	24~30	20~25	50~60	어린돼지에 대한 보온대책 강 (보온등 등) Tăng cường các biện pháp sưởi ấm cho lợn con (đèn sưởi...)
7~9주령 Cai sữa tuần thứ 7 – thứ 9	13,5~23	23	21~27			

이유 자돈방 적정 수용두수(1㎡ 당)

Số lượng đầu lợn phù hợp với sức chứa của chuồng lợn cai sữa (trên 1㎡)

체중(kg) Cân nặng (kg)	콘크리트 Chuồng bê tông	부분슬랏 Chuồng có khe hẹp một phần	전면슬랏 Chuồng có khe hẹp
5	7,5	7,6	8,8
10	4,9	5,5	6,1
15	3,7	4,3	4,8
20	3,0	3,6	3,9

사료관리 Quản lý thức ăn

구 분 Phân loại	사료급여방법 Phương pháp cho ăn	3주령젖떼기 Cai sữa tuần thứ 3	4주령젖떼기 Cai sữa tuần thứ 4
젖떼기 당일 Ngày bắt đầu cai sữa (Ngày thứ 1)	- 젖 뗀 후 12시까지 3시간은 사료급여 금지 Không cho ăn trong 3 tiếng từ sau khi cai sữa đến 12 giờ. - 정오 12시 사료급여 Cho ăn vào lúc 12 giờ trưa - 어린돼지를 관찰하여 사료통이 비어 있으면 사료 추가 급여(오후 2시, 4시, 6시에 각각 급여) Theo dõi lợn con và cho thêm thức ăn nếu máng ăn trống (cho ăn vào buổi chiều lúc 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ). - 어린돼지를 관찰하고 청소한 후 사료조에 약 12㎜두께로 사료 급여 Theo dõi lợn con và cho lợn ăn với lượng thức ăn có độ dày khoảng 12 mm trong máng.	두당 사료섭취량은 30 ~ 40g Lượng thức ăn hấp thụ trên 01 đầu lợn : 30 - 40g 10두당 0.5kg이하 급여 Cho ăn khoảng 0.5kg/10 đầu lợn hoặc ít hơn	두당 사료섭취량은 40 ~ 60g Lượng thức ăn hấp thụ trên 01 đầu lợn : 40 - 60g 10두당 0.7kg이하 급여 Cho ăn khoảng 0.7kg/10 đầu lợn hoặc ít hơn
다음 2일 Ngày thứ 2	- 오전 8시 어린돼지 관찰 후 청소 : 약 12㎜두께로 사료 급여 Vào 8 giờ sáng: Sau khi theo dõi lợn con, tắm và cho chúng ăn với lượng thức ăn có độ dày khoảng 12mm. - 오전 11시, 오후 3시 사료급여 Cho ăn lúc 11 giờ sáng và 3 giờ chiều - 오후 7시 분 상태를 보고 밤에 섭취할 양만큼 사료를 자유채식 Vào lúc 7 giờ tối, theo dõi trạng thái của lợn con và cho ăn rau với số lượng vừa đủ vào ban đêm	두당 사료섭취량은 60 ~ 80g Lượng thức ăn hấp thụ trên 01 đầu lợn : 60 - 80g 10두당 0.8kg이하 급여 Cho ăn khoảng 0.8kg/10 đầu lợn hoặc ít hơn	두당 사료섭취량은 70 ~ 100g Lượng thức ăn hấp thụ trên 01 đầu lợn : 70 - 100g 10두당 1kg이하 급여 Cho ăn khoảng 1kg/10 đầu lợn hoặc ít hơn
3일 Ngày thứ 3	- 어린돼지의 상태를 면밀히 관찰 Theo dõi chặt chẽ tình hình của lợn con - 사료섭취량, 분 상태 등 문제가 없으면 2~3배 양의 사료를 급여 Cho ăn với lượng thức ăn nhiều gấp 2 – 3 lần nếu không phát sinh các vấn đề như lượng hấp thụ thức ăn, tình trạng của lợn....		

7. 육성·비육돈 관리 Quản lý lợn choai và lợn vỗ béo

육성·비육돈사 주간관리 스케줄 표

Lịch làm việc tuần để quản lý chuồng dành cho lợn choai/lợn vỗ béo

구분 Phân loại	월요일 Thứ Hai	화요일 Thứ Ba	수요일 Thứ Tư	목요일 Thứ Năm	금요일 Thứ Sáu	토요일 Thứ Bảy	일요일 Chủ Nhật
오전 Sáng	깔짚교체 수세소독 Rửa cạch/ khử trùng chuồng chờ lợn chuyển vào 출하 Xuất chuồng	자돈전입 Chuyển lợn con vào 출하 Xuất chuồng	환돈치료 및 정리 Điều trị và xử lý lợn bệnh 출하 Xuất chuồng	자돈사 이유지원 Hỗ trợ cai sữa tại chuồng cho lợn con 출하 Xuất chuồng	돈단사 백신지원 Hỗ trợ tiêm vắc-xin tại chuồng sinh 출하 Xuất chuồng	돈방수리 Sửa chữa chuồng lợn	기본사항 점검 Kiểm tra thông số kỹ thuật cơ bản
오후 Chiều	자돈전입 준비 Chuẩn bị chuyển lợn con vào 출하돈 선별 Chọn lợn xuất chuồng	분뇨처리 Quản lý phân chuồng 출하돈 선별 Chọn lợn xuất chuồng	출하돈 선별 Chọn lợn xuất chuồng	환돈치료 Điều trị lợn bệnh 출하돈 선별 Chọn lợn xuất chuồng	백신 (APP 2차 10주령) Vắc-xin (Tiêm APP lần 2 sau khi sinh 10 tuần) 출하돈 선별 Chọn lợn xuất chuồng	전체적 정리 Sắp xếp tổng thể	

육성·비육돈사 내부 온도는 15~20℃ 정도, 습도는 50~60% 정도를 유지해 주는 게 좋아.
Duy trì nhiệt độ bên trong của chuồng lợn choai - lợn vỗ béo ở mức 15-20℃ với độ ẩm 50 - 60%.
돼지는 온도만 맞춰주면 되지 않을까요?
Chỉ cần quản lý nhiệt độ là được đúng không ạ?
아니, 돼지들은 습도에 따라 체감도가 다른데, 같은 온도라도 습도가 높으면 체감온도는 더 높게 나타난다네.
Không hẳn vậy. Lợn cảm nhận nhiệt độ khác nhau tùy theo độ ẩm. Tuy ở cùng nhiệt độ nhưng lợn cảm nhận nhiệt độ cao hơn nếu độ ẩm cao.
아하! 그렇군요.
Cháu hiểu rồi.
이렇게 온도와 습도를 관리하자면 적절한 환기가 중요하겠지?
Thông gió hợp lý cũng quan trọng như kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.
넵! 알겠습니다!
Vâng ạ! Cháu hiểu rồi!
쌈님! 내일 새끼돼지들 육성돈방으로 옮기는 거 맞지?
Samnang ài! Cháu có biết lợn con cần được chuyển đến chuồng lợn choai vào ngày mai chứa?
네. 하지만 뭘 준비해야 할 지 잘 모르겠어요.
Có ạ! Nhưng cháu không biết mình phải làm gì cả.
먼저, 돼지들을 옮길 때는 돈사단위 또는 돈방단위로 한꺼번에 넣고 한꺼번에 빼내야 돼. 청소와 소독도 깨끗하게 해주는 게 좋겠지?
Trước hết, khi di chuyển lợn, phải di chuyển vào và ra cùng một lúc theo từng chuồng nuôi hoặc ô nuôi. Cũng phải vệ sinh và khử trùng nữa, đúng không nào?

네. 깨끗한 집으로 들어오면 낯선 곳으로 가는 스트레스도 좀 덜 받고, 돼지들이 기분이 좋겠네요. 사료나 물도 준비하구요.
Vâng ạ! Lợn sẽ cảm thấy tốt hơn và ít căng thẳng khi được chuyển đến ngôi nhà mới sạch sẽ. Chuẩn bị cả thức ăn và nước uống nữa.
그렇지. 수도관이나 니플도 막히거나 고장난 것은 없는지 점검 해야겠지.
Đúng vậy. Kiểm tra xem ống nước hoặc vòi nước có bị tắc hoặc hư hỏng hay không nhé.
네. 지금 바로 확인해 볼게요.
Vâng ạ! Cháu đi kiểm tra ngay.
오늘 새끼돼지를 특설돈사에 입식해야 하는데 새끼돼지를 지나갈 통로는 점검해 봤어?
Cháu đã kiểm tra lối đi để lợn di chuyển chưa? Hôm nay, chúng ta phải chuyển lợn con vào chuồng lợn choai đấy.
통로요? 돈방만 둘러보고 왔는데요?
Lối đi ấy ạ? Cháu chỉ kiểm tra chuồng lợn.
새끼돼지를 이동시킬 때는 미동통로도 점검을 해서 새끼돼지들이 호기심을 가질만한 물건이나 사료 등이 없는지 확인해보고 치우는 게 좋아.
Cháu nên kiểm tra lối đi của lợn khi chúng di chuyển và loại bỏ tất cả các vật kích thích tính hiếu kỳ của lợn (đồ đạc, thức ăn...).
그래야 새끼돼지들이 한눈 안 팔고 돈방으로 잘 들어가겠군요.
Cháu hiểu rồi. Nếu làm như vậy lợn sẽ tập trung đi thẳng vào chuồng.
또, 돼지는 체중에 따라서 돈방 면적당 적정한 마리수를 넣어야 해. 지금 돼지들이 보통 25kg 정도 되니까 1㎡당 3.4두 정도를 넣으면 돼. 돼지들이 크는 걸 봐서 두수를 조절해 주고.
Số lượng đầu lợn trên một đơn vị diện tích được quyết định tùy theo cân nặng. Hiện nay, lợn nặng khoảng 25 kg. Vậy, cháu đặt 3,4 con lợn trên 1 m² là hợp lý. Cháu điều chỉnh số lượng tùy theo kích cỡ của lợn.
돼지들이 편하게 지낼 수 있게 하는 거네요?
Nên để chúng được thoải mái đúng không ạ?
1m
3.4

돈반 1㎡당 체중별 적정 수용두수
Số lượng đầu lợn có thể chứa trên 1㎡ theo cân nặng

체중(kg) Cân nặng (kg)	콘크리트 돈사 Chuồng bê-tông	부분슬땅 돈사 Chuồng phân khe một phần	전면슬땅 돈사 Chuồng phân khe toàn phần
25	2,6	3,1	3,4
30	2,3	2,7	3,0
35	2,1	2,5	2,7
40	1,9	2,2	2,4
45	1,7	2,1	2,3
50	1,6	1,9	2,1
55	1,5	1,8	2,0
60	1,4	1,4	1,9
65	1,4	1,4	1,8
70	1,3	1,7	1,7
75	1,2	1,3	1,6
80	1,2	1,6	1,5
85	1,2	1,3	1,5
90	1,1	1,2	1,4
95	1,1	1,5	1,4
100	1,0	1,2	1,3
105	1,0	1,1	1,3
110	1,0	1,5	1,2
115	0,9	1,1	1,2

맞아. 또, 사료는 돼지가 약 48~95kg 정도가 될 때까지는 육성돈사료를 주고, 그 이후에는 출하할 때까지 비육돈사료를 주면 되네.
Đúng rồi. Phải cho lợn ăn thức ăn dành cho lợn choai đến khi đạt cân nặng khoảng 48 - 95 kg. Sau đó, cho ăn thức ăn dành cho lợn vỗ béo đến khi xuất chuồng.
네. 근데 사료는 하루에 몇 번 주나요?
Vâng ạ. Vậy cho lợn ăn bao nhiêu lần trong 01 ngày ạ?
하루에 2번 일정한 시간에 주는 것이 좋다네.
Nên cho chúng ăn hai lần trong một ngày vào giờ cố định.
사람들이 하루 세끼를 나눠 먹는 것과 같네요?
Giống như con người ăn ba bữa một ngày vậy ạ.
그럼그럼. 과식이나 폭식하지 않고 건강하게~
Đúng rồi. Lợn sẽ khỏe mạnh nếu không tạp ăn hoặc ăn quá nhiều.
사장님! 사료를 먹다보면 목이 마를 것 같아요.
Ông chủ ơi, lợn sẽ khát nước nếu chỉ ăn thức ăn.
맞아. 물은 언제든지 충분히 먹을 수 있도록 니플 높이도 잘 높이에 맞게 계속 조절해야 해. 니플 1개당 10마리 정도가 먹을 수 있도록 하면 되네.
Đúng rồi. Phải điều chỉnh độ cao của vòi nước thích hợp với chiều cao của mõm lợn để đảm bảo cung cấp đủ nước cho chúng. Một vòi nước phải đủ dùng cho 10 con lợn.
너무 높거나 낮지 않게!
Không quá cao và không quá thấp.
그리고, 돈방 온도를 적당하게 유지해 주는 것도 중요하다네. 돼지들이 적당한 간격으로 나란히 누워 있어야 온도가 적당하다고 할 수 있지.
Việc đảm bảo duy trì nhiệt độ chuồng ở mức thích hợp cũng rất quan trọng. Phải giữ khoảng cách hợp lý giữa những con lợn thì mới có thể duy trì nhiệt độ thích hợp.
아~ 그럼 돼지들이 너무 몰려있거나 멀리 떨어져 있으면 온도계를 확인하고 온도를 맞춰줘야 하겠군요?
À, cần kiểm tra nhiệt kế và điều chỉnh nhiệt độ nếu lợn tụ lại quá đông hoặc cách nhau quá xa.
우리 쌤답 계셨던걸? 말씀 온도가 낮으면 보온을 해주고, 온도가 높으면 환기를 시키고.
Đúng rồi. Nếu nhiệt độ quá thấp, cháu đóng cửa sổ hoặc bật hệ thống sưởi. Và thông gió khi nhiệt độ quá cao.
네, 알겠습니다.
Vâng ạ. Cháu đã hiểu.

목표체중 미달시 점검사항 Danh mục kiểm tra khi trọng lượng trung bình thấp hơn trọng lượng mục tiêu	조 치 사 항 Phương pháp xử lý
- 이유시 자돈 체중이 적당했는가? Trọng lượng của lợn khi cai sữa đã hợp lý chưa?	- 이유목표 체중을 준수 Tuân thủ trọng lượng mục tiêu dành cho lợn cai sữa.
- 사육밀도는 적절한가? Mật độ lợn trong chuồng có hợp lý không?	- 밀사되지 않도록 조정 Cần điều chỉnh để lợn không bị chết ngạt do bị đè.
- 음수 관리는 제대로 하고 있는가? Có quản lý tốt việc cho lợn uống nước không?	- 물은 깨끗한지? 수압, 나출수 점검 Có đủ nước sạch không? Cần phải kiểm tra áp suất của nước và chất lượng nước từ vòi.
- 돈사내 개체차이가 심한가? Khoảng cách giữa các con lợn trong chuồng có lớn không?	- 돈군재배치보다 돈군분리로 해결 Nên giải quyết bằng cách tách nhóm thay vì sắp xếp lại thành đàn lợn.
- 사료가 부패하지는 않았나? Thức ăn có ôi thiu không?	- 의심되는 사료채취, 냉장보관 후 분석 의뢰 Lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ bị ôi thiu và bảo quản lạnh để mang đi phân tích.
- 사료통은 충분한가? Số lượng máng ăn có đầy đủ không?	- 충분한 사료통 확보 Cần đảm bảo đầy đủ số lượng máng ăn.
- 질병에 걸리지는 않았는가? Có dấu hiệu mắc bệnh không?	- 질병 진단 의뢰 및 컨설팅 Yêu cầu chẩn đoán và tư vấn bệnh.
- 사육단계별로 적합한 사료를 줬는가? Có cung cấp thức ăn đúng theo độ tuổi không?	- 사료회사의 사양표준 준수 Tuân thủ bảng tiêu chuẩn của công ty thức ăn gia súc.
- 돈사 온도나 환기는 적절한가? Nhiệt độ và thông gió bên trong chuồng có phù hợp không?	- 사육단계별 돈사 환경 제공 Tạo môi trường chăn nuôi phù hợp với độ tuổi của lợn.

8. 출하관리 및 도축

Quản lý xuất chuồng và mổ thịt

80cm
90cm
돌아갈 때 ① 이동통로는 경사를 완만하게 하고,
② 통로에 이상한 물건들은 치워야해. 그리고,
③ 바닥은 물이 고이지 않게 약간 거칠게 만들어주고,
④ 통로 양쪽에는 판자나 천을 대서 밖이 보이지 않게 하고,
⑤ 통로의 높이는 80cm, 폭은 90cm로 해서
돼지가 쉽게 돌아설 수 없도록 해야 한다네.
Khi lợn xuất chuồng, ①Thiết lập lối đi có độ nghiêng vừa phải,
② Loại bỏ các vật lạ trên lối đi,
③ Chà nhám mặt sàn để không đọng nước,
④ Đặt tấm bìa hoặc vải màn che hai bên lối đi
để lợn không nhìn thấy cảnh vật hai bên,
⑤ Bố trí lối đi cao 80 cm, rộng 90 cm để lợn không thể
quay đầu trong khi di chuyển.

결국, 돼지들이
싫어하는 부분을 없애고
이동은 쉽게 하는 거네요?
Vâng ạ.
Loại bỏ các chướng ngại vật
để đảm bảo cho lợn di chuyển
dễ dàng đúng không ạ?
음, 그래야 돼지들이
스트레스 안 받고
좋은 고기를 생산할 수 있지.
Đúng rồi.
Nếu làm như thế,
lợn sẽ không bị căng
thẳng và làm tăng chất
lượng thịt lợn.

네!
돌아갈 때 꼭 신경 써서
관리할게요.
Vâng ạ.
Cháu đã hiểu. Khi lợn xuất chuồng,
cháu sẽ làm theo lời dặn của chú.

9. 기타 관리사항 Nội dung quản lý khác

농가 차단방역 요령 Hướng dẫn phòng dịch tại trang trại

● 소독 전 청소 Vệ sinh trước khi khử trùng

● 축사바닥 및 토양 Sàn nhà và đất trong chuồng lợn

● 분변 등 오물 Rác thải, phân chuồng v.v...

● 정문 소독조 및 축사입구 소독조 Bể khử trùng cửa chính và bể khử trùng lối vào chuồng

● 농장 출입구에서의 소독 Khử trùng tại lối vào trang trại



● 출사 출입구에서의 소독 Khử trùng tại lối vào trang trại

● 농장 내·외부 등 소독 Khử trùng trong và ngoài trang trại

● 소독기구 Dụng cụ khử trùng

구제역 백신접종 주의사항

Những lưu ý khi tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng

백신은 반드시 2~8℃에서 냉장 보관.

- 백신은 얼지 않도록 주의하십시오.

Bảo quản vắc-xin trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2-8℃.

- Chú ý không để vắc-xin đông đá.

겨울철은 따뜻하게(20℃ 이하)하여 접종.

- 너무 높은 온도로 끓이면 백신의 효과가 떨어짐.
- 항온수조가 없는 경우 백신을 실내에 두었다가 사용.

Làm nóng vắc-xin trước khi tiêm phòng vào mùa đông (20℃ hoặc thấp hơn hơn).

- Hiệu quả của vắc-xin có thể bị giảm nếu làm nóng vắc-xin ở nhiệt độ quá cao.
- Nếu không có bể ổn nhiệt, đặt vắc-xin ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng.

따뜻하게 한 백신은 사용(주사) 전까지 따뜻하게 유지.

- 백신병을 옷 주머니에 넣거나 보온박스에 보관.
- 주사기, 주사바늘도 따뜻하게 해야 백신의 온도 유지가 잘됨.

Giữ ấm vắc-xin đã được làm nóng cho đến khi sử dụng (tiêm)

- Đặt lọ vắc-xin trong túi áo hoặc bảo quản trong thùng giữ nhiệt.
- Ống tiêm và kim tiêm được giữ ấm nếu duy trì tốt nhiệt độ của vắc-xin.



주사바늘은 1침 5두 이내로 위생적으로 접종.

- 침으로 여러마리 접종 시 주사침이 오염되고 뭉뚝해져서 접종부위 손상되어 이상육이 발생할 수 있음.

Thực hiện tiêm chủng vệ sinh bằng cách sử dụng một đầu kim tiêm để tiêm chủng cho 5 con lợn hoặc ít hơn.

- Khi sử dụng một kim tiêm để tiêm chủng cho nhiều con lợn, kim tiêm có thể bị bẩn và cùn, gây tổn thương vùng tiêm và có thể gây phát sinh bất thường đối với thịt lợn.



1회용 주사기 사용 권장.

- 연속주사기 사용 시 적정량의 백신(2㎖)이 가축 체내에 주입된 것을 확인한 후 주사바늘 제거.

Nên sử dụng bơm tiêm dùng một lần.

- Trong trường hợp sử dụng bơm tiêm liên tục, rút kim tiêm sau khi kiểm tra liều lượng vắc-xin vừa đủ (2 mL) đã được tiêm vào trong cơ thể vật nuôi.



* Tiêm chính xác vào trong cơ bắp
(Đường đứt nét màu xanh)

백신은 근육 안에 정확하게 주입.

- 지방층에 주입되면 이상육이 발생되고 항체형성이 미흡할 수 있음.

Vắc-xin phải được tiêm chính xác vào trong cơ bắp

- Nếu tiêm vào lớp mỡ, có thể gây ra hiện tượng thịt bất thường và kháng thể hình thành không đầy đủ.

질병에 따른 백신 사용법
Phương pháp tiêm phòng vắc-xin theo từng loại bệnh

예방접종명 Tên vắc-xin phòng bệnh	접종시기 Thời gian tiêm chủng	비 고 Ghi chú	주사방법 (근육, 피하) Phương pháp tiêm (Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da)
전염성위장염 + 로타바이러스 감염증 (TGE+ROTA)	모돈 ·1차접종 : 분만 5–6주전 ·2차접종 : 분만 3주전	생독백신	근육
Viêm dạ dày ruột truyền nhiễm + Bệnh truyền nhiễm do virus Rota (TGE + ROTA)	Lợn mẹ · Mũi tiêm thứ 1: 5 – 6 tuần trước khi sinh · Mũi tiêm thứ 2: 3 tuần trước khi sinh	Vắc-xin sống	Tiêm bắp
돼지 유행성 설사병 (PED)	모돈 ·1차접종 : 분만 10주전(생독) ·2차접종 : 분만 5–7주전(불활화) ·3차접종 : 2차접종 3주후(불활화)	생독백신 불활화백신	근육
Dịch tiêu chảy cấp trên lợn (PED)	Lợn mẹ · Mũi tiêm thứ 1: 10 tuần trước khi sinh (vắc-xin sống) · Mũi tiêm thứ 2: 5 - 7 tuần trước khi sinh (vắc-xin bất hoạt) · Mũi tiếm thứ 3: 3 tuần sau mũi tiêm thứ 2 (vắc-xin bất hoạt)	Vắc-xin sống Vắc-xin bất hoạt	Tiêm bắp
써코바이러스 (Circo)	자돈 ·생후 3주령	불활화백신	근육
Bệnh Circo virus (Circo)	Lợn con · 3 tuần sau khi sinh	Vắc-xin bất hoạt	Tiêm bắp

예방접종명 Tên vắc-xin phòng bệnh	접종시기 Thời gian tiêm chủng	비 고 Ghi chú	주사방법 (근육, 피하) Phương pháp tiêm (Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da)
위축성비염 (AR) + 파스튜렐라폐렴 + 글래써씨병 + 흉막폐렴 + 연쇄상구균감염증 + 유행성폐렴	**모돈** ·1차접종 : 분만 4~5주전 ·2차접종 : 1차접종 2주후 **자돈** ·1차접종 : 생후 3~4주령 ·2차접종 : 1차접종 2주후 **웅돈, 후보돈** ·1차접종 : 종부 4~5주전 ·2차접종 : 1차 접종 2주후	불활화백신	근육
Viêm teo mũi lợn (AR) **+ Tụ huyết trùng lợn** **+ Bệnh Glasser** **+ Viêm phổi - màng phổi** **+ Liên cầu khuẩn lợn** **+ Viêm phổi địa phương của lợn**	**Lợn mẹ** · Mũi tiêm thứ 1: 4 – 5 tuần trước khi sinh · Mũi tiêm thứ 2: 2 tuần sau mũi tiêm thứ 1 **Lợn con** · Mũi tiêm thứ 1: 3 – 4 tuần sau khi sinh · Mũi tiêm thứ 2: 2 tuần sau mũi tiêm thứ 1 **Lợn đực và lợn nái hậu bị** · Mũi tiêm thứ 1: 4 -5 tuần trước khi giao phối · Mũi tiêm thứ 2: 2 tuần sau mũi tiêm thứ 1	Vắc-xin bất hoạt	Tiêm bắp
돼지열병 (HC) + 돈단독 (SE)	**자돈** ·생후 55~70일령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 5–6주령, 2차접종 : 생후 8–9주령) **모돈, 웅돈** ·매년 1회	생독백신	피하
Bệnh dịch tả lợn (HC) **+Bệnh đóng dấu lợn (SE)**	**Lợn con** · Từ 55 - 70 ngày tuổi sau khi sinh * Khi tiêm 2 lần (Mũi tiêm thứ 1: 5 – 6 tuần sau khi sinh, Mũi tiêm thứ 2: 8 – 9 tuần sau khi sinh) **Lợn nái, lợn đực** · 1 năm 1 lần	Vắc-xin sống	Tiêm dưới da

예방접종명 Tên vắc-xin phòng bệnh	접종시기 Thời gian tiêm chủng	비 고 Ghi chú	주사방법 (근육, 피하) Phương pháp tiêm (Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da)
돼지열병 (HC)	**자돈** ·생후 55~70일령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 5–6주령, 2차접종 : 생후 8–9주령) **모돈, 웅돈** ·매년 1회	생독백신	근육
Bệnh dịch tả lợn (HC)	**Lợn con** · Từ 55 - 70 ngày tuổi sau khi sinh * Khi tiêm 2 lần (Mũi tiêm thứ 1: 5 – 6 tuần sau khi sinh, Mũi tiêm thứ 2: 8 – 9 tuần sau khi sinh) **Lợn nái, lợn đực** · 1 năm 1 lần	Vắc-xin sống	Tiêm bắp
돈단독 (SE)	·1차접종 : 생후 8주령 ·2차접종 : 생후 12주령	생독백신	근육
Bệnh đóng dấu lợn (SE)	· Mũi tiêm thứ 1: 8 tuần sau khi sinh · Mũi tiêm thứ 2: 12 tuần sau khi sinh	Vắc-xin sống	Tiêm bắp

예방접종명 Tên vắc-xin phòng bệnh	접종시기 Thời gian tiêm chủng	비 고 Ghi chú	주사방법 (근육, 피하) Phương pháp tiêm (Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da)
돼지 호흡기 생식기 증후군 (PRRS)	**모돈** ·1차접종 : 종부 5주전 ·2차접종 : 종부 2주전 **자돈** ·1차접종 : 생후 3–4주령 ·2차접종 : 1차 접종 3주후 **후보돈** ·종부 3–4주전	생독백신 불활화백신	근육
Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)	**Lợn mẹ** · Mũi tiêm thứ 1: 5 tuần trước khi giao phối · Mũi tiêm thứ 2: 2 tuần trước khi giao phối **Lợn con** · Mũi tiêm thứ 1: 3 – 4 tuần sau khi sinh · Mũi tiêm thứ 2: 3 tuần sau mũi tiêm thứ 1 **Lợn nái hậu bị** · 3 – 4 tuần trước khi giao phối	Vắc-xin sống Vắc-xin bất hoạt	Tiêm bắp
일본뇌염 (JE)	**성돈** ·4월 **후보돈** ·1차접종 : 3월 ·2차접종 : 4월	생독백신	근육
Viêm não Nhật Bản (JE)	**Lợn trưởng thành** · Tháng 4 **Lợn nái hậu bị** · Mũi tiêm thứ 1: Tháng 3 · Mũi tiêm thứ 2: Tháng 4	Vắc-xin sống	Vắc-xin sống Tiêm bắp

예방접종명 Tên vắc-xin phòng bệnh	접종시기 Thời gian tiêm chủng	비 고 Ghi chú	주사방법 (근육, 피하) Phương pháp tiêm (Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da)
파보바이러스병 (PPV)	**모돈** ·분만 3주후 **종모돈** ·6개월마다 보강접종 **후보돈** ·1차접종 : 종부 4주전 ·2차접종 : 종부 2주전	불활화백신	근육
Bệnh khô thai, sảy thai do Parvovirus (PPV)	**Lợn mẹ** · 3 tuần sau khi sinh **Lợn nái giống** · Tiêm phòng nhắc lại 6 tháng 1 lần **Lợn nái hậu bị** · Mũi tiêm thứ 1: 4 tuần trước khi giao phối · Mũi tiêm thứ 2: 2 tuần trước khi giao phối	Vắc-xin bất hoạt	Tiêm bắp
구제역 (FMD)	**모돈** ·분만 3주전 **성돈, 육성돈** ·6개월마다 보강접종 **자돈** ·생후 8주령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 8주령, 2차접종 : 생후 12주령)	불활화백신	근육
Bệnh lở mồm long móng (FMD)	**Lợn mẹ** · 3 tuần trước khi sinh **Lợn trưởng thành, lợn choai** · Tiêm phòng nhắc lại 6 tháng 1 lần **Lợn con** · 8 tuần sau khi sinh * Khi tiêm 2 lần (Mũi tiêm thứ 1: 8 tuần sau khi sinh, Mũi tiêm thứ 2: 12 tuần sau khi sinh)	Vắc-xin bất hoạt	Tiêm bắp

백신 등 동물용의약품 보관 및 사용방법

Phương pháp bảo quản và sử dụng thuốc thú ý bao gồm vắc-xin

- 백신 및 호르몬제는 냉장고 내에서 2~8℃ 이내로 보관.
- 스티로폼 박스 상단을 제거하고 냉장고에 보관.
- 냉장고에는 최고 · 최저 온도계 비치하여 수시로 온도 확인.
- 약품은 직사광선을 피하고 서늘한 보관함에 사용약제와 미사용 약제 별도 보관.
- 보관상태가 불량한 약제나 유효기간이 지난 약제는 주기적으로 폐기.
- 사용 후 남은 백신 및 호르몬제 돈사내 방치 금지.
- 약품 사용자는 약품의 휴약 기간을 확인한 후 사용.

- Bảo quản vắc xin và các chất hormone trong trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 - 8 ℃.
- Tháo bỏ hộp xốp và bảo quản trong tủ lạnh.
- Lắp đặt nhiệt kế tối đa/tối thiểu bên trong tủ lạnh và kiểm tra nhiệt độ thường xuyên.
- Bảo quản dược phẩm tại nơi không có ánh nắng trực tiếp và giữ thuốc trong thùng mát. Bảo quản riêng dược phẩm đã sử dụng và dược phẩm chưa sử dụng.
- Vứt bỏ định kỳ dược phẩm quá hạn sử dụng hoặc dược phẩm bảo quản không đúng cách.
- Nghiêm cấm đặt để bên trong chuồng lợn vắc-xin hoặc chất hormone còn dư sau khi sử dụng.
- Người sử dụng dược phẩm phải kiểm tra thời gian ngưng thuốc (withdrawal period) của dược phẩm trước khi sử dụng.

부록 : 양돈 용어 해설
Phụ lục: Chú giải thuật ngữ chuyên ngành chăn nuôi lợn

거세(castration)

수컷의 고환을 제거하는 등의 방법으로 번식능력을 제거하는 것. 수퇘지의 경우 자돈의 고환을 제거함으로써 육질개선 효과를 거두고, 성질이 온순해져 군사가 용이하게 됨.

Thiến (Castration)

Là phương pháp dùng để loại bỏ khả năng sinh sản của lợn đực bằng cách cắt bỏ tinh hoàn. Đối với lợn đực, việc cắt bỏ tinh hoàn của lợn con giúp cải thiện chất lượng thịt, tính cách của lợn trở nên hiền lành và tạo điều kiện thuận lợi để cho bú theo đàn.

경산돈(sow)

출산한 경험이 있는 암퇘지.

Lợn nái (Sow)

Là lợn cái đã qua sinh sản

구제역(foot & mouth disease; FMD)

소, 돼지, 면 · 산양 등의 우제류 동물에 전염하는 급성 법정전염병. FMD 바이러스에 의해 발병되며, 발열, 지제관부의 수포형성 또는 입술이나 혀의 수포형성을 유발하는 급성의 전염병으로 그 전염성이 매우 강한 질병.

Lở mồm long móng (Foot and Mouth Disease - FMD)

Là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan cho động vật bộ guốc chẵn như bò, lợn, dê… Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan nhanh và mạnh. Bệnh gây ra do virus FMD. Triệu chứng của bệnh là sốt, nổi mụn nước ở miệng, lưỡi.

귀표(ear mark; ear notch; ar punch)

가축의 귀를 잘라 개체표시를 하는 특정적인 표시.

Đánh dấu tai; Thẻ tai; Xăm tai (Ear Mark; Ear Notch; Ear Punch)

Là cách đánh đấu cụ thể để nhận dạng đặc điểm cá thể bằng cách cắt một phần tai của gia súc.

귀표장착기(marking clipper)

귀표를 가축에 장착하는 도구.

Kìm bấm thẻ tai (Marking Clipper)

Là dụng cụ dùng để cố định thẻ tai trên tai gia súc.

그룹관리(batch system)

한 농장에서 기르고 있는 돼지를 몇 개의 그룹으로 나눠서 한꺼번에 교배와 분만 등이 일어날 수 있게 하는 사육 방법으로서, 동시입출하가 가능해서 돼지의 질병을 감소시킬 수 있는 게 장점임.

Quản lý đàn (Batch System)

Là phương pháp chăn nuôi lợn bằng cách phân chia số lượng lợn đang nuôi tại trang trại thành nhiều đàn để giao phối và sinh sản. Nếu thực hiện theo phương pháp này, đàn lợn có thể xuất chuồng đồng loạt, giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh ở lợn.

깔짚(bedding; litter)

분뇨의 흡착, 동물의 보온 및 물리적 충격 완화를 위해 바닥에 깔아주는 재료.

Ổ rơm; Rải ổ (Bedding; Litter)

Sử dụng nguyên vật liệu lót trải trên sàn để hấp thụ chất thải (phân và nước tiểu) và giảm nhẹ các va chạm vật lý.

단미(docking; detailing)

식미벽(tail biting)을 예방하고 청결과 미관을 유지하기 위해 가축의 꼬리를 미근부부터 제 2관절에서 절단하는 것으로, 돼지, 면양, 개에서 실시함.

Cắt đuôi (Docking; Detailing)

Cắt từ phần cuối đuôi đến khớp xương đuôi thứ 2 của các vật nuôi như lợn, cừu, chó để ngăn chặn tình trạng cắn đuôi nhau, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tăng tính thẩm mỹ.

물돼지고기(watery pork) → 피에스이(PSE).

Thịt lợn rỉ nước (Watery Pork) → Thịt PSE (PSE)

미경산돈(gilt)

자돈을 생산하는 분만의 경험이 없는 암퇘지.

Lợn nái tơ (Gilt)

Là lợn cái chưa sinh đẻ lứa nào và được dùng để làm giống sản xuất lợn con.

발정(estrus; heat)

동물의 암컷에서 교미욕이 발현되어 수컷과 교미를 허용하는 상태를 말하는데, 난소에서 난포가 발육됨에 따라 혈중에 스트로겐 농도의 상승에 의하여 발현되며 배란에 앞서서 나타남.

Động dục; Lên giống (Estrus; Heat)

Là trạng thái lợn cái thể hiện ham muốn giao phối và cho phép lợn đực giao phối. Bao noãn phát triển trong buồng trứng làm tăng nồng độ hormone sinh sản (Estrogen) trong máu. Hiện tượng này xuất hiện trước khi rụng trứng.

발정재귀일(return to estrus after weaning)

암퇘지가 이유한 후에 다시 발정이 오는데 걸리는 기간을 말하며, 대개 7일 이내에 발정이 오는 것이 좋음.

Động dục trở lại sau khi cai sữa (Return to Estrus after Weaning)

Là thời gian lợn cái bắt đầu động dục trở lại sau khi cai sữa. Lợn cái thường động dục trở lại trong vòng 7 ngày sau khi cai sữa.

발정지속시간(duration of estrus)

발정의 개시로부터 종료까지의 기간을 말하며, 소는 10~30시간(평균 21시간), 말은 4~11일(평균 7일), 돼지는 미경산동 25~95시간(평균 55시간), 경산돈 52~85시간(평균 70시간)임.

Giai đoạn động dục (Duration of Estrus)

Là khoảng thời gian từ khi bắt đầu động dục đến khi kết thúc động dục. Khoảng thời gian này kéo dài từ 10 – 30 giờ (trung bình 21 giờ) đối với bò, từ 4 - 11 ngày đối với ngựa (trung bình 7 ngày), từ 25 – 95 giờ (trung bình 55 giờ) đối với lợn nái tơ và từ 52 – 85 giờ đối với lợn nái rạ.

발정행동(estrous behavior)

발정기의 암컷에서 나타나는 성적 행동으로 정서적으로 매우 흥분된 상태를 나타내고, 거동이 불안하여 이리저리 돌아다니며, 때로는 울기도 하고, 외음부가 종창되며, 수컷이 접근하면 교미자세를 취하게 됨.

Hành vi động dục (Estrous Behavior)

Là hành vi tình dục xuất hiện ở lợn cái trong chu kỳ động dục. Lợn cái cảm thấy phấn khích, đứng nằm không yên, đôi khi đi lang thang, âm hộ sưng lên và tạo ra tư thế giao phối khi lợn đực tiếp cận.

배합사료(formula feed)

두 가지 또는 그 이상의 원료사료를 목적하는 비율로 배합 또는 가공한 사료.

Thức ăn hỗn hợp (Formula Feed)

Là loại thức ăn được trộn lẫn hoặc chế biến từ 2 hoặc nhiều loại thức ăn gia súc theo tỉ lệ mục tiêu.

백신(vaccine)

병원체의 감염을 예방할 목적으로 사용되는 면역원. 병원성을 약화시킨 바이러스(또는 약독생균) 백신, 불활화 바이러스(또는 사균) 백신으로 대별.

Vắc-xin (Vaccine)

Là chất tạo miễn dịch được sử dụng để ngăn ngừa lây nhiễm mầm bệnh. Có 02 loại vắc-xin chính là virus giảm khả năng gây bệnh (hoặc là vắc-xin sống giảm độc lực) và virus bất hoạt (hoặc là vắc-xin chết).

분뇨처리(manure management)

분뇨를 수집 저장 및 이용하는 관리 방법.

Xử lý phân chuồng (Manure Management)

Là phương pháp quản lý để thu gom, bảo quản và sử dụng phân.

분만실(maternity pen)

새끼 분만 및 포유를 위하여 별도로 설치된 방.

Chuồng nuôi lợn nái đẻ (Maternity Pen)

Là chuồng được chuẩn bị riêng để lợn đẻ và nuôi con.

분만징후(sign of approaching parturition)

골반인대가 이완되며, 외음부는 충혈 · 종창되고, 외음부로부터 점조성이 있는 점액이 누축되며, 유방이 발달되고, 돼지와 같은 다태동물에서는 새끼의 보금자리를 준비함.

Dấu hiệu sinh đẻ (Sign of Approaching Parturition)

Dây chằng khớp xương chậu giãn ra, âm hộ xung huyết và sưng lên, dịch nhờn tiết ra từ âm hộ, vú căng lên. Các loài động vật sinh đa thai như lợn thường có biểu hiện làm ổ để nuôi con.

비육(fattening)

고기를 생산할 목적으로 한 가축 생산, 또는 가축의 체지방 축적을 촉진시켜 살찌우는 사육 과정.

Vỗ béo (Fattening)

Là quy trình nuôi gia súc hoặc chăn nuôi sản xuất lấy thịt bằng cách tăng cường tích tụ mỡ (chất béo) trong cơ thể vật nuôi.

비육돈(finishing pig)

식욕 생산을 할 목적으로 시장 출하체중에 도달할 때까지 사육하는 돼지 개체군. 돼지의 성장률이 빨라서 단시일 내에 시장 출하체중에 도달할 수 있어야 하고, 도체는 지방층이 얇고 정육률이 높아야 하며 저렴한 사료비를 들여서 사육할 수 있는 돼지가 비육돈으로 이상적임.

Lợn vỗ béo (Finishing Pig)

Là lợn hoặc đàn lợn được nuôi đến khi đạt trọng lượng xuất chuồng theo nhu cầu thị trường bằng phương pháp tăng trọng nhanh trong thời gian ngắn nhằm mục đích chăn nuôi sản xuất thịt lợn. Chăn nuôi lợn vỗ béo (lợn thịt) lý tưởng là thực hiện chăn nuôi với chi phí thức ăn thấp và thịt lợn sau khi giết mổ có lớp mỡ mỏng, tươi ngon.

사료첨가제(feed additives)

영양적 또는 특정 목적을 위하여 사료에 미량으로 첨가되는 물질의 총칭.

Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Feed Additives)

Là các chất được thêm vào thức ăn chăn nuôi với một lượng nhỏ nhằm mục đích đặc biệt hoặc để bổ sung dinh dưỡng.

사산(stillbirth)

태아가 출생된 후에 생활능력을 가질 수 있는 최단 임신 기간이 지난 후에 죽어서 만출되는 것을 말하며 이 시기 이전에 만출되는 것은 유산이라고 함. 사산에는 분만 직전 또는 분만 과정에서 사망한 것도 포함됨.

Thai chết lưu (Stillbirth)

Là trường hợp thai chết và bị tống ra khỏi cổ tử cung sau khi đã phát triển đầy đủ khả năng sinh tồn. Nếu thai chết trước thời điểm này được gọi là "sảy thai". Thai chết lưu bao gồm cả trường hợp chết trước khi sinh và chết trong khi sinh.

사육밀도(stocking density)

한 공간에 수용하는 가축의 두수 또는 두당 제공 면적.

Mật độ nuôi (Stocking Density)

Là diện tích cung cấp trung bình trên một đầu gia súc hoặc số lượng đầu gia súc trong một không gian.

산자수(litter size)

다태동물이 분만하여 생산된 새끼의 수.

Số con sinh ra (Litter Size)

Là số lượng con được sinh ra bởi động vật sinh đa thai.

상대습도(relative humidity RH)

특정 온도에서 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량과 실제로 함유하고 있는 수증기량과의 비율, 관계습도라고도 함.

Độ ẩm tương đối (Relative Humidity - RH)

Là tỷ số lượng hơi nước thực tế và lượng hơi nước tối đa có thể chứa trong không khí ở một nhiệt độ nhất định.

설사(diarrhea)

사료이상, 관리이상, 환경이상, 질병 등에서 유래하는 소화기 장해로 수양성비정상 배변을 증세로 함.

Tiêu chảy (Diarrhea)

Là hiện tượng rối loạn tiêu hóa do những bất thường trong thức ăn gia súc, sai sót trong quản lý, môi trường, bệnh tật… Nhỏ dãi, chảy nước mũi bất thường là những triệu chứng thường gặp.

수정(fertilization)

난자와 정자가 합체하여 단일세포의 접합체를 형성하는 과정을 말함. 수정과정은 난자와 정자의 접촉으로 시작되어 정자의 난자 내 침입, 난자의 활성화, 자 · 웅전핵의 형성과정을 거쳐 양전핵의 융합으로 완료됨.

Thụ tinh (Fertilization)

Là quá trình trứng kết hợp với tinh trùng và hình thành hợp tử của tế bào đơn. Quá trình thụ tinh bắt đầu từ khi trứng tiếp xúc với tinh trùng, tinh trùng chui vào noãn, hình thành tiền nhân đực, tiền nhân cái và kết thúc bằng quá trình hai tiền nhân hợp thành một nhân.

순치(taming)

① 외부에서 도입된 돼지를 직접 돈사에 들이지 않고 농장 환경에 적응하기 위해 따로 떨어진 돈사에 사육하는 것. ② 야생상태의 동물을 이용 목적에 맞게 길들이는 것.

Thuần dưỡng (Taming)

① Đối với lợn mới được chuyển vào từ bên ngoài, không chuyển ngay lợn vào chuồng nuôi chung mà nuôi riêng để lợn thích nghi với môi trường của trang trại. ② Thuần dưỡng động vật ở trạng thái hoang dã phù hợp với mục đích sử dụng.

스톨(stall)

가축 한 마리가 이용할 수 있도록 구분 지은 공간. 소의 경우, 우상이라고 하고 돼지의 경우 돈상이라고 함.

Chuồng nuôi (Stall)

Là không gian được thiết lập riêng để một vật nuôi sử dụng. Đối với bò, không gian này được gọi là "chuồng bò" và đối với lợn là "chuồng lợn".

승가허용행동(recptive behavior)

암컷의 발정기에 나타나는 특징적인 거동, 즉 수컷의 승가와 교미를 허용하는 자세를 취하는 상태의 발정을 말함.

Hành vi chịu đực (Receptive Behavior)

Là hành vi đặc trưng xuất hiện khi lợn cái động dục, có nghĩa là tư thế của lợn cái chấp nhận cho lợn đực nhảy lên lưng và giao phối.

안개분무장치(fogger)

하절기에 공기냉각을 위하여 미세 수분입자를 분사하는 장치 축사내부가 건조해지기 쉬운 겨울과 봄, 가을에 축사내의 습도조절, 암모니아와 먼지제거 등을 위하여 설치하기도 함.

Thiết bị phun sương (Fogger)

Là thiết bị phun các hạt nước li ti để làm mát không khí vào mùa hè. Thiết bị này được lắp đặt để kiểm soát độ ẩm, loại bỏ amoniac và bụi bên trong chuồng nuôi vào mùa đông, mùa xuân, mùa thu.

압사(death from pressure)

분만 시, 다량 수송 시, 혹은 돈방당 자돈수가 과할시에 서로 누르게 되어 발생할 수 있는 폐사형태.

Chết do bị đè (Death from Pressure)

Là loại hình tử vong có thể xảy ra do bị đè nén trong quá trình sinh đẻ, khi vận chuyển với số lượng lớn hoặc khi nhốt quá nhiều lợn con trong một chuồng lợn.

양수(amnion fluid; amnioti fluid)

양막에 있는 액체로서, 모체와 태아의 혈관 침출물, 그리고 태아의 오줌, 타액선, 구강점막, 폐 및 기관의 분비물로 구성되어 있으며, 태아의 기형적인 발달을 방지하며, 외부의 충격을 줄이고, 태아와 태막의 유착을 방지하고, 분만 시에는 자궁경관의 확장을 돕고, 산도를 윤활하게 하여 태아의 만출을 용이하게 함.

Nước ối; Dịch ối (Amnion Fluid; Amnioti Fluid)

Là chất dịch trong màng ối. Nước ối bao gồm chất tràn ra từ mạch máu nối giữa bào thai và cơ thể của mẹ, nước tiểu trong bào thai, dịch tiết từ tuyến nước bọt, niêm mạc miệng, phổi và các cơ quan khác. Nước ối ngăn chặn sự phát triển bất thường của bào thai, giảm va chạm từ bên ngoài, ngăn chặn phôi thai dính vào màng thai, giúp mở rộng kênh cổ tử cung khi sinh và bôi trơn ống dẫn thai giúp thai ra ngoài dễ dàng hơn.

외음부(vulva)

질 전정에서 이어져 나온 암컷 요생식도관의 말단을 말하는데, 음문부라고도 함. 질 전정의 외부로 향한 출구를 음열이라 하며, 음열의 좌우에 피부의 주름이 융기하여 음순이 형성되어 있음.

Âm hộ (Vulva)

Là phần cuối của ống cơ quan sinh dục nữ nối từ tiền đình âm đạo. Âm hộ còn được gọi là cửa mình. Khe âm hộ là lỗ bên ngoài tiền đình âm đạo. Phần da ở bên trái và bên phải của tiền đình âm đạo có nếp nhăn phồng lên, tạo thành môi âm đạo.

웅돈(boar)

비거세한 수퇘지.

Lợn đực (Boar)

Là lợn đực không bị thiến.

위축돈(atrophic rhinitis, AR)

이유시점에서 동복체중이 평균이하의 자돈과 체중은 정상일지라도 특별 관리를 요하는 자돈.

Lợn bị teo (Atrophic Rhinitis - AR)

Lợn con có trọng lượng thấp dưới mức trung bình và lợn có trọng lượng bình thường nhưng cần chăm sóc đặc biệt khi cai sữa.

유산(abortion)

임신기간이 만료되기 전에 임신이 중지되어 태아가 죽거나 또는 살아있어도 생존능력을 가지기 이전에 만출되는 것을 말하며, 유산의 원인은 매우 다양할 뿐만 아니라 아직까지 원인을 알지 못하는 경우도 있음.

Sảy thai (Abortion)

Là hiện tượng phôi thai chết bị tống ra khỏi tử cung, chấm dứt việc mang thai trước khi thai kỳ kết thúc hoặc phôi thai còn sống nhưng bị tống ra khỏi tử cung trước thời kỳ phôi thai có đủ khả năng sinh tồn. Có nhiều nguyên nhân gây sảy thai và vẫn có nhiều trường hợp chưa tìm ra nguyên nhân sảy thai.

육성돈(growing pig)

20~60kg의 돼지로 성장이 빠르고 근육의 축적이 일어나는 시기의 돼지.

Lợn choai (Growing Pig)

Là thời kỳ lợn tăng trọng nhanh ở mức từ 20 - 60kg. Đây là thời kỳ lợn tích lũy cơ bắp.

이유(weaning)

젖을 떼는 행위.

Cai sữa (Weaning)

Là quá trình ngừng cung cấp sữa mẹ.

이표(ear marking)

개체별번호를 표시하기 위하여 양 귀의 일부를 떼어내어거나 번호표를 부착하는 등의 개체 식별 방식.

Đánh dấu tai (Ear Marking)

Là phương pháp nhận dạng đặc điểm cá thể bằng cách cắt một phần của hai tai gia súc hoặc gắn thẻ số vào tai.

인공수정(artificial insemination; AI)

채취한 정액을 일정한 처리를 하고, 수정을 목적으로 기구를 사용하여 암컷의 생식기내로 주입하는 행위를 말하며, 웅축의 이용효율을 높이고, 단기간에 다수의 암컷을 수정시킬 수 있으며, 전염병을 미연에 방지할 수 있음.

Thụ tinh nhân tạo (Artificial Insemination - AI)

Là quá trình thu thập tinh dịch và bơm vào cơ quan sinh dục của con cái bằng dụng cụ thụ tinh nhân tạo. Quá trình này tăng hiệu quả kết tụ, giúp thụ tinh thành công trên nhiều con cái trong thời gian ngắn và ngăn ngừa trước các bệnh truyền nhiễm.

임신(pregnancy; gestation)

배란된 난자가 암컷의 체내에서 수정되고, 이것이 태아로 발달되어 만출될 때까지의 모체의 생리적 상태를 말하며, 임신이 유지되기 위해서는 황체로부터 분비되는 다량의 프로게스테론이 필수적임.

Mang thai (Pregnancy; Gestation)

Là trạng thái sinh lý của cơ thể mẹ từ khi trứng rụng được thụ tinh trong cơ thể của con cái và phát triển trở thành phôi thai cho đến khi bào thai được sinh ra. Để duy trì quá trình mang thai, cần số lượng lớn nội tiết tố progesterone được tiết ra từ hoàng thể.

임신징후(sign of pregnancy)

임신에 따라 모체에서 일어나는 모든 종류의 변화를 말하며, 태동의 감지, 태아음의 청취 등을 확징이라 하며, 발정주기의 정지, 복부의 팽대, 유방의 발육, 거동의 변화, 식욕의 증진, 외음부의 변화 등은 불확징이라 함.

Dấu hiệu mang thai (Sign of Pregnancy)

Là tất cả những thay đổi liên quan đến việc mang thai xảy ra bên trong cơ thể mẹ. Dấu hiệu xác định bao gồm nhận biết cử động của bào thai, nghe tim thai… Dấu hiệu không xác định bao gồm dừng chu kỳ động dục, bụng to, vú căng, tâm trạng thay đổi, thèm ăn, thay đổi vùng âm hộ …

입기구(air inlet)

공기를 유입하는 건물의 틈새. 입기구는 축사내 공기혼합형태를 결정하는 가장 중요한 변수이며, 창문, 윈치커텐, 처마슬롯, 천장 중앙슬롯, 천장 점적 등의 위치를 개장하여 입기구를 설치할 수 있음. 긴축되며, 점액도 농후해짐.

Lỗ thông khí (Air Inlet)

Khe hỡ hút khí giữa các tòa nhà và lỗ thông khí là yếu tố quan trọng nhất quyết định loại không khí hỗn hợp bên trong chuồng nuôi. Có thể lắp đặt lỗ thông khí bằng cách mở rộng cửa sổ, rèm cuốn dây tời, khe hở mái hiên, khe hở chính giữa trần nhà…

절치(cliping needle teeth)

신생자돈은 각 턱에 4개씩 8개의 강하고 예리한 송곳니를 갖고 있어 분만 직후에 절단해 주어야 하는데 그렇지 않을 경우에는 어미돼지의 유방과 다른 새끼들에게 상처를 입히는 원인이 되기도 함.

Bấm răng (Clipping Needle Teeth)

Lợn sơ sinh có 8 răng nanh sắc và khỏe (4 răng trên mỗi hàm. Cần bấm răng nanh ngay sau khi sinh. Nếu không bấm răng, những chiếc răng này có thể sẽ là nguyên nhân gây tổn thương bầu vú của lợn mẹ và làm tổn thương các con lợn con khác.

정액(semen)

성적으로 흥분한 수컷의 생식기관에서 번식을 목적으로 사출되는 체액으로서 정소에서 생산된 정자와 부생식선에서 분비된 정장의 혼합물로 보통 이러한 정액을 원정액이라 하며 희석액으로 희석하여 보관하거나 인공수정에 이용함.

Tinh dịch (Semen)

Là chất lỏng để duy trì nòi giống, được tiết ra từ cơ quan sinh dục của con đực sau khi đạt đến điểm cực khoái. Tinh dịch là hỗn hợp chất dịch chứa tinh trùng được sinh ra từ tinh hoàn và các chất nhờn tiết ra từ các tuyến sinh dục phụ. Hỗn hợp này được gọi là tinh dịch gốc. Tinh dịch gốc được pha loãng bằng chất pha loãng để bảo quản hoặc dùng để thụ tinh nhân tạo.

재대(umbilical cord)

태아와 태반을 연결하는 물질교환의 통로를 말하며, 탯줄이라고도 함.

Dây rốn (Umbilical Cord)

Là đường dẫn trao đổi chất giữa nối bào thai và nhau thai. Dây rốn còn được gọi là dây nhau.

철분주사(iron injection)

신생자돈을 출생 시 철분의 저장량이 정상적이 혈구형성을 하기에 부족하기 때문에 철분을 인위적으로 주사하여 보조함.

Tiêm sắt (Iron Injection)

Khi vừa sinh ra, lợn sơ sinh được tiêm sắt nhân tạo để bổ sung vì lượng sắt trong cơ thể không đủ để hình thành huyết cầu.

축분(animal waste, manure)

가축이나 가금에서 발생되는 분과 뇨를 통칭하는 개념. Manure(또는 muck)는 비료화된 두엄의 형태를 의미하고, slurry는 가축분뇨와 세척수가 포함된 액상분뇨를 의미함.

Chất thải động vật, phân chuồng (Animal Waste, Manure)

Là khái niệm chung về phân và nước tiểu từ gia súc, gia cầm. Phân chuồng (Manure hoặc muck) là một dạng phân bón đã được ủ, bùn (slurry) là loại chất lỏng bao gồm phân gia súc và chất tẩy rửa.

퇴비사(waste storage structure)

폐기물을 저장하기 위하여 건축한 구조물을 말함.

Kho chứa chất thải (Waste Storage Structure)

Là công trình xây dựng để bảo quản chất thải.

항생제(antibiptics)

미생물에 의해 생산되는 가용성 유기물질. 다른 미생물의 성장활동을 억제시킬 수 있는 제제.

Chất kháng sinh (Antibiotics)

Là chất hữu cơ hòa tan được tạo ra từ vi sinh vật. Chất kháng sinh cũng là loại thuốc có thể kìm hãm hoạt động sinh trưởng của các vi sinh vật khác.

환기(ventilation)

실내 공기조성을 바람직한 상태로 조정하기 위하여 환풍기로 외부공기를 유입하거나 실내 오염공기를 배출하는 행위. 이산화탄소, 암모니아, 유화수소 및 각종 악취발생기체를 제거하고 실내 온습도를 적정상태로 변화시키는 효과가 있음.

Thông gió (Ventilation)

Là hoạt động hút không khí bên ngoài vào trong phòng hoặc thải không khí ô nhiễm trong phòng ra ngoài để điều chỉnh trạng thái không khí trong phòng. Thông gió giúp loại bỏ carbon dioxide, amoniac, hydro sulfua, các loại khí gây mùi và duy trì nhiệt độ phòng, độ ẩm ở điều kiện thích hợp.

환축실(treatment room)

질환을 가진 가축을 수용 치료하는 방.

Phòng điều trị (Treatment Room)

Là phòng dùng để điều trị gia súc nhiễm bệnh.

후보모돈(replacing gilt)

늙어서 생산성이 떨어지거나 또는 사고에 의해서 도태되는 모돈을 교체하기 위해 키우는 암퇘지.

Lợn nái hậu bị (Replacing Gilt)

Là lợn cái được nuôi để thay thế lợn mẹ bị đào thải do sự cố hoặc lợn nái giảm khả năng sinh sản vì tuổi già.

휴약기간(withdrawal period)

잔류성이 있는 약제를 사료에 첨가할 경우 가축의 도살 전 일정기간은 약제가 첨가되지 않은 사료를 급여해야 함. 이 기간을 휴약기간이라고 함.

Thời gian ngưng thuốc (Withdrawal Period)

Trong trường hợp trộn thêm thuốc có tính chất lưu lại vào thức ăn gia súc, cần phải cho vật nuôi ăn thức ăn gia súc không chứa thuốc trong một thời gian trước khi xuất chuồng hoặc giết mổ thịt. Thời gian này được gọi là thời gian ngưng thuốc.

2017년 6월 07일 인쇄
2017년 6월 15일 발행

Tiếng Việt

Kỹ năng giao tiếp tốt với người lao động nước ngoài

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn

발행인	국립축산과학원장 오성종
편집인	기 술 지 원 과 장 오형규, 양 돈 과 장 박준철
편집기획	최선호, 이병철, 김연아, 진현주, 장해용, 유지현, 천동원 서동균, 우제석, 조규호, 강석진, 유동조, 김영화, 김두완 정동완, 전승기
발행처	농촌진흥청 국립축산과학원 기술지원과 55365 전북 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1500 **Tel** 063-238-7203 **Fax** 063-238-7247 http://www.nias.go.kr
카툰&디자인	Designed by [에이피피커뮤니케이션즈] 02-2264-8355
번 역	에이피피커뮤니케이션즈
감 수	은아
인쇄처	심안인쇄 02-2264-3811
ISBN (비매품)	978-89-480-4572-7 93520