태국어 • ภาษาไทย

외국인 근로자 원활한 소통을 위한

양돈 사양관리 매뉴얼

แนวทางในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว

คู่มือการเลี้ยงสุกรโดยละเอียด



농촌진흥청
국립축산과학원

발 간 사

최근 농업현장의 고령화와 부족한 고용인력 해소를 위하여 외국인 근로자를 고용하여 활용하는데 2011년 13,487명이던 외국인 근로자 고용 인력이 2016년에는 16,996명으로 26% 증가하였고, 이 같은 현상은 앞으로도 더욱 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

외국인 근로자가 증가함에 따라 축산 현장에서의 외국인 인력 의존도가 더욱 높아지고 있고 역할 또한 다양해지고 있지만, 외국인 근로자에게는 익숙하지 않은 축산 현장 및 언어소통의 어려움과 양축농가에게는 외국인 근로자와의 언어소통 및 문화적 차이 등 많은 어려움이 있을 것으로 생각됩니다.

또한 축산업에 종사하는 외국인 근로자에 대한 별도의 교육훈련 제도 및 정책 미흡으로 외국인 근로자의 적극적인 축산 현장 참여가 어려운 실정입니다.

이에 국립축산과학원에서는 그동안 수행한 연구결과 등을 반영하여 축산농가와 외국인 근로자가 함께 참고할 수 있도록 「외국인 근로자를 위한 양돈 사양관리 매뉴얼」을 재미있는 만화로 제작하여 발간하게 되었습니다.

이번 매뉴얼은 포유자돈 및 이유자돈 관리, 육성 · 비육돈 관리, 웅돈 관리, 후보돈 관리, 임신돈 관리, 포유모돈 관리, 이유모돈 관리 등 돼지의 출생부터 출하까지 대화 형태로 재미있게 정리하여 외국인 근로자들이 기초적인 정보들을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 하였습니다.

부디 본 책자가 외국인 근로자뿐만 아니라 양축농가들에게도 널리 활용되어 축산현장에서 원활한 소통을 통한 농장의 업무 효율화 및 생산성을 높이는데 유용한 길잡이가 되기를 바랍니다.

2017년 6월

국립축산과학원장 **오 성 종**

คำนำ

อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวได้เติบโตขึ้น 26% จากจำนวน 13,487 คน ในปี พ.ศ.2554 เป็น 16,996 คน ในปี พ.ศ.2559 และตัวเลขสถิติมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมสูงอายุและภาวะ ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
ด้วยเหตุที่จำนวนแรงงานต่างด้าวมีเพิ่มมากขึ้น ฟาร์มปศุสัตว์จึงต้องมีการพึ่งพาแรงงานเหล่านี้มากขึ้น ตามไปด้วย โดยแรงงานเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่หลากหลายภายในฟาร์ม อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น การทำงานในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ของแรงงาน ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ
นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวยังไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในฟาร์มปศุสัตว์ เนื่องจากไม่มีระบบการฝึกและนโยบายต่างๆที่กำหนดขึ้นสำหรับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะ
และเพื่อที่จะแก้ปัญหาข้างต้นนี้ ทางสถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์แห่งชาติ (National Institute of Animal Science) จึงได้ทำการเผยแพร่การ์ตูนเพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งมีชื่อว่า <คู่มือการทำฟาร์มสุกรโดยละเอียดสำหรับแรงงานต่างด้าว> โดยเนื้อหาได้อ้างอิงจากผลการค้นคว้าของทางสถาบัน สำหรับให้ผู้ทำฟาร์มปศุสัตว์และแรงงานต่างด้าวในฟาร์มใช้เป็นแนวทางอ้างอิง คู่มือฉบับนี้จัดทำในรูปแบบการ์ตูนโดยอธิบายตั้งแต่การเกิดของสุกรไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเนื้อหมู โดยรวมถึงการจัดการและเลี้ยงดูลูกสุกรูที่ยังไม่หย่านมและลูกสุกรที่เพิ่งหย่านม การจัดการดูแลสุกรรุ่นและสุกรโตเต็มวัยพร้อมเข้าโรงเชือด สุกรตัวผู้ สุกรสาว สุกรที่ตั้งครรภ์ แม่สุกรที่กำลังให้นมลูก และแม่สุกรที่เพิ่งหย่านมลูก ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือให้แรงงานต่างด้าวได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้โดยทั่วกัน โดยไม่เพียงใช้ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว แต่รวมถึงผู้ทำฟาร์มสุกรและฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือด้านการสื่อสาร อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลิตผลที่เพิ่มมากขึ้นในการทำฟาร์มปศุสัตว์

มิถุนายน 2660
โอ เซียงจอง ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์แห่งชาติ
(Oh Seongjong, CEO, National Institute of Animal Science)

목 차 • สารบัญ

1. 웅돈 및 후보돈 관리
การควบคุมดูแลสุกรตัวผู้และสุกรสาวตัวเมีย 05

2. 이유모돈(종부대기돈) 관리
การควบคุมดูแลแม่สุกรหย่านม (ที่จะนำมาผสมพันธุ์ต่อไป) 09

3. 임신돈 관리
การควบคุมดูแลสุกรที่ตั้งครรภ์ 11

4. 포유모돈 관리
การควบคุมดูแลแม่สุกรในช่วงให้นมลูก 15

5. 포유자돈 관리
การควบคุมดูแลลูกสุกรที่ยังไม่หย่านม 18

6. 이유자돈 관리
การควบคุมดูแลลูกสุกรหย่านม 21

7. 육성 및 비육돈 관리
การควบคุมดูแลสุกรรุ่นและสุกรขุน 23

8. 출하관리 및 도축
การควบคุมดูแลการย้ายสุกรออกและการนำเข้าโรงเชือด 29

9. 기타 관리사항
อื่นๆ 31
– 차단방역
การป้องกันโรคติดต่อ 31
– 백신접종 매뉴얼
คู่มือการฉีดวัคซีน 33

10. 부록 : 양돈 용어 해설
ภาคผนวก: คำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในการทำฟาร์มสุกร 41

외국인 근로자 원활한 소통을 위한
แนวทางในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว

양돈 사양관리 매뉴얼

คู่มือการเลี้ยงสุกรโดยละเอียด

1. 웅돈 및 후보돈 관리 การควบคุมดูแลสุกรตัวผู้และสุกรสาวตัวเมีย

쌤님! 마침 오늘 들어온 돼지들이 있는데 한번 살펴볼래? 여기 웅돈은 수컷으로서 대개 수정시키기 위한 돼지야, 바비돼지라고 할 수 있지.
아하, 얘들이 웅돈이군요? 어떻게 관리하는데요?
웅돈 ความหมายคือหมูตัวผู้เหรอครับ แล้วเรามีวิธีดูแลมันยังไงบ้างครับ
ตั้งแต่มาถึงวันนี้กัน เราจะใช้หมูตัวผู้พวกนี้ในการผสมพันธุ์ โดยให้พวกมันเป็นพ่อพันธุ์
อ่อ ใช่ครับ
ก่อนแรกเลย เราต้องจับมันแยกคอกเดี่ยวประมาณ 3-4สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้มันติดโรคจากหมูตัวอื่น
ก่อนที่จะ ให้ผสมพันธุ์ ต้องให้อาหารมันเยอะๆ

후보돈들은 적응기간이 얼마나 필요해요?
พวกหมูสาวพวกนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับในการที่จะปรับตัวเข้ากับฟาร์ม
โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 150-180 วัน ซึ่งน้ำหนักตัวของพวกมันจะอยู่ที่ 90-105 กก.
그 땐 어떻게 관리해요?
แล้วผมควรจะจัดการหมูพวกนี้ยังไงบ้างครับ
① 우선, 사료는 후보돈 또는 육성돈 사료를 주고,
① อย่างแรกเลยต้องให้อาหารสำหรับหมูสาวหรือหมูเลี้ยง
② 개체카드를 만들어 생일이나 전입일 백신예정일 등을 적어두고,
② ทำใบประวัติเพื่อบันทึกวันเกิดของหมู วันที่ย้ายเข้า และวันที่ฉีดวัคซีน ฯลฯ
③ 이동한 날은 충분한 물과 사료를 줘야 해.
③ เตรียมน้ำและอาหารให้เพียงพอในวันที่หมูย้ายเข้า
④ 최초 입식 시에는 광범위 항생제 주사를 2일간 주고,
④ จัดการฉีดยาฆ่าหมูชนิดต่างๆทายในสองวันแรกที่หมูเริ่มไต่ยืนกินอาหาร
후보돈
water
또, 도입 후 1주내 스트레스 완화제(영양제, 전해질) 주사 및 구충을 꼭 하고,
도입 후 3~4주간 면역계 높게 해서 농장에 적응시키지.
뿐만 아니라 백신예정일에 맞춰 백신 접종을 하고,
도입 후 3-4สัปดาห์ ปรับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับฟาร์ม
นอกจากนี้ก็ให้ฉีดยาคลายเครียด ให้หมูด้วย (แร่ธาตุเสริม และอิเล็กโทรไลต์) และยาฆ่าหมูสาวี โดยให้ทำทายในสัปดาห์แรก ที่มันย้ายเข้ามาในฟาร์ม แล้วให้เลี้ยงมันไว้ 2-4 สัปดาห์ ให้มันได้ปรับตัวเข้ากับฟาร์ม
조명은 항상 켜두나요?
ควรจะเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเลยหรือเปล่าครับ
오, 좋은 질문이야.
후보돈은 번식성적 향상을 위해 하루 12시간 점등이 필요해.
เป็นคำถามที่ดี
หมูสาวต้องการแสงไฟ 12 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อช่วยให้คุณภาพการสืบพันธุ์ของมันดีขึ้น

그렇구나!
그럼 후보돈도 시기별로 관리방법이 달라지나요?
네 맞아요 좋은 질문이네요
그럼, 도입 후 2개월쯤 되면 체중은 대략 120kg를 되지, 이 때 임신돈 사료를 급여해야 하는데, 상태에 따라 2~3kg 내외로 제한급여하면서 체형을 살펴야 해.
120KG
발정이 관찰되면 어떻게 하죠?
네 그러면 이번에는 교배 관리에 대해 얘기해볼까요?
초발정 유도를 위해 음돈을 하루에 두 번 (점심 저녁) 접촉하여 2~3번째 정도에 강발정이 되도록 유도해야 해.
그렇구나~
그럼 교배는 언제 결정해요?
네 그럼 교배는 언제 결정해요?
등지방, 체형, 체중, 발정 등을 따져봐야 해, 225~250일령, 체중 135~145kg, 정도가 교배적기지.
또, 다른 특이점이 있나요?
네 그러면 이번에는 교배 관리에 대해 얘기해볼까요?
음. 발정과 교배가 시작되는 3개월쯤 되면 체중이 145kg정도가 되는데, 이 때 포유돈 사료를 줘야 해.
다시 정리하면, ① 첫 교배 2주 전에 결정사항을 위해 개체관리가 가능한 임신스톨로 이동하고,
② 배란수 증대를 위해 교배 2주전 포유돈 사료 3kg 내외 급여하고,
③ 교배예정 2주전에 내·외부 구충을 실시하고,
④ 발정주기 3~4일전 음돈 접촉 강화로 과배란을 유도하고,
⑤ 교배예정 일주일 전에는 백신 접종을 전부 마쳐야 하지, 아이...
아하! 이 때는 더 신경 쓸것이 많네요...
그렇구나 그럼 교배는 언제 결정해요?
네 그럼 교배는 언제 결정해요?
등지방, 체형, 체중, 발정 등을 따져봐야 해, 225~250일령, 체중 135~145kg, 정도가 교배적기지.
또, 다른 특이점이 있나요?
네 그러면 이번에는 교배 관리에 대해 얘기해볼까요?
음. 발정과 교배가 시작되는 3개월쯤 되면 체중이 145kg정도가 되는데, 이 때 포유돈 사료를 줘야 해.
다시 정리하면, ① 첫 교배 2주 전에 결정사항을 위해 개체관리가 가능한 임신스톨로 이동하고,
② 배란수 증대를 위해 교배 2주전 포유돈 사료 3kg 내외 급여하고,
③ 교배예정 2주전에 내·외부 구충을 실시하고,
④ 발정주기 3~4일전 음돈 접촉 강화로 과배란을 유도하고,
⑤ 교배예정 일주일 전에는 백신 접종을 전부 마쳐야 하지, 아이...
생각보다 복잡하지만 하이팅 해볼게요!

2. 이유모돈(종부 대기돈) 관리

การควบคุมดูแลแม่สุกรหย่านม (ที่จะนำมาผสมพันธุ์ต่อไป)


ส่วนใหญ่ส่วนมากจะ
ทำโดยการผสมเทียม
ผสมเทียม
เหรอครับ
น้ำอสุจิสำหรับการผสมเทียมจะต้องถูกเก็บรักษา
ในอุณหภูมิ 17-18 ℃ และใช้ในการผสมภายใน 3 วัน การ
ฉีดน้ำอสุจินั้นทำได้ไม่ยาก โดยควรจะทำตามขั้นตอน
ขั้นตอนคือ:
① ทำให้หมูอยู่ในภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผสมเทียม ② ทำความสะอาดภายนอก
อวัยวะเพศของหมู ③ ทำการสอดไส้ที่ฉีด
อสุจิโดยการใช้สารหล่อลื่นทาที่ด้วยฉีด
ระวังอย่าไส่ที่ฉีดเข้าในทอปิดสาวะ
ทำไม~ เวลาที่ผ่านไปเร็วขึ้นเยอะ
ว่าไง...คุณจะใช้เวลานานขนาด
ทั้งทำนุบำรุง หลังจากการผสมเทียมแล้ว
ต้องปล่อยให้หมูไสยัด และบันทึกวันและ
เวลาของการผสมเทียม ชื่อของอสุจิ ฯลฯ
ขอบคุณครับที่ช่วยอธิบาย
เจ้าหมูพวกนี้ทำได้ดีมาก

3. 임신돈 사양관리

การควบคุมดูแลอย่างเฉพาะเจาะจงในสุกรที่เตรียมตั้งครรภ์



구분 หัวข้อ	오전 เช้า	오후 เย็น
월요일 วันจันทร์	발정체크 ตรวจการติดสัด	분뇨처리 ทำความสะอาดมูลสัตว์, 발정체크 ตรวจการติดสัด
화요일 วันอังคาร	종부 ผสมพันธุ์	종부 ผสมพันธุ์
수요일 วันพุธ	종부 ผสมพันธุ์	종부, 분만예정돈 내외부 구충 ผสมพันธุ์ ตรวจแมลงทั้งภายนอกและภายในสำหรับสุกรที่ใกล้คลอด
목요일 วันพฤหัสบดี	종부, 이유모돈 선별, 도태모돈 판단 ผสมพันธุ์ การย้ายแม่สุกรหูยานแม่ก่อนคลอด การคัดสุกรตัวเมียที่ตายแล้วออก	종부, 후두부 백신접종 ผสมพันธุ์ ฉีดวัคซีนที่บริเวณกลีบท้ายทอย
금요일 วันศุกร์	모든 백신접종, 임신진단, 도태모돈 판단 การฉีดวัคซีนในสุกรตัวเมีย การตรวจการตั้งครรภ์การคัดสุกรตัวเมียที่ตายแล้วออก	모돈스톨 정리 จัดที่ในคอกให้สุกรตัวเมีย
토요일 วันเสาร์	사료량 조정(체형점 체크), 분만예정돈 선별 ปรับปริมาณอาหาร (ตรวจคะแนนสภาพร่างกาย) ย้ายสุกรที่ใกล้คลอดออก	임신사 수세, 울타리 소독 ทำความสะอาดคอกสุกรสำหรับสุกรที่ตั้งครรภ์ ทำการฆ่าเชื้อผิวหน้าชั้นนอกของสุกรตัวผู้
일요일 วันอาทิตย์	기본 사양관리 การดูแลควบคุมเฉพาะเจาะจงขั้นพื้นฐาน	기본관리, 발정체크 การจัดการขั้นพื้นฐาน ตรวจการติดสัด



점수 คะแนน	등 부위 지방두께 (mm) ความหนาของไขมันที่หลังส่วนซี่โครงชี้ยาว (มม)	체형 สภาพร่างกาย	특징 ลักษณะร่างกาย
1	<15	매우마름 ผอมแห้ง	등뼈와 늑골이 매우 잘 보임 มองเห็นสะโพกและกระดูกสันหลังชัดเจน
2	15 - 18	마름 ผอม	등뼈와 늑골이 잘 보임 เห็นสะโพกและกระดูกสันหลังได้ชัดเจนโดยไม่ต้องกด
3	18 - 20	적정 สมส่วน	등뼈와 늑골이 보임 เห็นสะโพกและกระดูกสันหลังได้เมื่อออกแรงกด
4	20 - 23	비만 อ้วน	등뼈와 늑골이 잘 보이지 않음 ไม่สามารถมองเห็นสะโพกและกระดูกสันหลังได้
5	>23	과비 อ้วนเกินไป	등뼈와 늑골이 보이지 않음 สะโพกและกระดูกสันหลังถูกไขมันปกคลุมหนาแน่น

อ้อ! งั้นถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะ
อาหารสำหรับหมูที่ตั้งครรภ์ล่ะครับ
ตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงบ่าย 4 โมงเย็น ให้ให้อาหารวันละสองครั้ง
ต้องให้อาหารมันหลังจากทำความสะอาดที่ให้อาหาร
ถ้าหมูกินน้ำมากเกินไปล่ะครับ
ถ้าหมูกินน้ำมากเกินไป
ปริมาณน้ำที่ให้ต่อวันควรอยู่ที่ 10~18 ลิตร
ดังนั้นควรติดตั้งจุกน้ำเพื่อให้มันได้กินน้ำเพียงพอ
ไม่งั้นมันจะเสียความเร็วของการไหลของน้ำด้วย
ถ้าหมูกินน้ำมากเกินไป
ต้องตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลออกจากจุกน้ำ
ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากจุกน้ำควรอยู่ที่ 1.5 ลิตร/นาที
หมูตัวนี้น่าจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิใช่ไหมครับ เพราะมันดูอ่อนแอ
ใช่แล้ว และด้วยเหตุนี้การควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงหมู
ใช่แล้ว เพราะว่าหมูตัวนี้ยังเล็กอยู่ ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับหมูควรจะอยู่ที่ 13~27℃ และความชื้นควรจะอยู่ที่ระดับ 50~60%.

ห๊ะ, ผู้ป่วยก่อนตั้งครรภ์ ก่อนตั้งครรภ์ 2.5ก. รักษาไว้ให้ดี
ต้องมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ ที่ต้องรักษาไว้ 2.5 และอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องรักษาไว้ได้รับการทำความสะอาด
เตรียมไว้ก่อนที่จะตั้งครรภ์
อ่าอ่า!
ห้องนอนของคุณ ดูเหมือนกับเวลาคนเตรียมตัว
แต่งงานเลย และผมถึงได้ใช้น้ำ
ทำความสะอาดดอกเตรียมมาไว้แล้ว
ว้า! ดีมาก ทำได้ดีมาก
ให้บอกเลยนะ อย่าลืมรักษา
เตรียมดอกไม้ที่ตั้งครรภ์ทุกๆ ชั่วโมงนะ
ต่อไป ทำให้ผมสามารถ
ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
ใช่ ผมต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา
ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ใช่แล้ว โดยทั่วไปแล้วปริมาณของอาหารหลังจากที่ผสม
ที่ยูควรจะจำกัดอยู่ที่ 1.8 - 2.2 กก. (900กรัมเนื้อ สำหรับแม่ที่น้ำหนักตัวปกติ และ 1,000กรัมเนื้อ สำหรับแม่ที่น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์) ในช่วงที่มีนคลอดลูกครั้งแรกควรจะลดปริมาณอาหารลง 0.1-0.1 กก. และในหน้าหนาวควรจะเพิ่มปริมาณอาหาร 0.2 - 0.4 กก.
ใช่ ผมต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา
ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ใช่ ผมต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา
ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ


인공수정 후 30~45일 이후에도
재발정이 될 수 있으니 확인이 필요해.
체형점 3.0점도가 적당해.
주의할 점은 30~45 주 사이에 발정 검사를 하는 것이 좋아.
그리고 체형점수는 3.0 정도가 적당해.
아~ 네.
아직 임신이 안정적이지 못한 거군요...
보통 일반적으로 수정이 되면
주사를 맞지 않아도 괜찮아요.
임신말기 임해지는 영양분이 더 필요해서
사료를 매일 2.5~3.0kg 정도로 더 줘야 해.
임신 말기에는 영양분이 더 필요하니
사료를 매일 2.5~3.0kg 정도로 더 줘야 해.
임신 말기에는

4. 포유มโดน관리 การควบคุมดูแลแม่สุกรในช่วงให้นมลูก

새끼는 언제쯤 나와요?
แล้วแม่หมูจะคลอด
ลูกเมื่อไหร่ครับ
ผ่านไปแล้ว
1~2ชั่วโมง 5~30นาทีต่อ 1ตัว
ออกมา 10~15ตัว ทั้งหมด
2~3ชั่วโมง ใช้เวลาทั้งหมด 2-3 ชม.
ในการคลอดลูกหมู 10-15 ตัว
ใช่? ตั้งเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
ลูกเยอะด้วย
ตัวแรกออกมาแล้ว
ตัวแรกออกมาแล้ว
ตัวแรกออกมาแล้ว

ถ้าหากคุณแม่ร่วมมีอาการคลอดยาก นายจะต้องดื่มเกลือหมูดิบ และต้องจัดการช่วยเหลือเพราะการคลอดยากอาจจะกระเทือนกับลูกหมูได้
นี่ๆ
ใช่แล้ว อาการคลอดยากจะระบุได้โดยมีอาการดังนี้
① ลูกหมูไม่คลอดออกมาหลังจากผ่านไป 30 นาที หรือมากกว่า
② รอบการคลอดแต่ละครั้งนานกว่าหนึ่งชม. ขึ้นไป
ถ้าหากลูกหมูไม่ออกมาเลยก็ต้องรีบ
ต้องรีบ
ต้องรีบ

5. 포유자돈 관리 การควบคุมดูแลลูกสุกรที่ยังไม่หย่านม

คลอดลูกแล้ว ครั้งแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับลูกหมู โดยลูกหมูจะต้องได้นมภายใน 12 ชม. หลังจากคลอด
12ชั่วโมง
หมูจะผลิตออกมามากกว่าที่บริเวณหน้าอกเมื่อเทียบกับบริเวณขาหลัง ฉะนั้น ลูกหมูที่มีน้ำหนักตัวน้อยจะต้องได้กินนมจากหน้าอก
โอ้ว- จริงด้วยสินะ เข้าใจล่ะ
ว่า, ทีนี้ก็ถึงเวลาตัดหางมันกัน
เอาล่ะ ทีนี้ขอมาตัดหางมันกัน
เดี๋ยว! ทำไมถึงต้องตัดหางด้วยล่ะครับ
หมูชอบที่จะกัดหางของหมูตัวอื่นๆ ฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เราจะต้องตัดหางมันทิ้ง
จริงด้วยนี่นา... หมูนี่ก็มีนิสัยประหลาดๆ เหมือนกันนะ...
ถึงเวลาตัดเขี้ยวแล้ว
ตัดเขี้ยวเหล็กเหรอครับ
ลูกหมูในช่วงก่อนคลอดจะต้องได้รับการตัดในความยาวเท่าๆ กัน ถ้าหากหางของมันยาวไม่เท่ากัน จะทำให้มันกัดหางกัน และจากนั้นจะต้องตัดฟันเหล็ก 3 วัน หลังจากคลอด
ตัดฟันเหล็ก
ตัดฟันเหล็กเหรอครับ
ตัดฟันเหล็ก
ตัดฟันเหล็ก
ตัดฟันเหล็ก



포유자돈 온도관리

การควบคุมอุณหภูมิสำหรับลูกสุกรที่ยังไม่หย่านม

구분 หัวข้อ	분만 당일 วันที่คลอด	2~3일령 2 – 3 วัน หลังคลอด	4~5일령 4 – 5 วัน หลังคลอด	6~7일령 6 – 7 วัน หลังคลอด	8~9일령 8 – 9 วัน หลังคลอด	10~11일령 10 – 11 วัน หลังคลอด	12~13일령 12 – 13 วัน หลังคลอด	14일령 이상 ≥ 14 วัน หลังคลอด
적온(℃) อุณหภูมิที่เหมาะสม(℃)	37~36	36	35	34	33	32	31	30

6. อิยูซาโต้ ซึ่ง การควบคุมดูแลลูกสุกรหย่านม

ตอนนี้
ลูกหมูหย่านมกัน
ลูกหมูต้องอยู่ด้วยกันและ
เครียดเพราะต้องแยกจากแม่
ลูกหมูหย่านมจะต้องได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์แรกเพื่อลดความเครียดทำให้มันเป็นโรคหรือป่วย
อย่างไรดีล่ะ
ต้องทำ
ยังไงครับ
ต้องมีอุณหภูมิห้องของลูกหมูหย่านมจะต้องอยู่ระหว่าง 28 - 31 ℃ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวลดลงจากอากาศหนาว แล้วจากนั้นจึงค่อยๆ ลดอุณหภูมิลง 1 - 2℃ ในทุกๆ สัปดาห์ จนกว่าจะอยู่ในระดับ 20℃ ในช่วงการอนุบาลลูกหมู
ห้องเลี้ยงลูกหมูหย่านมควรมีอุณหภูมิ 28~31℃ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนักตัวลดลงจากอากาศหนาว
ลูกหมูเครียดหรือป่วย
ลูกหมูเครียดหรือป่วย
ลูกหมูเครียดหรือป่วย

이유 자돈방 적정 수용두수(1㎡ 당)

จำนวนลูกหมูที่เหมาะสมต่อความจุของห้อง (ต่อ 1 ตร.ม.)

체중(kg) น้ำหนัก (กก)	콘크리트 ห้องคอนกรีต	부분슬랏 ห้องแบบจาระรุมาบส่วน	전면슬랏 ห้องแบบจาระรุทั้งหมด
5	7.5	7.6	8.8
10	4.9	5.5	6.1
15	3.7	4.3	4.8
20	3.0	3.6	3.9

사료관리 การควบคุมอาหาร

구 분 หัวข้อ	사료급여방법 วิธีการให้อาหาร	3주정착기 หย่านมสัปดาห์ที่ 3	4주정착기 หย่านมสัปดาห์ที่ 4
정착기 당일 วันที่เริ่มหย่านม (วันที่ 1)	- 정착 후 12시까지 3시간은 사료급여 금지 ให้อาหารเป็นเวลา 3 ชม. จนกระทั่งถึงเวลา 12น. หลังจากหย่านม - 정오 12시 사료급여 ให้อาหารในตอนเที่ยง - 어린돼지를 관찰하여 사료통이 비어 있으면 사료 추가 급여(오후 2시, 4시, 6시에 각각 급여) ตรวจดูสุกรหย่านม และให้อาหารเพิ่มถ้าหากกินอาหารหมด (เวลา บ่าย 2 โมง, 4 โมง และ 6 โมง, ตามลำดับ) - 어린돼지를 관찰하고 청소한 후 사료조에 약 12㎝두께로 사료 급여 ตรวจดูสุกรหลังจากการทำความสะอาด และให้อาหารในภาชนะโดยให้อาหารสูงประมาณ 12 ซม.	두당 사료섭취량은 30 ~ 40g ปริมาณอาหารต่อลูกสุกรหนึ่งตัว: 30 – 40 กรัม 10두당 0.5kg이하 급여 อาหาร 0.5 กก./10 ตัวหรือน้อยกว่า	두당 사료섭취량은 40 ~ 60g ปริมาณอาหารต่อลูกสุกรหนึ่งตัว: 40 – 60 กรัม 10두당 0.7kg이하 급여 อาหาร 0.7 กก./10 ตัวหรือน้อยกว่า
다음 2일 วันที่ 2	- 오전 8시 어린돼지 관찰 후 청소 : 약 12㎝두께로 사료 급여 เวลา 8 โมงเช้า: หลังจากตรวจดูสุกรแล้วให้ทำความสะอาดและให้อาหาร โดยให้อาหารสูงประมาณ 12 ซม. - 오전 11시, 오후 3시 사료급여 ให้อาหารตอน 11 โมง และบ่าย 3 โมง - 오후 7시 분 상태를 보고 밤에 섭취할 양만큼 사료를 사료체식 ในตอนกลางคืน ให้ผักชนิดใดก็ได้ในปริมาณที่เหมาะสม หลังจากที่ตรวจดูสภาพของลูกสุกรตอนหนึ่งทุ่ม	두당 사료섭취량은 60 ~ 80g ปริมาณอาหารต่อลูกสุกรหนึ่งตัว: 60 – 80 กรัม 10두당 0.8kg이하 급여 อาหาร 0.8 กก./10 ตัวหรือน้อยกว่า	두당 사료섭취량은 70 ~ 100g ปริมาณอาหารต่อลูกสุกรหนึ่งตัว: 70 – 100 กรัม 10두당 1kg이하 급여 อาหาร 1 กก./10 ตัวหรือน้อยกว่า
3일 วันที่ 3	- 어린돼지의 상태를 면밀이 관찰 ตรวจสภาพของลูกสุกรอย่างใกล้ชิด - 사료섭취량, 분 상태 등 문제가 없으면 2~3배 많의 사료를 급여 ถ้าหากไม่พบปัญหาใดๆเกี่ยวกับ ปริมาณอาหาร สภาพร่างกาย ฯลฯ ให้เพิ่มอาหารเป็น 2-3 เท่า		

7. 육성·비육돈 관리 การควบคุมดูแลสุกรรุ่นและสุกรขุน

พี่ชาย! พี่ชาย! อยู่ไหน—??
พี่ชาย! พี่ชาย! นายอยู่ไหนน่ะ
ที่ฟาร์มหมูขุนครับ
อยู่นี่เอง ช่วงนี้เป็นไงบ้าง
เราแบ่งหมูเป็นหมูขุน (หมูที่มีขนาดเล็ก ปานกลาง) และหมูขุน (หมูที่มีขนาดใหญ่) กันดีไหม
ใช่ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาขายแล้ว
ฟังดูเหมือนจะมีเรื่องเยอะเลยนะ
ใช่ครับ
ฟาร์มหมูขุนกับฟาร์มหมูขุนต่างกันยังไงเหรอ?
ฟาร์มหมูขุนเป็นฟาร์มที่เลี้ยงลูกหมูจนกลายเป็นหมูขุนใช่ไหม
ใช่ครับ
ฟาร์มหมูขุนเป็นฟาร์มที่เลี้ยงหมูขุนให้ขายเนื้อใช่ไหม
ใช่ครับ
ฟาร์มหมูขุนกับฟาร์มหมูขุนต่างกันยังไงเหรอ?
ฟาร์มหมูขุนกับฟาร์มหมูขุนต่างกันยังไงเหรอ?
ใช่ครับ

육성·비육돈사
내부 온도는 15~20℃ 정도,
습도는 50~60% 정도를
유지해 주는 게 좋아.
อุณหภูมิภายในของ
คอกเลี้ยงหมูขุนและ
หมูขุนควรจะอยู่ที่
15 - 20℃ และมี
ความชื้น 50 - 60%
돼지는 온도만 맞춰주면
되지 않을까요?
ไม่ใช่แค่การควบคุม
อุณหภูมิอย่างเดียวเหรอครับ
ที่สำคัญกับการเลี้ยงหมู
아니, 돼지들은 습도에 따라
체감도가 다른데,
같은 온도라도 습도가 높으면
체감온도는
더 높게 나타난다네.
ไม่ใช่นะ หมูแต่ละตัว
จับความชื้นได้ต่างกัน
โดยในอุณหภูมิ
ห้องที่เท่ากัน ห้อง
ที่มีความชื้นสูงกว่าจะทำให้
หมูรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงกว่า
아하! 그렇군요,
알겠습니다
이렇게 온도와 습도를 관리하자면
적절한 환기가 중요하겠지?
นอกจากนี้ อากาศที่
ถ่ายเทพอเหมาะก็สำคัญ
พอๆกับอุณหภูมิและความชื้น
넵! 알겠습니다!
아! 이해했습니다!
쌤님! 내일 새끼돼지들
육성돈방으로 옮기는 거 맞지?
สัมโส นายรู้ใช่ไหมว่า
พรุ่งนี้จะต้องมีการเคลื่อน
ย้ายลูกหมูเข้าคอกเลี้ยงหมูขุน
네.
하지만 뭘 준비해야 할 지
잘 모르겠어요.
ครับ แต่ผมไม่แน่ใจ
ว่าจะต้องเตรียมการอย่างไร
บ้างในวันพรุ่งนี้
먼저, 돼지들을 옮길 때는 돈사단위 또는 돈방단위로
한꺼번에 넣고 한꺼번에 빼내야 해.
청소와 소독도 깨끗하게 해주는 게 좋겠지?
อย่างแรกเลย การเคลื่อนย้ายจะต้อง
ทำทีละคอก หรือทีละห้อง โดย
ให้ย้ายเข้าและออกพร้อมๆกัน และ
ควรจะทำการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดด้วย

ใช่, เพื่อนๆ ที่เข้ามาดูงานที่ฟาร์มของเราก็ชอบถามเรื่องนี้เหมือนกัน
ลูกหมูที่เกิดใหม่ต้องการอาหารเสริมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตใช่ไหมครับ
ใช่ครับ ลูกหมูจะเริ่มกินอาหารเสริมได้ตั้งแต่อายุ 7 วันเป็นต้นไป
ส่วนปริมาณอาหารเสริมที่ให้ลูกหมูกินต่อวันนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวลูกหมูเป็นหลัก
ถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ควรจะตรวจสอบว่ามีการอุดตันหรือเสียหายของท่อน้ำและจุกน้ำหรือเปล่า
ใช่, ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ

돈반 1㎡당 체중별 적정 수용두수

ความจุของจำนวนสุกร /1ตร.ม./น้ำหนัก

체중(kg) น้ำหนัก (กก.)	콘크리트 돈사 โรงเลี้ยงแบบคอนกรีต	부분슬랏 돈사 โรงเลี้ยงแบบเจาะรูบางส่วน	전면슬랏 돈사 โรงเลี้ยงแบบเจาะรูทั้งหมด
25	2.6	3.1	3.4
30	2.3	2.7	3.0
35	2.1	2.5	2.7
40	1.9	2.2	2.4
45	1.7	2.1	2.3
50	1.6	1.9	2.1
55	1.5	1.8	2.0
60	1.4	1.4	1.9
65	1.4	1.4	1.8
70	1.3	1.7	1.7
75	1.2	1.3	1.6
80	1.2	1.6	1.5
85	1.2	1.3	1.5
90	1.1	1.2	1.4
95	1.1	1.5	1.4
100	1.0	1.2	1.3
105	1.0	1.1	1.3
110	1.0	1.5	1.2
115	0.9	1.1	1.2

ใช่แล้ว หมูควรจะได้รับอาหารสำหรับหมูขุนจนกระทั่งพวกมันมีน้ำหนักตัว 48-95 กก. ซึ่งจะให้เปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับหมูขุนซึ่งจะให้ไปจนกว่าจะถึงวันปล่อยพวกมันเข้าโรงเชือด
ใช่แล้ว
ถ้าหมูกินอาหารมากเกินไปและเร็วเกินไป เดี๋ยวให้พวกมันมีสุขภาพดี
ใช่แล้ว
ควรจะปรับความสูงของจุกน้ำให้เหมาะสมกับความสูงของปากของหมู โดยจุกน้ำควรจะสามารถให้น้ำไหลเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งจุกน้ำหนึ่งตัวควรจะใช้กับหมู 10 ตัว
ไม่สูงไม่ต่ำเกินไป
ควรจะปรับอุณหภูมิ
ในโรงเลี้ยงให้เหมาะสม
ควรจะวัดภายใต้เงื่อนไขที่หมูได้พักผ่อนในเวลาที่สมควร
ควรจะปรับอุณหภูมิ
ห่างกันเกินไปหรือเปล่า
ใช่แล้ว ถ้าหากอุณหภูมิต่ำเกินไปให้เปิดหน้าต่างหรือเปิดระบบทำความร้อน และถ้าหากอุณหภูมิสูงเกินไปให้เปิดหน้าต่างเพื่อเอาอากาศเข้ามา
ครับ เข้าใจละ

หมูขุนพร้อมขาย ข้อควรระวังในการตรวจสอบค่าน้ำหนักเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์	ข้อควรปฏิบัติ สิ่งที่ต้องทำ
- อายุเท่าไรหมูถึงเกณฑ์ขาย? น้ำหนักของสุกรเหมาะสมหรือไม่หลังจากการหย่านม	- อายุหมูขุนพร้อมขาย ตรวจสอบค่าน้ำหนักของสุกรหลังการหย่านม
- ปริมาณอาหารเพียงพอหรือไม่? การควบคุมการให้น้ำหนักเหมาะสมหรือไม่	- ป้องกันไม่ให้อดอาหาร ควรปรับเพื่อป้องกันการขาดแคลนที่เกิดจากความผิดพลาด
- น้ำดื่มสะอาดหรือไม่? การควบคุมการให้น้ำเหมาะสมหรือไม่	- น้ำดื่มสะอาดหรือไม่? ระบบ, ปริมาณ ทำความสะอาด น้ำสะอาดหรือไม่? รวมถึงตรวจสอบปริมาณน้ำและน้ำจากหูกน้ำ
- ปริมาณอาหารเพียงพอหรือไม่? มีช่วงระหว่างสุกรในแต่ละตัวมากเกินไปไหม	- ปริมาณอาหารเพียงพอ ความแม่นยำโดยแยกกลุ่มสุกรมากกว่าการจัดกลุ่มสุกรใหม่
- อาหารที่ให้ถูกต้องหรือไม่? อาหารเป็นพิษหรือไม่	- อาหารที่ให้ถูกต้อง อาหารที่เสื่อมคุณภาพควรได้รับการตรวจสอบตัวอย่างเก็บไว้ในตู้เย็นและส่งเพื่อทำการวิเคราะห์
- อาหารเพียงพอหรือไม่? จำนวนมื้ออาหารเพียงพอหรือไม่	- อาหารเพียงพอ ควรจัดให้มีปริมาณมื้ออาหารเพียงพอ
- สุขภาพดีหรือไม่? พบโรคหรือไม่	- สุขภาพดี ดูวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค
- อาหารที่เหมาะสมกับการเติบโตของสุกรหรือไม่? ปริมาณอาหารเหมาะสมกับการเติบโตของสุกรหรือไม่	- อาหารที่เหมาะสมกับการเติบโตของสุกร ควรศึกษาจากคู่มือที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้มา
- น้ำดื่มสะอาดหรือไม่? อุณหภูมิและความชื้นของอากาศเหมาะสมหรือไม่	- น้ำดื่มสะอาด ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการเลี้ยงสุกรและการเจริญเติบโตของสุกร

8. 출하관리 및 도축

การควบคุมการย้ายสุกรออกและการนำเข้าโรงเชือด

80cm
90cm
ลำบากใจ ที่ ① ทางเดินเรือนเป็นเส้นทางที่ลาดชันเกินไป
② ทางเดินเรือนมีสิ่งกีดขวางที่ไม่ควรมี ③ ทางเดินเรือนไม่ราบเรียบ
④ ทางเดินเรือนมีความชื้นมากเกินไป ⑤ ทางเดินเรือนมีความสูง
80 ซม. และมีความกว้าง 90 ซม. เพื่อกันไม่ให้หมูวิ่งหนี
ขณะปล่อยหมูออก ① ระวังไม่ให้ทาง
ขนย้ายหมูมีความชันมากเกินไป ② เคลื่อนย้าย
สิ่งกีดขวาง ③ ปูให้พื้นไม่ขรุขระ เพื่อป้องกันน้ำขัง
④ กั้นสองข้างทางด้วยแผ่นกั้นหรือผ้าเพื่อไม่ให้
มองเห็นวิวข้างนอก ⑤ ทางเดินควรมีความสูง
80 ซม. และมีความกว้าง 90 ซม. เพื่อกันไม่ให้หมูวิ่งหนี

สุดท้าย หมูที่ต้องการ
ไม่มีอาหารเหลือ
ก็ดีนะครับ
ถูก, ถ้าหมูไม่มีอาหารเหลือ
ก็ไม่มีมูลเหลือ
ไม่เกิดความเครียด

ใช่
ผมจะทำตามทุกขั้นตอนที่บอกมาเลย

9. 기타 관리사항 การควบคุมดูแลอื่นๆ

농가 차단방역 요령 เคล็ดลับในการป้องกันโรคติดต่อภายในฟาร์ม

- 소독 전 청소 การทำความสะอาดก่อนการฆ่าเชื้อ

- 축사바닥 및 토양 พื้นและดินของโรงเลี้ยงหมู

- 분변 등 오물 สิ่งปฏิกูลและอุจจาระ ฯลฯ

- 정문 소독조 및 축사입구 소독조 ถังฆ่าเชื้อสำหรับประตูทางเข้า และทางเข้าโรงเลียง

● 농장 출입구에서의 소독 การฆ่าเชื้อที่บริเวณทางเข้าฟาร์ม

● 출사 출입구에서의 소독 การฆ่าเชื้อที่ทางเข้าโรงเลี้ยงสัตว์

● 농장 내·외부 등 소독 การฆ่าเชื้อที่ภายในและภายนอกโรงเลี้ยง

● 소독기구 เครื่องมือสำหรับการฆ่าเชื้อ

구제역 백신접종 주의사항
ข้อควรระวังสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า

백신은 반드시 2~8℃에서 냉장 보관.

- 백신은 얼지 않도록 주의하십시오.

เก็บวัคซีนในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C

- ระวังอย่าให้วัคซีนแข็ง



겨울철은 따뜻하게(20℃ 이하)하여 접종.

- 너무 높은 온도로 끓이면 백신의 효과가 떨어짐.
- 항온수조가 없는 경우 백신을 실내에 두었다가 사용.

ในฤดูหนาวให้อุ่นวัคซีนก่อนการฉีด (20°C หรือต่ำกว่า)

- วัคซีนอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพได้ถ้าหากอุ่นในอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- ถ้าหากไม่สามารถแช่วัคซีนในน้ำที่มีอุณหภูมิคงที่ได้ ให้ทิ้งวัคซีนไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนใช้

따뜻하게 한 백신은 사용(주사) 전까지 따뜻하게 유지.

- 백신병을 옷 주머니에 넣거나 보온박스에 보관.
- 주사기, 주사바늘도 따뜻하게 해야 백신의 온도 유지가 잘됨.

รักษาให้วัคซีนอุ่นจนกระทั่งใช้งาน (ฉีด)

- วางขวดวัคซีนลงในกระเป๋าผ้าหรือกล่องทำความร้อน
- อุณหภูมิของวัคซีนจะคงที่ถ้าหากกระบอกฉีดและเข็มอุ่นอยู่เสมอ



주사바늘은 1침 5두 이내로 위생적으로 접종.

- 침으로 여러마리 접종 시 주사침이 오염되고 뭉뚝해져서 접종부위 손상되어 이상육이 발생할 수 있음.

การฉีดวัคซีนควรจะใช้เข็ม 1 เล่ม ต่อสุกร 5 ตัว

- ถ้าหากใช้เข็มเดิมซ้ำๆในการฉีดวัคซีหลายตัว เข็มที่ใช้ฉีดอาจจะมีการปนเปื้อนและอาจจะทื่อลงได้ ส่งผลให้เกิดการบอบช้ำในบริเวณที่ฉีดและอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อผิดปกติ



1회용 주사기 사용 권장.

- 연속주사기 사용 시 적정량의 백신(2㎖)이 가축 체내에 주입된 것을 확인한 후 주사바늘 제거.

ควรใช้กระบอกฉีดแบบใช้แล้วทิ้ง

- ในกรณีที่มีการใช้กระบอกฉีดซ้ำ ควรจะเปลี่ยนเข็มหลังจากตรวจให้แน่ใจแล้วว่าวัคซีนถูกฉีดเข้าร่างกายสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสม (2 มล.)



* ฉีดเขากล้ามเนื้ออย่างแม่นยำ
(บริเวณเส้นประสีน้ำเงิน)

백신은 근육 안에 정확하게 주입.

- 지방층에 주입되면 이상육이 발생되고 항체형성이 미흡할 수 있음.

จะต้องให้วัคซีนโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้ออย่างแม่นยำ

- เนื่องจากถ้าหากฉีดพลาดเข้าชั้นไขมันจะทำให้กล้ามเนื้อเจริญผิดปกติและอาจจะม่เกิดการสร้างแอนติบอดี้

질병에 따른 백신 사용법
วิธีการฉีดวัคซีนแบ่งตามโรค

예방접종명 ชื่อวัคซีน	접종시기 ช่วงที่ควรฉีดวัคซีน	비 고 หมายเหตุ	주사방법 (근육, 피하) วิธีการฉีด (ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นไขมัน)
전염성위장염 + 로타바이러스 감염증 (TGE+ROTA)	**모돈** ·1차접종 : 분만 5–6주전 ·2차접종 : 분만 3주전	생독백신	근육
ทางเดินอาหารติดเชื้อ + การติดเชื้อไวรัสโรตา (TGE + ROTA)	**แม่สุกร** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 5-6 สัปดาห์ก่อนคลอด · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: 3 สัปดาห์ก่อนคลอด	วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
돼지 유행성 설사병 (PED)	**모돈** ·1차접종 : 분만 10주전(생독) ·2차접종 : 분만 5–7주전(불활화) ·3차접종 : 2차접종 3주후(불활화)	생독백신 불활화백신	근육
โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED)	**แม่สุกร** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 10 สัปดาห์ก่อนคลอด (วัคซีนเชื้อเป็น) · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: 5-7 สัปดาห์ก่อนคลอด (วัคซีนเชื้อตาย) · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 3: หลังการฉีดวัคซีนครั้งที่สอง 3 สัปดาห์ (วัคซีนเชื้อตาย)	วัคซีนเชื้อเป็น (Live Vaccine) วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
써코바이러스 (Circo)	**자돈** ·생후 3주령	불활화백신	근육
เซอร์โคไวรัส (Circo)	**ลูกสุกร** · 3 สัปดาห์หลังคลอด	วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
ชื่อวัคซีน	ช่วงที่ควรฉีดวัคซีน	หมายเหตุ	วิธีการฉีด (ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นไขมัน)
위축성비염 (AR) + 파스튜렐라폐렴 + 글래써씨병 + 흉막폐렴 + 연쇄상구균감염증 + 유행성폐렴	**모돈** ·1차접종 : 분만 4~5주전 ·2차접종 : 1차접종 2주후 **자돈** ·1차접종 : 생후 3~4주령 ·2차접종 : 1차접종 2주후 **웅돈, 후보돈** ·1차접종 : 종부 4~5주전 ·2차접종 : 1차 접종 2주후	불활화백신	근육
โรคโพรงจมูกอักเสบ (AR) + โรคอหิวาตกโรคในสุกร (swine pasteurellosis) + โรคเกลสเซอร์ (Glasser's disease) + โรคปอด (pleuropneumonia) + โรคเสร็ปโทคอคโคซิส (streptococcosis) + โรคเอ็นซูติกนิวโมเนีย (enzootic pneumoniae) ในสุกร	**แม่สุกร** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 4-5 สัปดาห์ก่อนคลอด · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังฉีดวัคซีนครั้งแรก 2 สัปดาห์ **ลูกสุกร** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 3-4 สัปดาห์หลังคลอด · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังฉีดวัคซีนครั้งแรก 2 สัปดาห์ **สุกรตัวผู้และสุกรสาว** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 4-5 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์ · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังฉีดวัคซีนครั้งแรก 2 สัปดาห์	วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
돼지열병 (HC) + 돈단독 (SE)	**자돈** ·생후 55~70일령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 5–6주령, 2차접종 : 생후 8–9주령) **모돈, 웅돈** ·매년 1회	생독백신	피하
โรคอหิวาต์สุกร (HC) +โรคไฟลามทุ่งในสุกร (SE)	**ลูกสุกร** · 55-70 วัน หลังคลอด * ทุกๆการฉีดวัคซีน 2 ครั้ง (ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1:หลังคลอด 5-6 สัปดาห์, ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังคลอด 8-9 สัปดาห์) **แม่สุกร และ สุกรตัวผู้** · ปีละหนึ่งครั้ง	วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine)	ฉีดเข้าชั้นไขมัน

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
ชื่อวัคซีน	ช่วงที่ควรฉีดวัคซีน	หมายเหตุ	วิธีการฉีด (ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นไขมัน)
돼지열병 (HC)	**자돈** ·생후 55~70일령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 5–6주령, 2차접종 : 생후 8–9주령) **모돈, 웅돈** ·매년 1회	생독백신	근육
โรคอหิวาต์สุกร (HC)	**ลูกสุกร** · 55-70 วัน หลังคลอด * ทุกๆการฉีดวัคซีน 2 ครั้ง (ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1:หลังคลอด 5-6 สัปดาห์, ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังคลอด 8-9 สัปดาห์) **แม่สุกร และ สุกรตัวผู้** · ปีละหนึ่งครั้ง	วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
돈단독 (SE)	·1차접종 : 생후 8주령 ·2차접종 : 생후 12주령	생독백신	근육
โรคไฟลามทุ่งในสุกร (SE)	· ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: หลังคลอด 8 สัปดาห์ · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังคลอด 12 สัปดาห์	วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

예방접종명	접종시기	비 고	주사방법 (근육, 피하)
ชื่อวัคซีน	ช่วงที่ควรฉีดวัคซีน	หมายเหตุ	วิธีการฉีด (ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นไขมัน)
돼지 호흡기 생식기 증후군 (PRRS)	**모돈** ·1차접종 : 종부 5주전 ·2차접종 : 종부 2주전 **자돈** ·1차접종 : 생후 3–4주령 ·2차접종 : 1차 접종 3주후 **후보돈** ·종부 3–4주전	생독백신 불활화백신	근육
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและการสืบพันธุ์ในสุกร (PRRS)	**แม่สุกร** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 5 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์ · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: 2 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์ **ลูกสุกร** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 3-4 สัปดาห์หลังคลอด · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 3: หลังฉีดวัคซีนครั้งแรก 2 สัปดาห์ **สุกรสาว** · 3-4 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์	วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine) วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
일본뇌염 (JE)	**성돈** ·4월 **후보돈** ·1차접종 : 3월 ·2차접종 : 4월	생독백신	근육
โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น (JE)	**สุกรโตเต็มวัย** · เดือนเมษายน **สุกรสาว** · การฉีดวัคซีนครั้งแรก: เดือนมีนาคม · การฉีดวัคซีนครั้งที่สอง: เดือนเมษายน	วัคซีนเชื้อเป็น (Live vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

예방접종명 ชื่อวัคซีน	접종시기 ช่วงที่ควรฉีดวัคซีน	비 고 หมายเหตุ	주사방법 (근육, 피하) วิธีการฉีด (ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าชั้นไขมัน)
파보바이러스병 (PPV)	**모돈** ·분만 3주후 **종모돈** ·6개월마다 보강접종 **후보돈** ·1차접종 : 종부 4주전 ·2차접종 : 종부 2주전	불활화백신	근육
โรคพาร์โวไวรัสในสุกร (PPV)	**แม่สุกร** · 3 สัปดาห์หลังคลอด **สุกรแม่พันธุ์** · การฉีดวัคซีนเสริมทุกๆ 6 เดือน **สุกรสาว** · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1: 4 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์ · ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: 2 สัปดาห์ก่อนผสมพันธุ์	วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
구제역 (FMD)	**모돈** ·분만 3주전 **성돈, 육성돈** ·6개월마다 보강접종 **자돈** ·생후 8주령 * 2회 접종시 (1차접종 : 생후 8주령, 2차접종 : 생후 12주령)	불활화백신	근육
โรคปากและเท้า (FMD)	**แม่สุกร** · 3 สัปดาห์ก่อนคลอด **สุกรโตเต็มวัย สุกรรุ่น** · การฉีดวัคซีนเสริมทุกๆ 6 เดือน **ลูกสุกร** · 8 สัปดาห์หลังคลอด * ทุกๆการฉีดวัคซีน 2 ครั้ง (ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1:หลังคลอด 8 สัปดาห์, ฉีดวัคซีนครั้งที่ 2: หลังคลอด 12 สัปดาห์)	วัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

백신 등 동물용의약품 보관 및 사용방법
การเก็บและการใช้ยารวมถึงวัคซีนสำหรับสัตว์

- 백신 및 호르몬제는 냉장고 내에서 2~8℃ 이내로 보관.
- 스티로폼 박스 상단을 제거하고 냉장고에 보관.
- 냉장고에는 최고 · 최저 온도계 비치하여 수시로 온도 확인.
- 약품은 직사광선을 피하고 서늘한 보관함에 사용약제와 미사용 약제 별도 보관.
- 보관상태가 불량한 약제나 유효기간이 지난 약제는 주기적으로 폐기.
- 사용 후 남은 백신 및 호르몬제 돈사내 방치 금지.
- 약품 사용자는 약품의 휴약 기간을 확인한 후 사용.

- ควรเก็บวัคซีนและฮอร์โมนในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 °C
- เก็บสารในตู้เย็นโดยเปิดฝากล่องโฟมไว้
- ตรวจสอบอุณหภูมิเป็นระยะโดยใช้ปรอทที่ติดตั้งอยู่ในตู้เย็นวัดอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงและเก็ยรักษาตัวยาในกล่องเก็บความเย็น แบ่งตัวยาเป็นยาที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้
- ควรหมั่นทิ้งยาที่อยู่ในภาชนะที่เสียหายหรือหมดอายุ
- ไม่ควรทิ้งวัคซีนหรือฮอร์โมนที่เหลือจากการใช้ไว้ในโรงเลี้ยงสัตว์
- ผู้ใช้ยาจะต้องตรวจสอบเวลาพักของยาก่อนการใช้ยา

부록 : 양돈 용어 해설
ภาคผนวก: คำอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในการทำฟาร์มสุกร

거세(castration)

수컷의 고환을 제거하는 등의 방법으로 번식능력을 제거하는 것. 수퇘지의 경우 자돈의 고환을 제거함으로써 육질개선 효과를 거두고, 성질이 온순해져 군사가 용이하게 됨.

การตอน (Castration)

วิธีการที่ใช้ในการทำให้เพศผู้สูญเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ เช่น การตัดลูกอัณฑะ ในสุกรตัวผู้ การตัดลูกอัณฑะของลูกหมูจะช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื้อและทำให้หมูมีบุคลิกสุภาพขึ้น ซึ่งทำให้การให้อาหารเป็นกลุ่มเป็นไปได้ง่ายขึ้น

경산돈(sow)

출산한 경험이 있는 암퇘지.

แม่สุกร (Sow)

สุกรเพศเมียที่เคยผ่านการคลอดลูกมาแล้ว

구제역(foot & mouth disease; FMD)

소, 돼지, 면 · 산양 등의 우제류 동물에 전염하는 급성 법정전염병. FMD 바이러스에 의해 발병되며, 발열, 지제관부의 수포형성 또는 입술이나 혀의 수포형성을 유발하는 급성의 전염병으로 그 전염성이 매우 강한 질병.

โรคปากและเท้า (FMD)

โรคติดเชื้อเฉียบพลันที่แพร่ในหมู่สัตว์ที่มีกีบเท้า เช่น วัว หมู แพะ และ ฯลฯ โรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส FMD ทำให้เป็นไข้และมีตุ่มพองขึ้นตามปากหรือลิ้น

귀표(ear mark; ear notch; ar punch)

가축의 귀를 잘라 개체표시를 하는 특정적인 표시.

ตำหนิที่หู/รอยบากที่หู/รอยเจาะที่หู (Ear Mark; Ear Notch; Ear Punch)

การทำเครื่องหมายบนหูสัตว์เพื่อให้สามารถจำสัตว์แต่ละตัวได้

귀표장착기(marking clipper)

귀표를 가축에 장착하는 도구.

ที่ทำเครื่องหมาย (Marking Clipper)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องหมายที่หูสัตว์

그룹관리(batch system)

한 농장에서 기르고 있는 돼지를 몇 개의 그룹으로 나눠서 한꺼번에 교배와 분만 등이 일어날 수 있게 하는 사육 방법으로서, 동시입출하가 가능해서 돼지의 질병을 감소시킬 수 있는 게 장점임.

ระบบการจัดกลุ่ม (Batch System)

วิธีการเลี้ยงสุกรโดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเพื่อการผสมพันธุ์และการคลอด โดยวิธีดังกล่าวช่วยลดอัตราการเกิดโรคเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา

깔짚(bedding; litter)

분뇨의 흡착, 동물의 보온 및 물리적 충격 완화를 위해 바닥에 깔아주는 재료.

วัสดุรองพื้น (Bedding/ Litter)

วัสดุที่ใช้รองพื้นเพื่อรองรับมูลของสุกร รวมถึงช่วยให้ความอบอุ่นแก่สัตว์และกันการกระแทก

단미(docking; detailing)

식미벽(tail biting)을 예방하고 청결과 미관을 유지하기 위해 가축의 꼬리를 미근부부터 제 2관절에서 절단하는 것으로, 돼지, 면양, 개에서 실시함.

การแต่งหาง(Docking/ Detailing)

การตัดปลายหางของสัตว์ที่บริเวณข้อที่สองซึ่งทำใน สุกร สุนัข และ แกะ เพื่อป้องกันการกัดหางและเพื่อความสะอาดและความสวยงาม

물돼지고기(watery pork) → 피에스이(PSE).

เนื้อหมูชุ่มน้ำ (Watery Pork → PSE)

미경산돈(gilt)

자돈을 생산하는 분만의 경험이 없는 암퇘지.

สุกรสาว (Gilt)

สุกรเพศเมียที่ไม่เคยผ่านการคลอดลูกมาก่อน

발정(estrus; heat)

동물의 암컷에서 교미욕이 발현되어 수컷과 교미를 허용하는 상태를 말하는데, 난소에서 난포가 발육됨에 따라 혈중에 스트로겐 농도의 상승에 의하여 발현되며 배란에 앞서서 나타남.

การติดสัด (Estrus/ Heat)

อาการของสุกรเพศเมียที่ยอมให้สุกรเพศผู้ผสมพันธุ์ โดยจะแสดงออกถึงความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือด และการเจริญของถุงไข่จากรังไข่ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการตกไข่

발정재귀일(return to estrus after weaning)

암퇘지가 이유한 후에 다시 발정이 오는데 걸리는 기간을 말하며, 대개 7일 이내에 발정이 오는 것이 좋음.

การติดสัดหลังหย่านม (Return to Estrus after Weaning)

ช่วงเวลาที่สุกรตัวเมียกลับมาติดสัดอีกครั้งหลังจากลูกหย่านม ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ภายใน 7 วัน

발정지속시간(duration of estrus)

발정의 개시로부터 종료까지의 기간을 말하며, 소는 10~30시간(평균 21시간), 말은 4~11일(평균 7일), 돼지는 미경산동 25~95시간(평균 55시간), 경산돈 52~85시간(평균 70시간)임.

ระยะเวลาการติดสัด (Duration of Estrus)

ช่วงเวลาจากการเริ่มถึงสิ้นสุดการติดสัด: 10 - 30 ชม. สำหรับวัว (เฉลี่ย 21 ชม.), 4 - 11 วัน สำหรับม้า (เฉลี่ย 7 วัน), 25 -95 ชม. สำหรับสุกรยกเว้นสุกรสาว (เฉลี่ย 55 ชม.) และ 52 - 85 ชม. สำหรับสุกรสาว (เฉลี่ย 70ชม.)

발정행동(estrous behavior)

발정기의 암컷에서 나타나는 성적 행동으로 정서적으로 매우 흥분된 상태를 나타내고, 거동이 불안하여 이리저리 돌아다니며, 때로는 울기도 하고, 외음부가 종창되며, 수컷이 접근하면 교미자세를 취하게 됨.

พฤติกรรมการติดสัด (Estrous Behavior)

พฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกในสุกรเพศเมียช่วงติดสัด โดยจะมีอาการตื่นเต้น กระสับกระส่าย และในบางครั้งจะส่งเสียงร้อง ช่องคลอดจะมีอาการบวมและสุกรจะอยู่ในท่าผสมพันธุ์เมื่อเข้าใกล้สุกรตัวผู้

배합사료(formula feed)

두 가지 또는 그 이상의 원료사료를 목적하는 비율로 배합 또는 가공한 사료.

ส่วนผสมอาหาร (Formula Feed)

การผสมอาหารสัตว์สองชนิดหรือมากกว่าเข้าด้วยกันตามสัดส่วนที่ต้องการ

백신(vaccine)

병원체의 감염을 예방할 목적으로 사용되는 면역원. 병원성을 약화시킨 바이러스(또는 약독생균) 백신, 불활화 바이러스(또는 사균) 백신으로 대별.

วัคซีน (Vaccine)

สารภูมิต้านทานที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยแบ่งเป็นวัคซีนที่ประกอบไปด้วยเชื้อไวรัสเจือจาง (วัคซีนเชื้อเป็น หรือ live vaccine) และวัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccine)

분뇨처리(manure management)

분뇨를 수집 저장 및 이용하는 관리 방법.

การจัดการมูลสัตว์ (Manure Management)

วิธีการในการควบคุมจัดการมูลสัตว์ โดยการเก็บ สะสม และนำไปใช้

분만실(maternity pen)

새끼 분만 및 포유를 위하여 별도로 설치된 방.

คอกคลอด (Maternity Pen)

คอกที่แยกออกมา โดยใช้สำหรับการคลอดและเลี้ยงแม่และลูกสุกรแรกคลอด

분만징후(sign of approaching parturition)

골반인대가 이완되며, 외음부는 충혈 · 종창되고, 외음부로부터 점조성이 있는 점액이 누축되며, 유방이 발달되고, 돼지와 같은 다태동물에서는 새끼의 보금자리를 준비함.

สัญญาณก่อนคลอด (Sign of Approaching Parturition)

กล้ามเนื้อเชิงกรานจะคลายตัว ช่องคลอดจะมีเลือดคั่งและบวมขึ้น มีเมือกเหลวออกจากช่องคลอดทรวงอกตั้งเต้า โดยในสัตว์ที่ออกลูกเป็นคอก เช่น สุกร จะมีการแสดงพฤติกรรมการสร้างรังด้วย

비육(fattening)

고기를 생산할 목적으로 한 가축 생산, 또는 가축의 체지방 축적을 촉진시켜 살찌우는 사육 과정.

การเพิ่มไขมัน (Fattening)

ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์หรือการผลิตเนื้อ โดยการเน้นเพิ่มไขมันในสัตว์

비육돈(finishing pig)

식욕 생산을 할 목적으로 시장 출하체중에 도달할 때까지 사육하는 돼지 개체군. 돼지의 성장률이 빨라서 단시일 내에 시장 출하체중에 도달할 수 있어야 하고, 도체는 지방층이 얇고 정육률이 높아야 하며 저렴한 사료비를 들여서 사육할 수 있는 돼지가 비육돈으로 이상적임.

สุกรขุน (Finishing Pig)

คือสุกรที่มีน้ำหนักใกล้ถึงเกณฑ์น้ำหนักที่ทางตลาดกำหนด โดยวัดจากอัตราการเติบโตที่รวดเร็วของสุกรหรือกลุ่มสุกรที่เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อ โดยเนื้อสัดส่วนที่จะนำมาขายจะต้องมีชั้นไขมันบางและมีอัตราส่วนของเนื้อมาก สุกรที่สามารถเติบโตได้ด้วยการให้อาหารที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงจะมีความเหมาะสมที่สุด

사료첨가제(feed additives)

영양적 또는 특정 목적을 위하여 사료에 미량으로 첨가되는 물질의 총칭.

สารที่ใส่ในอาหาร (Feed Additives)

ชื่อเรียกรวมๆสำหรับสารที่ใส่ในอาหารสัตว์ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสารอาหารหรือเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง

사산(stillbirth)

태아가 출생된 후에 생활능력을 가질 수 있는 최단 임신 기간이 지난 후에 죽어서 만출되는 것을 말하며 이 시기 이전에 만출되는 것은 유산이라고 함. 사산에는 분만 직전 또는 분만 과정에서 사망한 것도 포함됨.

ตัวอ่อนสุกรที่ตายในครรภ์ (Stillbirth)

ตัวอ่อนสุกรที่ตายในท้องซึ่งคลอดออกมาหลังจากครบระยะเวลาตั้งครรภ์ตามกำหนด ซึ่งเป็นระยะเวลาที่โดยทั่วไปตัวอ่อนจะสามารถมีชีวิตได้นอกครรภ์ โดยถ้าหากตัวอ่อนที่ตายแล้วออกมาจากครรภ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนดจะเรียนว่า “การแท้ง” ตัวอ่อนที่ตายในครรภ์นี้รวมถึงสุกรที่ตายขณะที่กำลังคลอดหรือก่อนระยะเวลาคลอดไม่นาน

사육밀도(stocking density)

한 공간에 수용하는 가축의 두수 또는 두당 제공 면적.

ความแออัดของสุกร (Stocking Density)

ขนาดพื้นที่ที่สามารถรองรับจำนวนสุกรหรือจำนวนต่อหัวของสุกรต่อพื้นที่

산자수(litter size)

다태동물이 분만하여 생산된 새끼의 수.

ขนาดครอก (Litter Size)

จำนวนลูกที่คลอดออกมาโดยสัตว์ที่ออกลูกเป็นครอก

상대습도(relative humidity RH)

특정 온도에서 공기가 함유할 수 있는 최대 수증기량과 실제로 함유하고 있는 수증기량과의 비율, 관계습도라고도 함.

ความชื้อสัมพัทธ์ (Relative Humidity หรือ RH)

อัตราของความชื้น ต่อ ความชื้นสูงสุดในอากาศที่อุณหภูมิจำเพาะ

설사(diarrhea)

사료이상, 관리이상, 환경이상, 질병 등에서 유래하는 소화기 장해로 수양성비정상 배변을 증세로 함.

ท้องร่วง (Diarrhea)

ความผิดปกติของระบบย่อยอาหารที่เกิดจากอาหารสัตว์ การควบคุม หรือสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ หรือเกิดจากโรค ฯลฯ โดยอาการที่ปรากฏคือจะมีอาการถ่ายเหลว

수정(fertilization)

난자와 정자가 합체하여 단일세포의 접합체를 형성하는 과정을 말함. 수정과정은 난자와 정자의 접촉으로 시작되어 정자의 난자 내 침입, 난자의 활성화, 자 · 웅전핵의 형성과정을 거쳐 양전핵의 융합으로 완료됨.

การปฏิสนธิ (Fertilization)

กระบวนการเกิดเซลล์จากการผสมกันของไข่และสเปิร์ม กระบวนการปฏิสนธิเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการสัมผัสกันของไข่และสเปิร์ม และจบลงเมื่อนิวเคลียสของเพศผู้และเพศเมียรวมตัวกัน โดยอสุจิจะเจาะเข้าไปในไข่ กระตุ้นให้ไข่ทำงาน และเกิดการรวมกันของนิวเคลียสเพศผู้และเพศเมีย

순치(taming)

① 외부에서 도입된 돼지를 직접 돈사에 들이지 않고 농장 환경에 적응하기 위해 따로 떨어진 돈사에 사육하는 것. ② 야생상태의 동물을 이용 목적에 맞게 길들이는 것.

การทำให้เชื่อง (Taming)

① การที่สุกรรุ่นถูกย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเลี้ยงที่แยกออกมา เพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของฟาร์ม แทนที่จะย้ายเข้าโรงเลี้ยงสัตว์รวมในทันที ② การทำให้สัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเชื่องเพื่อปรับให้เข้ากับจุดประสงค์ในการใช้งาน

스톨(stall)

가축 한 마리가 이용할 수 있도록 구분 지은 공간. 소의 경우, 우상이라고 하고 돼지의 경우 돈상이라고 함.

คอก (Stall)

พื้นที่กั้นสำหรับสัตว์หนึ่งตัว โดยจะเรียกว่า “คอกวัว” ในโค และ “คอกหมู” ในสุกร

승가허용행동(recptive behavior)

암컷의 발정기에 나타나는 특징적인 거동, 즉 수컷의 승가와 교미를 허용하는 자세를 취하는 상태의 발정을 말함.

พฤติกรรมมีทีท่ายอมรับ (Receptive Behavior)

ลักษณะที่แสดงออกเมื่อมีการติดสัด โดยสุกรตัวเมียจะมีทีท่ายินยอมให้สุกรตัวผู้ผสมพันธุ์

안개분무장치(fogger)

하절기에 공기냉각을 위하여 미세 수분입자를 분사하는 장치 축사내부가 건조해지기 쉬운 겨울과 봄, 가을에 축사내의 습도조절, 암모니아와 먼지제거 등을 위하여 설치하기도 함.

พัดลมไอน้ำ (Fogger)

เครื่องพ่นอนุภาคความชื้นขนาดเล็กเพื่อทำให้อากาศเย็นในช่วงฤดูร้อน โดยจะมีการติดตั้งเครื่องเพื่อควบคุมความชื้นและขจัดกลิ่นแอมโมเนียและฝุ่นในฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง

압사(death from pressure)

분만 시, 다량 수송 시, 혹은 돈방당 자돈수가 과할시에 서로 누르게 되어 발생할 수 있는 폐사형태.

การตายจากความแออัด (Death from Pressure)

การตายที่เกิดขึ้นจากความแออัด ซึ่งอาจจะเกิดในระหว่างคลอด การเคลื่อนย้ายสุกร หรือจำนวนลูกสุกรที่แออัดเกินไปภายในหนึ่งคอก

양수(amnion fluid; amnioti fluid)

양막에 있는 액체로서, 모체와 태아의 혈관 침출물, 그리고 태아의 오줌, 타액선, 구강점막, 폐 및 기관의 분비물로 구성되어 있으며, 태아의 기형적인 발달을 방지하며, 외부의 충격을 줄이고, 태아와 태막의 유착을 방지하고, 분만 시에는 자궁경관의 확장을 돕고, 산도를 윤활하게 하여 태아의 만출을 용이하게 함.

น้ำคร่ำ (Amnion Fluid; Amnioti Fluid)

ของเหลวในถุงน้ำคร่ำที่เชื่อมกับเส้นเลือดระหว่างแม่และตัวอ่อน รวมถึง ปัสสาวะ ต่อมน้ำลาย และสารคัดหลั่งจากปอดและอวัยวะของตัวอ่อน โดยของเหลวนี้ช่วยป้องกันความผิดปกติในการเจริญของตัวอ่อน ลดการกระแทก ป้องกันรกโต และช่วยขยายปากมดลูกในขณะคลอด รวมถึงช่วยหล่อลื่นช่องคลอดเพื่อนำตัวอ่อนออกจากมดลูก

외음부(vulva)

질 전정에서 이어져 나온 암컷 요생식도관의 말단을 말하는데, 음문부라고도 함. 질 전정의 외부로 향한 출구를 음열이라 하며, 음열의 좌우에 피부의 주름이 융기하여 음순이 형성되어 있음.

ปากช่องคลอด (Vulva)

ส่วนทางเข้าของช่องคลอดซึ่งเชื่อมกับส่วนช่องคลอดซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แคม อวัยวะส่วนนี้เป็นทางออกของช่องคลอดซึ่งแยกออกเป็นสองฝั่ง โดยรอยพับของผิวหนังทางด้านซ้ายและขวาทำให้เกิดเป็นส่วนแคม

웅돈(boar)

비거세한 수퇘지.

สุกรเพศผู้ (Boar)

สุกรเพศผู้ที่ยังไม่ได้รับการตอน

위축돈(atrophic rhinitis, AR)

이유시점에서 동복체중이 평균이하의 자돈과 체중은 정상일지라도 특별 관리를 요하는 자돈.

โรคเยื่อจมูกอักเสบ (Atrophic Rhinitis หรือ AR)

ลูกสุกรที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์และลูกสุกรที่มีน้ำหนักตัวปกติแต่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหลังจากการหย่านม

유산(abortion)

임신기간이 만료되기 전에 임신이 중지되어 태아가 죽거나 또는 살아있어도 생존능력을 가지기 이전에 만출되는 것을 말하며, 유산의 원인은 매우 다양할 뿐만 아니라 아직까지 원인을 알지 못하는 경우도 있음.

การแท้ง (Abortion)

การตั้งครรภ์ที่หยุดชะงักก่อนที่จะครบกำหนดคลอด โดยตัวอ่อนอาจจะตายในครรภ์หรือคลอดก่อนกำหนดโดยที่ยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอกครรภ์ได้ การแท้งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และในบางกรณีอาจจะไม่ทราบสาเหตุ

육성돈(growing pig)

20~60kg의 돼지로 성장이 빠르고 근육의 축적이 일어나는 시기의 돼지.

สุกรรุ่น (Growing Pig)

สุกรที่มีน้ำหนัก 20 - 60 กก. และมีอัตราการเติบโตรวดเร็ว โดยกำลังอยู่ในช่วงนี้กล้ามเนื้อเติบโต

이유(weaning)

젖을 떼는 행위.

หย่านม (Weaning)

ขั้นตอนการเลิกกินนมของลูกสุกร

이표(ear marking)

개체별번호를 표시하기 위하여 양 귀의 일부를 떼어내어거나 번호표를 부착하는 등의 개체 식별 방식.

การทำตำหนิที่หู

วิธีการแยกสุกรแต่ละตัวออกจากกันโดยการใช้หมายเลข โดยจะต้องตัดส่วนของหูทั้งสองข้างของสุกรและติดป้ายหมายเลขลงไป

인공수정(artificial insemination; AI)

채취한 정액을 일정한 처리를 하고, 수정을 목적으로 기구를 사용하여 암컷의 생식기내로 주입하는 행위를 말하며, 웅축의 이용효율을 높이고, 단기간에 다수의 암컷을 수정시킬 수 있으며, 전염병을 미연에 방지할 수 있음.

การผสมเทียม (Artificial Insemination หรือ AI)

ขั้นตอนในการฉีดอสุจิที่เก็บไว้เข้าไปในอวัยวะเพศของเพศเมียโดยใช้อุปกรณ์เพื่อการปฏิสนธิโดยเฉพาะ โดยวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิให้กับสุกรเพศเมียจำนวนมากและใช้เวลาน้อย รวมถึงป้องกันการเกิดโรคติดต่อ

임신(pregnancy; gestation)

배란된 난자가 암컷의 체내에서 수정되고, 이것이 태아로 발달되어 만출될 때까지의 모체의 생리적 상태를 말하며, 임신이 유지되기 위해서는 황체로부터 분비되는 다량의 프로게스테론이 필수적임.

การตั้งครรภ์ (Pregnancy; Gestation)

สภาพทางร่างกายซึ่งไข่ที่ตกออกมาได้รับการผสมและปฏิสนธิ เกิดเป็นตัวอ่อนซึ่งเติบโตและถูกคลอดออกมา โดยกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจำนวนมากซึ่งขับออกมาจากคอร์ปัสลูเทียม

임신징후(sign of pregnancy)

임신에 따라 모체에서 일어나는 모든 종류의 변화를 말하며, 태동의 감지, 태아음의 청취 등을 확징이라 하며, 발정주기의 정지, 복부의 팽대, 유방의 발육, 거동의 변화, 식욕의 증진, 외음부의 변화 등은 불확징이라 함.

สัญญาณการตั้งครรภ์ (Sign of Pregnancy)

ความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในร่างกายของแม่สุกร โดยอาจจะเป็นอาการซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่ามีการตั้งครรภ์ เช่น มีการดิ้นของตัวอ่อน มีการทำอัลตร้าซาวนด์ ฯลฯ หรืออาการที่ไม่ได้บ่งบอกชัดเจน เช่น การหยุดติดสัด ช่องท้องขยาย ทรวงอกตั้งเต้า กินมากขึ้น ปากช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ

입기구(air inlet)

공기를 유입하는 건물의 틈새. 입기구는 축사내 공기혼합형태를 결정하는 가장 중요한 변수이며, 창문, 윈치커텐, 처마슬롯, 천장 중앙슬롯, 천장 점적 등의 위치를 개장하여 입기구를 설치할 수 있음. 긴축되며, 점액도 농후해짐.

ช่องระบายอากาศ (Air Inlet)

ช่องของอาคารที่ให้อากาศถ่ายเทเข้ามา ซึ่งช่องระบายอากาศนับเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดสภาพของอากาศภายในคอก ช่องระบายอากาศอาจจะอยู่ในรูปแบบของหน้าต่าง หรือช่องเจาะรูบนชายคา

절치(cliping needle teeth)

신생자돈은 각 턱에 4개씩 8개의 강하고 예리한 송곳니를 갖고 있어 분만 직후에 절단해 주어야 하는데 그렇지 않을 경우에는 어미돼지의 유방과 다른 새끼들에게 상처를 입히는 원인이 되기도 함.

การเล็มฟัน (Clipping Needle Teeth)

ลูกสุกรเกิดใหม่จะมีฟันน้ำนม 8 ซี่ ที่กราม ซึ่งค่อนข้างคมและควรจะดึงออกทันทีหลังจากที่ลูกสุกรคลอด เนื่องจากความคมของฟันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่เต้านมแม่สุกรหรือลูกสุกรตัวอื่นๆได้

정액(semen)

성적으로 흥분한 수컷의 생식기관에서 번식을 목적으로 사출되는 체액으로서 정소에서 생산된 정자와 부생식선에서 분비된 정장의 혼합물로 보통 이러한 정액을 원정액이라 하며 희석액으로 희석하여 보관하거나 인공수정에 이용함.

อสุจิ (Semen)

ของเหลวที่หลั่งจากอวัยวะเพศผู้ที่ถูกกระตุ้นซึ่งเป็นไปเพื่อการสืบพันธุ์ น้ำอสุจิจะประกอบไปด้วยสเปิร์มและของเหลวที่หลั่งออกมาจากต่อมอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่าน้ำอสุจิหัวเชื้อซึ่งจะนำไปเจือจางและเก็บไว้เพื่อใช้ผสมเทียมต่อไป

재대(umbilical cord)

태아와 태반을 연결하는 물질교환의 통로를 말하며, 탯줄이라고도 함.

สายสะดือ (Umbilical Cord)

เส้นทางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสสารเชื่อมระหว่างตัวอ่อนกับรก

철분주사(iron injection)

신생자돈을 출생 시 철분의 저장량이 정상적이 혈구형성을 하기에 부족하기 때문에 철분을 인위적으로 주사하여 보조함.

การฉีดธาตุเหล็ก (Iron Injection)

ลูกสุกรแรกเกิดจะได้รับการฉีดธาตุเหล็กเนื่องจากปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในร่างกายไม่เพียงพอต่อการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือด

축분(animal waste, manure)

가축이나 가금에서 발생되는 분과 뇨를 통칭하는 개념. Manure(또는 muck)는 비료화된 두엄의 형태를 의미하고, slurry는 가축분뇨와 세척수가 포함된 액상분뇨를 의미함.

สิ่งปฏิกูลจากสัตว์ (Animal Waste, Manure)

ชื่อเรียกรวมๆถึงอุจจาระและปัสสาวะจากสัตว์ในฟาร์ม โดยอาจจะนำไปทำปุ๋ยคอก ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มาจากการหมักมูลสัตว์ หรืออาจจะนำไปผสมน้ำเป็นโคลนจากมูลสัตว์

퇴비사(waste storage structure)

폐기물을 저장하기 위하여 건축한 구조물을 말함.

อาคารเก็บของเสีย (Waste Storage Structure)

สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บของเสีย

항생제(antibiptics)

미생물에 의해 생산되는 가용성 유기물질. 다른 미생물의 성장활동을 억제시킬 수 있는 제제.

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)

สารอินทรีย์ละลายน้ำที่ผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำเพื่อใช้ในการเพาะเชื้อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดอื่น

환기(ventilation)

실내 공기조성을 바람직한 상태로 조정하기 위하여 환풍기로 외부공기를 유입하거나 실내 오염공기를 배출하는 행위. 이산화탄소, 암모니아, 유화수소 및 각종 악취발생기체를 제거하고 실내 온습도를 적정상태로 변화시키는 효과가 있음.

การระบายอากาศ (Ventilation)

การเปิดให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในอาคาร หรือการระบายอากาศจากภายในออก ซึ่งเป็นไปเพื่อให้อากาศภายในอาคารมีความสมดุลตามต้องการ การระบายอากาศจะช่วยระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ ก๊าซอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นออกไป รวมทั้งยังช่วยในการรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องให้มีความเหมาะสมอีกด้วย

환축실(treatment room)

질환을 가진 가축을 수용 치료하는 방.

ห้องรักษา (Treatment Room)

ห้องที่ใช้ในการรักษาและรองรับสัตว์ที่เป็นโรค

후보모돈(replacing gilt)

늙어서 생산성이 떨어지거나 또는 사고에 의해서 도태되는 모돈을 교체하기 위해 키우는 암 돼지.

สุกรสาวแม่พันธุ์ (Replacement Gilts)

สุกรเพศเมียที่จะย้ายเข้ามาแทนที่แม่สุกรที่เริ่มมีการเจริญพันธุ์ลดลงด้วยอายุที่มากขึ้นหรือแม่สุกรที่ตายแล้ว

휴약기간(withdrawal period)

잔류성이 있는 약제를 사료에 첨가할 경우 가축의 도살 전 일정기간은 약제가 첨가되지 않은 사료를 급여해야 함. 이 기간을 휴약기간이라고 함.

ช่วงระงับยา (Withdrawal Period)

ถ้าหากมีการให้อาหารที่ผสมสารเคมีที่มีโอกาสตกค้างในร่างกายสุกร ก่อนการนำสุกรเข้าโรงเชือดจะต้องให้อาหารที่ปลอดสารเคมีตามระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาดังกล่าวนี้ เรียกว่า ช่วงระงับยา

2017년 6월 07일 인쇄
2017년 6월 15일 발행

ภาษาไทย

แนวทางในการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว

คู่มือการเลี้ยงสุกรโดยละเอียด

발행인 국립축산과학원장 오성종

편집인 기 술 지 원 과 장 오형규, 양 돈 과 장 박준철

편집기획 최선호, 이병철, 김연아, 진현주, 장해용, 유지현, 천동원
서동균, 우제석, 조규호, 강석진, 유동조, 김영화, 김두완
정동완, 전승기

발행처 농촌진흥청 국립축산과학원 기술지원과
55365 전북 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1500
Tel 063-238-7203 **Fax** 063-238-7247
http://www.nias.go.kr

카툰&디자인 Designed by [에이피피커뮤니케이션즈] 02-2264-8355

번 역 바벨코리아

감 수 시칸트

인쇄처 심안인쇄 02-2264-3811

ISBN 978-89-480-4570-3 93520
(비매품)