

Билет 40. Определение эйлерова цикла. Критерий наличия эйлерова цикла в неориентированном графе.

Def. Вершина называется изолированной, если ее степень равна 0, то есть из нее не выходит ни одного ребра.

Def. Эйлеров путь — путь, проходящий по всем рёбрам графа и притом только по одному разу.

Def. Эйлеров цикл — цикл, проходящий через каждое ребро графа ровно по одному разу.

Def. Граф эйлеров, если в нем есть эйлеров цикл.

Теорема (Критерий эйлеровости неориентированного графа). *Неориентированный граф, который остается связным после удаления всех изолированных вершин, является эйлеровым тогда и только тогда, когда все его вершины имеют четную степень.*

Доказательство. \Rightarrow

Рассмотрим эйлеров обход графа. Заметим, что при попадании в вершину и при выходе из нее мы уменьшаем ее степень на два (помечаем уже пройденные ребра). Кроме того, для стартовой вершины мы уменьшаем ее степень на один в начале обхода эйлерова цикла, и на один при завершении. Следовательно вершин с нечетной степенью быть не может.

\Leftarrow

Необходимость мы доказали ранее. Докажем достаточность, используя индукцию по числу вершин n .

База индукции: $n = 0$ цикл существует.

Предположим что граф, имеющий менее n вершин, степени вершин которого четны, содержит эйлеров цикл.

Рассмотрим граф G с $n > 0$ вершинами, степени которых четны. Удалим изолированные вершины. Если такие были, воспользуемся утверждением индукции. В противном случае у нас все еще n вершины, однако теперь мы можем гарантировать, что граф связан.

Пусть v_1 — вершина графа. Начнем идти из этой вершины по ребрам графа до тех пор, пока можем (проходим по каждому ребру не более 1 раза). Если в какой-то момент мы не можем пойти дальше, выведем нашу вершину.

```
1 void euler(int v) {  
2     while (из( v есть хотя бы одно неиспользованное ребро) {  
3         пусть (v;u) - ребро, пометим его использованным  
4         euler(u)  
5     }  
6     print(v)  
7 }
```

Заметим, что у вершин, которые встречаются в процессе обхода, степень каждый раз уменьшается на 2. Ведь если мы вошли в вершину, и она не стартовая, то в этот момент из нее ведет нечетное число непосещенных ребер. Тогда из нее можно выйти.

Поэтому первая выведенная нами вершина будет стартовая, то есть v_1 . Кроме того, мы получим замкнутый путь (цикл), который начинается и заканчивается в вершине v_1 .

Назовем этот цикл C_1 . Если C_1 является эйлеровым циклом для G , тогда доказательство закончено. Если нет, то пусть G_2 — подграф графа G , полученный удалением всех рёбер, принадлежащих C_1 . Поскольку C_1 содержит чётное число рёбер, инцидентных каждой вершине, то каждая вершина подграфа G_2 имеет чётную степень. Этот граф разбивается на некоторое количество компонент связности.

Рассмотрим какую-либо компоненту связности G_2 (не состоящую из изолированной вершины). Поскольку рассматриваемая компонента связности G_2 имеет менее, чем n вершин (как минимум, туда не входит v_1 , ведь все ее ребра были удалены), а у каждой вершины графа G_2 чётная степень, то у каждой компоненты связности G_2 существует эйлеров цикл. Пусть для рассматриваемой компоненты связности это цикл C_2 . У C_1 и C_2 имеется общая вершина a , так как G связан. Давайте объединим C_1 и C_2 в новый цикл. Для этого нужно, начиная с вершины a , обойти C_1 , вернуться в a , затем пройти по C_2 и вернуться в a . Если новый эйлеров цикл не является эйлеровым циклом для G , продолжим использовать этот процесс, расширяя наш цикл, пока, в конце концов, не получим эйлеров цикл для G .

□

Билет 41. Реализация алгоритма поиска эйлерова цикла.

```

1 struct edge{
2     int from, to;
3 }
4
5 vector <edge> edges;
6 \\edges[2k] и edges[2k + 1] -- две половинки одного неориентированного ребраочень
7 \\ удобно получать вторую половинку ребра, беря ind^1
8 vector <bool> used \\used[e] -- использовано ли ребро
9 vector <int> ptr; \\ "указатель" на следующее неиспользованное ребро
10 vector <vector <int> > g; наш\\ граф в виде списков смежности, но уже с
    ориентированными ребрами
11
12 void euler(int v) {
13     while(ptr[v] != g[v].size()) {
14         int e = g[v][ptr[v]]; \\g[v] -- список номеров ребер
15         if (used[e]){++ptr[v]; continue;}
16         int u = edges[e].to;
17         used[e] = used[e^1] = true;
18         ++ptr[v];
19         euler(u);
20     }
21     cout << v << " ";
22 }

```

Асимптотика $O(n + m)$

Билет 42. Критерий наличия эйлерова пути в неориентированном графе.

Теорема. *Граф G (связный, если убрать изолированные вершины) содержит эйлеров путь тогда и только тогда, когда количество вершин с нечетной степенью меньше или равно двум.*

Доказательство. В одну сторону, очевидно, верно. Если у нас есть путь, то у вершин, отличных от концов, степень четна, а у начальной и конечной вершины степень нечетна.

В другую сторону. Если выполняется условие на степени вершин, то добавим ребро между двумя вершинами с нечетной степенью. Если такая вершина одна, то можно добавить петлю или фиктивную вершину, соединенную с нашей вершиной двумя ребрами. В полученном графе есть эйлеров цикл, удаление из которого добавленного ребра (или в случае добавления фиктивной вершины – двух ребер, которые, стоит заметить, будут соседними в цикле, и самой фиктивной вершины) даст эйлеров путь.

□

Билет 43. Критерий наличия эйлера цикла в ориентированном графе.

Теорема (Критерий эйлеровости ориентированного графа). *Ориентированный граф G (который становится сильно связным при удалении изолированных вершин) эйлеров тогда и только тогда, когда для каждой вершины верно, что входная степень равна выходной.*

Доказательство. Абсолютно аналогично доказательству для неориентированного графа.

□