

87. Нижняя оценка разброса (уклонения) величиной $\sqrt{n}/2$ с помощью матриц Адамара.

Теорема. Если n - порядок матрицы Адамара, то $\exists \mathcal{M} : disc(\mathcal{M}) \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$

▲ По определению:

$$disc(\mathcal{M}, \chi) = \max \left| \sum_{j \in \mathcal{M}_i} \chi(j) \right|$$

Пусть H - матрица Адамара, которая имеет нормальный вид, J - матрица из единиц. Рассмотрим матрицу $\frac{H+J}{2}$. За \mathcal{M}_i обозначим те позиции в i -ой строке, на которых стоят единицы. $\mathcal{M}_i \subset \{1, 2, \dots, n\}$

Пусть

$$H \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 \\ \dots \\ L_n \end{pmatrix}, v_i \in \{+1, -1\}$$

$$\left(\frac{H+J}{2} \right) \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (L_1 + \lambda)/2 \\ \dots \\ (L_n + \lambda)/2 \end{pmatrix}, v_i \in \{+1, -1\}, \lambda = \sum_{i=1}^n v_i$$

Тогда

$$(L_i + \lambda)/2 = (1 \dots 10 \dots 01 \dots) \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Будем задавать с помощью v_i -ых раскраску множества: $v_i = \chi(i)$. Тогда

$$|(L_i + \lambda)/2| = \sum_{j \in \mathcal{M}_i} |\chi(j)|$$

Следовательно, мы хотим доказать, что для любого набора v_i , всегда найдётся $(L_i + \lambda)/2$ по модулю не меньше $\frac{\sqrt{n}}{2}$.

$H = (\overline{h_1}, \dots, \overline{h_n})$, т.е. $\overline{h_i}$ - i -ый столбец матрицы H . (Важное свойство $(h_i, h_j) = 0, \forall i \neq j$)

$$(H\overline{v}, H\overline{v}) = L_1^2 + \dots + L_n^2$$

$$(H\overline{v}, H\overline{v}) = (\overline{h_1} \cdot v_1 + \dots + \overline{h_n} \cdot v_n, \overline{h_1} \cdot v_1 + \dots + \overline{h_n} \cdot v_n) = (\overline{h_1}, \overline{h_1})v_1^2 + \dots + (\overline{h_n}, \overline{h_n})v_n^2 = n \cdot 1 + \dots + n \cdot 1 = n^2 \Rightarrow$$

$$L_1^2 + \dots + L_n^2 = n^2 \Rightarrow \exists i : L_i^2 \geq n, L_i \geq \sqrt{n}$$

$$(H+J)\overline{v} = \begin{pmatrix} L_1 + \lambda \\ \dots \\ L_n + \lambda \end{pmatrix}, \text{ где } \lambda = \sum_{i=1}^n v_i \text{ - чётное число}$$

$$((H+J)\overline{v}, (H+J)\overline{v}) = (L_1 + \lambda)^2 + \dots + (L_n + \lambda)^2 = L_1^2 + \dots + L_n^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^n L_i + \lambda^2 n = n^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^n L_i + \lambda^2 n$$

Так как $\sum_{i=1}^n L_i = \sum_{i=1}^n v_i \sum_{j=1}^n h_{ij} = v_1 \cdot n + v_2 \cdot 0 + \dots + v_n \cdot 0 = \pm n$, то

$$((H+J)\overline{v}, (H+J)\overline{v}) = \lambda^2 n \pm 2\lambda n + n^2 \geq n^2$$

(Неравенство доказывается перебором целых значений в окрестности минимума)

Следовательно, $\exists i : L_i + \lambda \geq \sqrt{n} \Rightarrow (L_i + \lambda)/2 \geq \sqrt{n}/2 \Rightarrow disc(\mathcal{M}, \chi) \geq \sqrt{n}/2$ ■