

THERMOCIMIE 1	THERMOCIMIE 1
Pression standard	Température de référence
THERMOCIMIE 1	THERMOCIMIE 1
Grandeur standard de réaction	Pour quelles espèces l'enthalpie standard de formation est-elle nulle ?

$$T = 25\text{ }^{\circ}\text{C} = 298,15\text{ K}$$

$$P^{\circ} = 1\text{ bar} = 1 \cdot 10^5\text{ Pa}$$

Les corps simples dans leur état standard.

$$\Delta_r Y^{\circ} = \sum \nu_i Y_{m(X_i)}^{\circ}$$

THERMOCHIMIE 1	THERMOCHIMIE 1
Loi de Hess	Réaction exothermique
THERMOCHIMIE 1	THERMOCHIMIE 1
Réaction endothermique	Variation de l'enthalpie pour une isotherme isobare à la pression standard

$$\Delta_r H^\circ < 0$$

$$\Delta_r H^\circ = \sum \nu_i \Delta_f H(X_i)^\circ$$

$$\Delta H^\circ = \xi \Delta_r H^\circ$$

$$\Delta_r H^\circ > 0$$

Définition température de flamme

Méthode calcul température de flamme

Décomposer la réaction en (1) une isotherme et (2)
une élévation de température sans réaction.
Utiliser le fait que l'enthalpie est une fonction
d'état.

Température atteinte pour une réaction faite de
façon adiabatique et isobare.